



**Руководство
«Консультирование до и после
теста на ВИЧ»**

**Алматы
2005**

Издано международной гуманитарной организацией «СПИД Фонд Восток-Запад» в рамках проекта «Консультирование до и после теста на ВИЧ», финансируемого Европейским союзом.

В подготовке издания принимали участие специалисты *AFEW* и Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом (Республика Казахстан).

Коллектив разработчиков:

- **М. Никитина**, психолог.
- **Г. Рошупкин**, старший советник проектов по консультированию, *AFEW*.
- **И. Крашенинникова**, психолог, тренер проектов охраны здоровья в УИС, *AFEW*.
- **Ж. Трумова**, к.м.н., заведующая отделом лечебно-профилактической помощи, Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом.
- **М. Асимов**, д.м.н., профессор кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и медицинской психологии, КазНМУ.
- **Р. Демеуова**, врач-эпидемиолог, Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом.
- **М. Корнилова**, врач, проекты по уходу и поддержке, *AFEW*.
- **Д. Постнов**, менеджер проектов по уходу и поддержке, *AFEW* (на момент подготовки сборника).
- **С. Суртаева**, менеджер проекта «Консультирование до и после теста на ВИЧ», *AFEW*.
- **И. Ячменева**, ассистент координатора проекта «Консультирование до и после теста на ВИЧ», *AFEW*.

Медицинские рецензенты:

- **Р. Малюта**, медицинский координатор программ по защите и развитию здоровья детей и подростков, Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения.
- **И. Жуков**, к.м.н., ведущий тренер проектов по уходу и поддержке, *AFEW*.
- **Д. Дончук**, старший советник программ по лечению ВИЧ/СПИДа, *AFEW*.

Благодарность

«СПИД Фонд Восток-Запад» (*AIDS Foundation East-West — AFEW*) выражает благодарность следующим организациям за поддержку и предоставление услуг проекту «Консультирование до и после теста на ВИЧ» в Республике Казахстан:

- Республиканскому центру по профилактике и борьбе со СПИДом (генеральный директор Ерасилова И.Б.),
- Казахскому национальному медицинскому университету им. С.Д. Асфендиярова (ректор — д.м.н., проф. Муминов Т.А.; зав. кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии и медицинской психологии — д.м.н. Нурмагамбетова С.А.).

117. Основные направления клинического менеджмента в отношении ВИЧ-инфекции у взрослых (документ WHO/GPA/IDS/HCS/91. 6).

118. Основные направления клинического менеджмента в отношении ВИЧ-инфекции у детей (документ WHO/GPA/IDS/HCS/93. 3).

119. Настольная книга по уходу за больными СПИДом (документ WHO/GPA/IDS/HCS/93. 2).

120. Тренировка навыков консультирования по подростковой сексуальности и репродуктивному здоровью (документ WHO/ADH/93. 3).

121. Модуль тренировочного курса по ВИЧ/СПИДу и социальной поддержке менеджмента Программы NAP (1993).

Руководство предназначено для специалистов, непосредственно занимающихся консультированием клиентов до и после прохождения теста на ВИЧ. Оно составлено так, чтобы консультанту было легко найти нужную ему информацию в разделах и приложениях.

В Разделе I «История эпидемии ВИЧ/СПИДа» рассказывается об основных этапах развития эпидемии.

В Разделе II «Консультирование до и после теста на ВИЧ» представлена информация об элементах ДКТ, детально расписаны процесс, техники и компоненты консультирования до и после теста на ВИЧ, уделено внимание консультативному контакту и развитию диалога с различными клиентами, а также перечислены наиболее распространенные ошибки при консультировании.

Раздел III «Профилактика передачи ВИЧ» посвящен программам профилактики ВИЧ/СПИДа, направленным на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции в уязвимых группах. Основные подразделы: профилактика передачи ВИЧ при инъекционном употреблении наркотиков; профилактика передачи ВИЧ при сексуальных контактах; профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку.

Приложение I «Иммунная система» содержит информацию о том, как работает иммунная система, и какое влияние оказывает на нее ВИЧ-инфекция.

Приложение II «Передача ВИЧ» содержит информацию о жидкостях организма, содержащих ВИЧ, путях и вероятных факторах передачи ВИЧ-инфекции.

В приложении III «Течение болезни» вы найдете ответы на вопросы: «Что происходит, когда человек подвергается контакту с ВИЧ?» и «Какие периоды можно выделить в течении болезни?»

Приложение IV «Тестирование» включает перечень основных лабораторных тестов и алгоритмов лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции в Республике Казахстан.

Приложение V «Медицинское наблюдение» предоставляет информацию о дополнительных видах исследований для ВИЧ-инфицированных клиентов: серологических тестах для выявления СПИД-индикаторных инфекций и иммунологическом обследовании.

В приложении VI «Влияние лечения на течение ВИЧ-инфекции» говорится об антиретровирусной терапии (АРТ), которая является неотъемлемой частью комплексной терапии ВИЧ-инфекции, и о правильном применении существующих схем терапии.

В приложении VII «Оппортунистические инфекции» акцент сделан на том, что в течении ВИЧ-инфекции наступает момент, когда снижение иммунитета делает возможным развитие оппортунистических заболеваний.

В приложении VIII представлены законы и подзаконные акты Республики Казахстан, касающиеся ВИЧ-инфекции.

98. А.Г. Рахманова. Противовирусная терапия ВИЧ-инфекции. — СПб., 2001.
99. Э. Фаучи, Л. Лэйн. ВИЧ-инфекция и СПИД: 308 глава из книги «Внутренние болезни по Тинсли Р. Харрисону». — М.: Практика, 2002.
100. Р.М. Хаитов. Из истории открытия ВИЧ.// Вакцинация и ВИЧ-инфекция, 2001, № 2 (14).
101. Н.В. Шабашова. Лекции по клинической иммунологии. — СПб., 1998.
102. А.Г. Шипулин, К.А. Саркисян, Е.В. Богословская и др. Место ПЦР в диагностике ВИЧ-инфекции.// Эпидемиология и инфекционные болезни. 1998, № 5.
103. Заявление о политике тестирования и консультирования на ВИЧ. — Женева, ЮНЭЙДС, 1997.
104. Технический обзор ЮНЭЙДС: Добровольное консультирование и тестирование (ДКТ). — Женева, 2000.
105. Руководство «Консультирование до и после теста на ВИЧ-инфекцию». — М.: СПИД инфосвязь, 1997.
106. ВИЧ при беременности. Обзор. — WHO/ЮНЭЙДС, 1999.
107. Руководство по ВИЧ-консультированию, тестированию и направлению к специалистам. — CDC, 1994.
108. Пересмотренное руководство по ВИЧ-консультированию, тестированию и направлению к специалистам. — CDC, 1997.
109. Р. Кочюнас. Основы психологического консультирования. — М.: Академический проект, 1999.
110. Материалы семинара ЮНЭЙДС «Добровольное консультирование и тестирование». — Москва, 2000.
111. Procaska & Diclemente, Towards a comprehensive model of change. In. Millir, W.R. & Heather, N. (Eds), Treating Addictive Behaviours, Processes of Change (1996).
112. Заявление Консультации по тестированию и консультированию по вопросам ВИЧ-инфекции. — Женева, 16–18 ноября 1992 г. (документ WHO/GPA/INF/93. 2).
113. Основные направления консультирования доноров крови по вопросам ВИЧ-инфекции (документ WHO/GPA/TSC/HCS/94. 2).
114. Профилактика ВИЧ и уход: модули по обучению младшего и среднего медицинского персонала (документ WHO/GPA/CNP/TDM/93. 3).
115. Жизнь в сообществе со СПИДом (документ WHO/GPA/1DS/HCS/92. 1. Ред. 1).
116. An orientation to HIV/AIDS counselling: A guide for trainers. WHO-SEARO. New Delhi (1994).

81. Заявление ЮНЭЙДС, сделанное на Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по наркотическим средствам. Комитет полного состава. Нью-Йорк, 9 июня 1998 г. Сборник примеров передового опыта ЮНЭЙДС. — Женева, ЮНЭЙДС, 1999.
82. Иммунология инфекционного процесса./ Под ред. В.В.Покровского и др. — М., 1994.
83. Иммунология./ Под ред У. Пола. — М.: Мир, 1987.
84. Клиническая иммунология./ Под ред. А.В.Караулова. — М., 1999.
85. Г.И. Коровина. ПЦР-диагностика ВИЧ-инфекции у детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами. // Медицинская кафедра, 2002, т. 4.
86. В.И. Кулаков, И.И. Баранов. ВИЧ: профилактика передачи от матери ребенку. — М.: Веди, 2003.
87. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология/ Под ред. Л.В.Борисова и А.М.Смирновой. — М.: Медицина, 1994.
88. Методические рекомендации по организации ЦСО в ЛПУ, МЗ СССР от 21.12.89.
89. Г.Г. Онищенко. Эпидемия ВИЧ-инфекции продолжается.// Вакцинация и ВИЧ-инфекция, март-апрель, 2001, № 2 (14).
90. М.Н. Папуашвили. Клинико-эпидемиологический анализ ВИЧ и оппортунистических инфекций. Алгоритмы диагностики и прогнозирования.// Иммунопатология, аллергология, инфектология, 2002, № 4, 2002.
91. М.Н. Папуашвили Современная антиретровирусная терапия ВИЧ-инфекции и проблемы, связанные с ней. // Аллергология и иммунология, 2002, № 3.
92. В.В. Покровский и соавт. Клиническая диагностика ВИЧ-инфекции. Практическое руководство. — М., ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2002.
93. В.В. Покровский, Н.Н. Ладная и др. Развитие эпидемии ВИЧ-инфекции в России. // Эпидемиология и инфекционные болезни, 2001, № 1.
94. Приказ № 408 МЗ СССР от 12.07.89 «Предупреждение профессиональных заражений».
95. Приказ № 220 МЗ СССР от 17.09.93 «О мерах по развитию и совершенствованию инфекционной службы в Российской Федерации».
96. Приказ МЗ РК № 404 от 15.08.1997 «О мерах по снижению заболеваемости вирусными гепатитами в республике».
97. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 27.06.2001 № 229 «О национальном календаре профилактических прививок и календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Оглавление

| | |
|---|-----|
| Предисловие | 7 |
| Раздел I. История эпидемии ВИЧ/СПИДа | |
| Основные события в истории эпидемии | 9 |
| Раздел II. Консультирование до и после теста на ВИЧ | |
| 1. Международный опыт и рекомендации | 17 |
| 2. Законодательная база для проведения тестирования на ВИЧ и консультирования | 17 |
| 3. Консультирование и тестирование на ВИЧ | 18 |
| 4. Основы консультирования | 22 |
| 5. Консультирование до теста на ВИЧ | 38 |
| 6. Консультирование после теста на ВИЧ | 43 |
| 7. Консультирование людей, живущих с ВИЧ/СПИДом | 47 |
| 8. Психологические аспекты жизни с ВИЧ/СПИДом | 53 |
| 9. Закономерности изменения поведения. Процесс принятия решения и модели изменения поведения | 62 |
| Раздел III. Профилактика передачи ВИЧ | |
| 1. Программы профилактики ВИЧ/СПИДа | 71 |
| 2. Стратегия снижения вреда | 71 |
| 3. Профилактика парентерального пути передачи ВИЧ | 72 |
| 4. Профилактика передачи ВИЧ при сексуальном контакте | 74 |
| 5. Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку | 80 |
| 6. ВИЧ-инфекция у новорожденных и подростков..... | 80 |
| Приложение I. Иммунная система | |
| 1. Как работает иммунная система | 81 |
| 2. Определение ВИЧ и СПИДа..... | 82 |
| 3. Вирусы как особая форма жизни | 82 |
| 4. Особенности ВИЧ | 83 |
| 5. Влияние ВИЧ на иммунную систему | 83 |
| Приложение II. Передача ВИЧ | |
| 1. Жидкости организма, содержащие ВИЧ | 85 |
| 2. Пути передачи ВИЧ | 85 |
| Приложение III. Течение болезни | |
| 1. Что происходит, когда человек подвергается контакту с ВИЧ | 99 |
| 2. Период инфицирования | 100 |
| 3. Период выработки антител («период окна») | 100 |
| 4. Инкубационный период | 100 |
| 5. Прогноз для людей, живущих с ВИЧ | 100 |

Приложение IV. Тестирование

| | |
|---|-----|
| 1. Лабораторные тесты и их результаты | 103 |
| 2. Иммуноферментный анализ (ИФА)..... | 103 |
| 3. Вестерн Блот (иммуноблот) | 104 |
| 4. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) | 105 |
| 5. Алгоритм лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции в Республике Казахстан | 105 |

Приложение V. Медицинское наблюдение

| | |
|--|-----|
| Дополнительные виды исследований для ВИЧ-инфицированных клиентов..... | 107 |
|--|-----|

Приложение VI. Влияние лечения на течение ВИЧ-инфекции109**Приложение VII . Оппортунистические инфекции**111**Приложение VIII. Законы и подзаконные акты о ВИЧ-инфекции**113

| | |
|-------------------------|-----|
| Список аббревиатур..... | 141 |
|-------------------------|-----|

| | |
|--------------------|-----|
| Библиография | 142 |
|--------------------|-----|

65. R. Sperling et al. 'Maternal plasma HIV-1 RNA and the success of zidovudine in the prevention of mother-to-child transmission', *Third International Conference on retroviruses and Opportunistic Infections, Washington, DC, 1996, Abstract LB1.*

66. G. Stein. 'Acquired Immune Deficiency Syndrome: Biological, Medical, Social and Legal Issues', 3-ed., New Jersey, Prentice Hall (1988).

67. M.C. Steinhoff, B.S. Auerbach, K.E. Nelson et al. *N. Engl. J. Med.*, 325:1837-1842 (1991).

68. P. Stratton, N.J. Alexander. 'Prevention of sexually transmitted infections; physical and chemical barrier methods'. *Infect Dis Clin N Am* 7: 841-59 (1993).

69. D.M. Thea et al. 'The effect of maternal viral load on the risk of perinatal transmission of HIV-1'. *AIDS*, 11: 437-444 (1997).

70. P. Tovo et al. 'Mode of delivery and gestational age influence perinatal HIV-1 transmission'. *J Acquir Immune Defic Syndr Hum Retrovirol*, 343: 390-391(1996).

71. B.J. Turner et al. 'Cigarette smoking and maternal — child HIV transmission'. *J Acquir Immune Defic Syndr Hum Retrovirol*; 14:327-337 (1997).

72. US Guidelines for the use of antiretroviral agents in pediatric HIV infection (June 25, 2003).

73. US Public health service. Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-Infected Adults and Adolescents (February 4, 2002).

74. USPHS/ISDA Guidelines for the prevention of opportunistic infections in persons infected with human immunodeficiency virus: a summary. United States, July 1995, *MMWR* 44 (RR-8) (1995).

75. USPHS/ISDA Guidelines for the prevention of opportunistic infections in persons infected with human immunodeficiency virus. *MMWR* 48:1-67 (1999).

76. E. Vittinghoff, J. Douglas, F Judson, et al. 'Per-contact risk of human immunodeficiency virus transmission between male sexual partners'. *Am J Epidemiol* 150: 306-11 (1999).

77. N.A. Wade, G.S. Birkhead, B.L. Warren, et al. 'Abbreviated regimens of zidovudine prophylaxis and perinatal transmission of the human immunodeficiency virus', *N Engl J Med*, 339: 1409-14 (1998) .

78. M.P. Webber, E.E. Schoenbaum, M.N. Gourevitch, et al. 'Temporal trends in the progression of human immunodeficiency virus disease in a cohort of drug users'. *Epidemiol* 9: 613-17 (1998).

79. А.С. Шевелев. СПИД — загадка века. — М., 1991.

80. А.А. Давыдова, Б.Д. Мебель, Ю.Н. Кучеренко. СПИД. Современные представления. — СПб., 2002.

49. P. Monini, A. Rotola, L. DeLellis, et al. 'Latent BK virus infection and Kaposins sarcoma pathogenesis'. *Int J Cancer* 66:717–22 (1996).
50. MSF-H Ukraine: Treatment, care and support of injecting drug users living with HIV/AIDS. Prepared by Dave Burrows (July 2000).
51. A. Munoz, A.J. Kirby, Y.D. He, et al. 'Long-term survivors with HIV-1 infection: incubation period and longitudinal patterns of CD4+ lymphocytes', *J Acq Immune Defic Syndr Hum Retrovirol* 8: 496–505 (1995).
52. S. O'Shea et al. 'Maternal viral load, CD4 cell count and vertical transmission of HIV-1', *J Med Virol*, 54(2): 113-117 (1998).
53. Patric G. Yeni etc. 'Antiretroviral Treatment for Adult HIV Infection in 2002'. *JAMA*, Vol 288: 2 (July 10, 2002).
54. W.A. Paxton, and S. Kang. 'Chemokine receptor allelic polymorphisms: relationships to HIV resistance and disease progression'. *Semin Immunol* 10: 187–94 (1998).
55. Perinatal HIV Guidelines Working Group, 2000.
56. F.A. Plummer, J.N. Simonsen, D.W. Cameron, et al. 'Cofactors in male-female sexual transmission of human immunodeficiency virus type 1'. *J Infect Dis* 163: 233–9 (1991).
57. F.A. Plummer. 'Heterosexual transmission of human immunodeficiency virus type 1 (HIV): interactions of conventional sexually transmitted diseases, hormonal contraception and HIV-1'. *AIDS Res Hum Retroviruses*, 14 (Suppl 1): 5-10 (1998).
58. Preventing the transmission of HIV among drug abusers. A position paper of the United Nations System. Annex to the Report of 8th Session of ACC Subcommittee on Drug Control, 28–29 September 2000.
59. T.C. Quinn. 'Global burden of the HIV pandemic'. *Lancet* 348: 99-106 (1996).
60. J.D. Rich, N.A. Merriman, S.E. Mylonakis, T. Greenough, T. Flanagan. 'Misdiagnosis of HIV infection by HIV-1 plasma viral load testing: a case series', *Intern Med* 130: 37–9 (1999).
61. E.M. Rodriguez, L.M. Mofenson, B.H. Chang, et al. 'Association of maternal drug use during pregnancy with maternal HIV culture positivity and perinatal HIV transmission', *AIDS*, 10: 273–82 (1996).
62. R.A. Royce, A. Sena, W. Jr. Cates, and M.S. Cohen. 'Sexual transmission of HIV', *N Engl JMed* 336:1072–8 (1997).
63. M.C. Samuel, N.Hessol, S. Shiboski, et al. 'Factors associated with human immunodeficiency virus seroconversion in homosexual men in three San Francisco cohort studies, 1984c1989', *J Acquir Immune Defic Syndr* 6: 303-12 (1993).
64. N. Shaffer, R. Chuachoowong, P.A. Mock, et al. 'Short-course zidovudine for perinatal HIV-1 transmission in Bangkok, Thailand: a randomized controlled trial'. *Lancet* 353: 773–80 (1999).

Предисловие

Уважаемые дамы и господа!

«СПИД Фонд Восток-Запад» (*AIDS Foundation East-West — AFEW*) — международная гуманитарная неправительственная организация, работающая в области общественного здравоохранения. Стратегия *AFEW* — установление тесного сотрудничества между Востоком и Западом посредством обмена знаниями, информацией и специалистами в рамках выполняемых программ. Главная цель организации — уменьшение негативных последствий распространения ВИЧ/СПИДа в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Монголии.

«СПИД Фонд Восток-Запад» с июля 2002 года реализует на территории Республики Казахстан проект «Консультирование до и после теста на ВИЧ». Проект осуществляется в непосредственном взаимодействии с Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИДом. Данное руководство содержит основные сведения о ВИЧ/СПИДе и рассматривает наиболее важные вопросы, которые волнуют клиентов при прохождении теста. Кроме того, в руководство включена информация о новом для Казахстана методе работы с клиентами — консультировании.

Предложенная Всемирной организацией здравоохранения политика добровольного консультирования и тестирования (ДКТ) доказала свою эффективность как в профилактике ВИЧ, так и при оказании медицинской помощи ВИЧ-инфицированным. ДКТ является сравнительно недорогой программой вмешательства. Она позволяет людям узнать о своем серологическом статусе в конфиденциальной обстановке, получить всю необходимую информацию, психологическую помощь и, в случае необходимости, направление на дальнейшее медицинское и социальное обслуживание. Преимущество ДКТ заключается в том, что при положительном результате теста на ВИЧ соответствующее медицинское обслуживание (в том числе лечение и/или профилактика болезней, сопутствующих ВИЧ) предоставляется на ранней стадии. Знание серологического статуса помогает людям принять эффективное решение в отношении своих последующих действий и тем самым защитить от инфекции себя и своих сексуальных партнеров. Беременным ВИЧ-инфицированным женщинам ДКТ помогает предотвратить передачу вируса ребенку.

Руководство предназначено для специалистов, непосредственно занимающихся консультированием клиентов до и после прохождения ими теста на ВИЧ: в первую очередь медицинским работникам,

психологам, социальным работникам, а также добровольцам, прошедшим специальную подготовку. В то же время следует заметить, что знаниями и навыками, необходимыми для работы с ВИЧ-инфицированными пациентами или пациентами с неизвестным ВИЧ-статусом, сегодня должен обладать каждый медицинский и социальный работник.

Материалы руководства могут оказать помощь и быть использованы при создании других информационных материалов по вопросам ВИЧ/СПИДа.

Желаем вам успеха в работе!

*С. Суртаева, менеджер проекта
«Консультирование до и после теста на ВИЧ», AFEW*

33. Julie Louise Gerberding. 'Occupational exposure to HIV in health care settings', *N Engl J Med*, 348 (9):826–833 (2003).
34. J.O. Kahn, B.D. Walker. 'Acute human immunodeficiency virus type 1 infection', *N Engl J Med* 339: 33–9 (1998).
35. E.H. Kaplan, R. Heimer. 'A model-based estimate of HIV infectivity via needle sharing'. *JAIDS* 5:1116–8 (1992).
36. C. Kind, C. Rudin, C.A. Siegrist, et al. 'Prevention of vertical HIV transmission: additive protective effect of elective Caesarean section and Zidovudine prophylaxis', *AIDS*, 12:205-10 (1998).
37. M.M. Kitahata, T.D. Koepsell, R.A. Deyo, C.L. Maxwell, W.T. Dodge, E.H. Wagner. 'Physicians' experience with the acquired immunodeficiency syndrome as a factor in patients' survival', *N Engl J Med* 334:701–6 (1996).
38. M. Laga, A. Manoka, M. Kivuvu, et al. 'Non-ulcerative sexually transmitted diseases as risk factors for HIV-1 transmission in women: results from a cohort study'. *AIDS* 7:95-102 (1993).
39. S.H. Landesman et al. 'Obstetrical factors and the transmission of HIV 1 from mother to child'. *N Eng J Med*, 334: 1617-1623 (1996).
40. M.J. Lee, R.J. Hallmark, L.M. Frenkel, Del Priore G. 'Maternal syphilis and vertical transmission of human immunodeficiency virus type-1 infection'. *Int J Gynaecol Obstet*, 63:247–52 (1998).
41. A.R. Lifson, P.M. O'Malley, N.A. Hessel, et al. 'HIV seroconversion in two homosexual men after receptive oral intercourse with ejaculation: implications for counseling concerning safe sexual practices', *Am J Public Health* 80: 1509-11 (1990).
42. C.H. Lotz, W. Kreuz, M. Funk, et al. 'Bisherige Impfgebnisse bei HIV-infizierten Kindern mit und ohne IVIG-Therapie', 3 Deutscher AIDS-Kongr., 1990, Abst., 34.
43. E.G.H. Lyall, M. Blott, A. deRuiter, et al. 'Guidelines for management of HIV infection in pregnant women and the prevention of mother to child transmission', *HIV Medicine*, 74:6984–91 (2001).
44. W.D. Lyman. 'Perinatal AIDS: drugs of abuse and transplacental infection'. *Adv Exp Med Biol*, 335:211-17(1993).
45. L. Mandelbrot, J. Le Chenadec, A. Berrebi, et al. 'Perinatal HIV-1 transmission: interaction between Zidovudine prophylaxis and mode of delivery in the French perinatal cohort', *JAMA*, 280:55–60 (1998).
46. T.D. Mastro, I. de Vincenzi. 'Probabilities of sexual HIV-1 transmission', *AIDS* 10 (SupplA): S75–82 (1996).
47. P.B. Matheson et al. Association of maternal drug use during pregnancy with mother-to-child transmission, *AIDS*, 11(7): 941–942 (1997).
48. W. McFarland, D. Mvere, W. Shandera, and A. Reingold. Epidemiology and prevention of transfusion-associated human immunodeficiency virus transmission in sub-Saharan Africa', *Vox Sang*, 72:85–92 (1997).

16. Centers for Disease Control, *MMWR* 37:183-186 (1998).
17. 'Clinical Immunology'. Ed. By Brostoff J., Scadding G.K., Male D.K., Roitt I.M. *Gower Medical Publ.* (1991).
18. E.C. Consten, van Lanschot, P.C. Henny, J.G. Tinnemans, and van der Meer. 'A prospective study on the risk of exposure to HIV during surgery in Zambia', *AIDS* 9: 585-8 (1995).
19. European Collaborative Study, 'Risk factors for mother-to-child transmission of HIV-1. *Lancet*, 339:1007-1012 (1992).
20. European Collaborative Study, 'Vertical transmission of HIV-1: maternal immune status and obstetric factors'. *AIDS*, 10:1675-1681(1996).
21. 'European Mode of delivery Collaboration. Elective caesarean-section versus vaginal delivery in prevention of vertical HIV-1 transmission: a randomized clinical trial'. *Lancet*, 353:1035-9 (1999).
22. P.M. Garcia, L.A. Kalish, J. Pitt, et al. 'Maternal levels of plasma human immunodeficiency virus type-1 RNA and the risk of perinatal transmission'. *N Engl J Med*, 341: 394-402 (1998).
23. J.J. Goegert et al. 'High risk of HIV-1 infection for first born twins', *Lancet*, 338:1471-1475(1991).
24. W.R. Grady, D.H. Klepinger, A. Nelson-Wally. 'Contraceptive characteristics: the perceptions and priorities of men and women', *Fam Plann Perspect* 31: 168-75 (1999).
25. L.A. Guay, P. Musoke, T. Fleming, et al. 'Intrapartum and neonatal single-dose nevirapine compared with zidovudine for prevention of mother-to-child transmission of HIV-1 in Kampala, Uganda. HIVNET 012 randomised trial'. *Lancet*, 354: 795-802 (1999).
26. M. Gwinn, P.M. Wortley. 'Epidemiology of HIV infection in women and newborns', *Clin Obstet Gynecol* 39:292-304 (1996).
27. D.R. Henrad, J.F. Phillips, L.R. Muenz, et al. 'Natural history of HIV-1 cell-free viremia'. *JAMA*, 274: 554-8 (1995).
28. 'HIV and Its Transmission. Centers for Disease Control and Prevention'. <http://www.cdc.gov/hiv/pubs/facts/transmission.htm>
29. E. Hooper. 'The River: A Journey Back to the Source of HIV and AIDS' (*The Penguin Press*, 1999)
30. D.J. Hu, T.J. Dondero, M.A. Rayfield, et al. 'The emerging genetic diversity of HIV. The importance of global surveillance for diagnostics, research, and prevention'. *JAMA*, 275: 210-6 (1996).
31. International Perinatal HIV Group. The mode of delivery and the risk of vertical transmission of human immunodeficiency virus type 1. *N Eng Med* 1999; 340: 977-87.
32. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) — World Health Organization. Revised recommendations for the selection and use of HIV antibody test. *Weekly Epidemiol Rec* 1997; 72: 81-88.

Раздел I

История эпидемии ВИЧ/СПИДа

В последние десятилетия в медицине произошел настоящий переворот: успехи вакцинации, появление новых высокоактивных антибиотиков, внедрение в клиническую практику современных методов диагностики. Все это позволило человечеству избавиться от ряда тяжелых инфекционных заболеваний, но вместе с тем открыло путь тем микроорганизмам, особенно вирусам, которые никогда раньше активно не проявлялись. Начиная с 1970-х годов описано более 30 неизвестных ранее заболеваний: гепатиты В и С, лихорадка Эбола, лихорадка Западного Нила, атипичная пневмония (SARS) и многие другие, в том числе ВИЧ-инфекция.

Эпидемиям новых заболеваний предшествует возникновение изолированных случаев: возбудитель ждет благоприятных условий для своего распространения. По такой схеме развивались эпидемии чумы и холеры в Средние века, сифилиса — в эпоху Возрождения, гриппа — в конце XVIII века.

Несколько случаев, подобных по клинической картине СПИДу, были описаны в 1950-х, 60-х и 70-х годах. Более того, в некоторых образцах крови, взятых у этих больных и хранившихся в замороженном состоянии до 1980-х годов, обнаружены антитела к ВИЧ. Несмотря на большое количество фактов и доказательств, собранных учеными в пользу различных версий, до настоящего времени нет единого мнения о происхождении вируса, а также о причинах стремительного распространения ВИЧ-инфекции в конце XX столетия.

Основные события в истории эпидемии

1979

Врачи в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе отметили необычные иммунные нарушения у ряда пациентов — мужчин-гомосексуалов: серьезные случаи генитального герпеса, рак кровеносных сосудов (саркома Капоши) и редкую форму воспаления легких (пневмоцистную пневмонию).

1982

Американские федеральные центры по контролю заболеваемости (CDC) ввели в реестр болезней новое заболевание: синдром приобретенного иммунодефицита — СПИД (AIDS — «acquired immune deficiency syndrome»). Установлена связь СПИДа с переливанием крови, внутривенным введением наркотиков и врожденными инфекциями. Также исследователи и врачи-практики в США и Западной Европе пришли к следующему выводу: возможно, причиной СПИДа является

ся вирус, передающийся при сексуальных контактах. Заболевание было описано и стало активно изучаться.

В Великобритании зарегистрирован первый случай смерти от СПИДа. Умерший мужчина был геем. Именем этого человека названа одна из наиболее авторитетных в Великобритании организаций, работающих в области ВИЧ/СПИДа, — Терренс Хиггинс Траст.

1983

Группа доктора Люка Монтанье в Институте имени Пастера в Париже выделила Т-клеточный лимфотропный вирус (LAV). Одновременно с этим в США группа доктора Роберта Галло в Национальном институте здравоохранения выделила вирус, названный Т-лимфотропным вирусом человека, тип III (HTLV3), который оказался полностью идентичен выделенному во Франции вирусу. Было принято обозначение ВИЧ — вирус иммунодефицита человека (HIV — «human immunodeficiency virus»). ВИЧ считается агентом, вызывающим СПИД.

В США за год от СПИДа умерли не менее полутора тысяч человек.

Исследования показали, что СПИД широко распространен среди гетеросексуалов в Африке.

1984

Райан Уайт (Ryan White), подросток, больной гемофилией, по инициативе родителей его одноклассников изгоняется из школы в Кокомо, Индиана, из-за того, что болен СПИДом (позже этот случай стал примером наиболее дикой реакции на эпидемию со стороны общества). До конца своей короткой жизни Райан, при поддержке своих родителей, пытался объяснить американскому обществу, что СПИД не передается при бытовых контактах. Сегодня он назван героем в своей стране.

1985

В СССР выявлены первые случаи СПИДа у иностранных студентов, обучающихся в советских вузах.

Установлено, что ВИЧ передается через жидкости организма: кровь, сперму, секрет влагалища и материнское молоко. Также исследования показали, что вирус иммунодефицита содержится, помимо крови, в клетках мозга и спинномозговой жидкости.

Федеральное управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами США (FDA) одобрило первый тест для определения антител к ВИЧ — иммуноферментный анализ (ИФА).

В США и Японии начали проверять на ВИЧ донорскую кровь и продукты крови.

В США за год зарегистрировано 6972 смертельных исхода от СПИДа.

Библиография

1. J.G. Bartlett, 'Medical Management of HIV Infection', Hopkins University, 1999.
2. S. Blanche, C. Rouzioux, M.L. Moscato, et al., 'A prospective study of infants born to women seropositive for human immunodeficiency virus type 1. HIV Infection in Newborns French Collaborative Study Group', *N Engl J Med*, 320:1643–8 (1989).
3. W. Bounds, 'Female condoms', *Eur J Contracep Reprod Health Care*, 2:113–6 (1997).
4. S.P. Buchbinder, MH Katz, NA Hessel, PM O'Malley, and SD Holmberg, 'Long-term HIV-1 infection with immunologic progression', *AIDS*, 8:1123–28 (1994).
5. E.M. Carlin, F.C. Boag, 'Women, contraception, and STDs including HIV', *Int J STD AIDS*, 6: 373–386 (1995).
6. CDC, '1993 revised classification system for HIV infection and expanded surveillance case definition for AIDS among adolescents and adults', *MMWR RR-17* (1992).
7. CDC, '1998 guidelines for treatment of sexually transmitted diseases', *MMWR*, 47 (RR-1): 1-116 (1998).
8. CDC, 'Guidelines for the use of antiretroviral agents in pediatric HIV infection' (August 2000).
9. CDC, 'Hepatitis B virus: a comprehensive strategy for eliminating transmission in the United States through universal childhood vaccination. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)' *MMWR* 40(RR-13) (1991).
10. CDC, 'HIV/AIDS Surveillance Report', Atlanta, Georgia: U.S. Department of Health and Human Services (1999).
11. CDC, 'Interpretation and use of the Western blot assay for serodiagnosis of human immunodeficiency virus type 1 infections', *MMWR* 1989, 38 (suppl 7): 4–6.
12. CDC, 'Management of possible sexual, injecting-drug-use, or other nonoccupational exposure to HIV, including considerations related to antiretroviral therapy', *MMWR* 47: RR-17:1-14 (1998).
13. CDC, 'Prevention and control of influenza. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)', *MMWR* 48(RR-4) (1999).
14. CDC, 'Prevention of hepatitis A through active or passive immunization. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)', *MMWR* 45(RR-15) (1996).
15. CDC, 'Public Health Service guidelines for the management of health-care worker exposures to HIV and recommendations for postexposure prophylaxis', *MMWR* 47:1–34 (1998).

Список аббревиатур

| | |
|----------------|--|
| АЗТ | — азидотимидин (зидовудин). |
| АРВ | — антиретровирусная терапия. |
| АТ | — антитела. |
| ВААРТ | — высокоактивная антиретровирусная терапия. |
| ВБ | — Вестерн Блот. |
| ВИЧ | — вирус иммунодефицита человека. |
| ВИЧ-позитивный | — человек, у которого обнаружены антитела к ВИЧ. Это дает основание предполагать, что человек ВИЧ-инфицирован. |
| ВОЗ | — Всемирная организация здравоохранения. |
| ГИ | — герпетическая инфекция. |
| ИППП | — инфекции, передающиеся половым путем. |
| ИБ | — иммуноблот. |
| ИФА | — иммуноферментный анализ. |
| ЛЖВС | — люди, живущие с ВИЧ/СПИДом. |
| МСМ | — мужчины, вступающие в сексуальные отношения с мужчинами. |
| НПО | — неправительственная организация. |
| ОАК | — общий анализ крови. |
| ОИ | — оппортунистические инфекции. |
| ПГЛ | — персистирующая генерализованная лимфоаденопатия. |
| ПИН | — потребители инъекционных наркотиков. |
| ПЦР | — полимеразная цепная реакция. |
| СПИД | — синдром приобретенного иммунодефицита. Синдром — набор определенных проявлений болезни — симптомов. СПИД развивается у людей, заразившихся ВИЧ-инфекцией, и является последней стадией этой болезни. |
| ТБ | — туберкулез. |
| ТД | — Телефон доверия — служба экстренной анонимной психологической помощи по телефону. |

В Соединенных Штатах начали проводить первые клинические исследования лекарств для борьбы с ВИЧ-инфекцией. В июле начались испытания зидовудина (АЗТ или ЗДВ), ставшего единственной надеждой ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом на следующее десятилетие.

1987

В Советском Союзе официально объявлено о регистрации первого случая СПИДа у гражданина страны. Им оказался гей, долгое время работавший военным переводчиком в одной из стран Африки.

В Республике Казахстан зарегистрирован первый случай ВИЧ-инфекции.

25 августа 1987 года Председатель Президиума ВС СССР А.А. Громыко подписывает первый советский законодательный акт по СПИДу. Указ предусматривает: 1) всеобщее тестирование на ВИЧ населения СССР и находящихся на территории страны иностранных граждан; 2) строгое наказание за заражение или «заведомое поставление другого лица в опасность заражения заболеванием СПИД» восьмью и пятью годами лишения свободы соответственно.

СПИД выделяют в самостоятельное научное направление, что позволяет начать формирование системы специализированных центров для мониторинга эпидемиологической ситуации, организации профилактики инфекции и оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом.

Советская система СПИД-центров стала базовой для формирования национальных центров профилактики и борьбы со СПИДом в государствах, образовавшихся на территории бывшего СССР.

Учреждена Глобальная программа ВОЗ по СПИДу. СПИД — первое заболевание, которое обсуждалось на заседании сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В нескольких странах одобрено первое лекарство против СПИДа — АЗТ (зидовудин, ретровир).

В США введен запрет на въезд в страну иммигрантов и туристов с ВИЧ-инфекцией.

1988

В Казахстане к концу года были зарегистрированы 7 случаев ВИЧ-инфекции.

К сожалению, в СССР подавляющая часть венерологов, инфекционистов, наркологов, терапевтов и других врачей с самого начала была отрезана от информации о СПИДе и связанной с ним клинической практике, в связи с чем они быстро потеряли интерес к этой проблеме. Результат не заставил себя ждать...

В России — 71 случай ВИЧ-инфекции.

День 1 декабря объявлен Всемирным днем борьбы со СПИДом.

1989

Пожалуй, самый драматичный момент в развитии эпидемии в СССР.

В больницах Элисты, Волгограда и Ростова-на-Дону заражены вирусом иммунодефицита 250 детей. Официальная причина трагедии — небрежность медперсонала.

По инициативе врачей, работавших под руководством В.В. Покровского, создается первая в истории СССР и России СПИД-сервисная неправительственная организация — Ассоциация по борьбе со СПИДом. Ассоциация просуществовала недолго, но это была первая попытка осознать значение надвигающейся эпидемии и необходимости не только медицинской, но и социальной помощи людям, заразившимся ВИЧ.

Позже в Казахстане также были созданы десятки неправительственных организаций, поставивших своей целью борьбу с эпидемией СПИДа.

В США за год зарегистрированы 27 666 смертей от СПИДа.

1990

На мировом фармацевтическом рынке появились еще два препарата для лечения СПИДа (DDI и DDC), относящихся к тому же классу, что и AZT.

1991

Происходит на первый взгляд незначительное событие, определившее гуманистическое направление дальнейшего развития отношения общества к ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом в России. Впервые за историю развития эпидемии в СССР в клинику для ВИЧ-инфицированных (Московская клиническая инфекционная больница № 2 [КИБ]) пришел священник старообрядческой церкви, отец Анатолий Басков — «Пришел не осуждать, а утешать и крестить тех, кто нуждался в этом».

1992

В Москве, в КИБ № 2 умирает первый в СССР больной СПИДом.

1993

Умирает первый больной СПИДом в Казахстане.

Зарегистрирован российский аналог азидотимидина. Одним из основных его разработчиков был академик РАН А.А. Краевский.

ке и борьбе со СПИДом и контроль за реализацией Программы противодействия эпидемии СПИДа в Республике Казахстан на 2002–2005 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2002 года № 1207.

4. Комитету государственного санитарно-эпидемиологического надзора обеспечить курацию и координацию эпидемиологических вопросов по проблеме СПИДа, Департаменту лечебно-профилактической работы — вопросам по разделам оказания лечебной помощи лицам, инфицированным ВИЧ и СПИДом, по наркологии, дерматовенерологии, туберкулеза, охраны здоровья матери и ребенка, обеспечения безопасности донорства касательно проблем СПИДа.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на вице-министра Белоног А.А.

И. о. министра

А. Айдарханов

- 6.3. Выдача гражданам справок-сертификатов, подтверждающих отрицательные результаты обследования на антитела к ВИЧ, разрешается только в случаях, когда таковые требует принимающая сторона при поездке за границу. Справка-сертификат может быть выдана только в том случае, если обследуемый при явке на обследование предъявил документ, удостоверяющий личность. Выдачу справок — сертификатов производят центры по профилактике и борьбе со СПИДом.
- 6.4. Окончательный результат о носительстве ВИЧ выдает референс-лаборатория Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД.
- 6.5. Медицинские работники и другие лица, которым в связи с выполнением служебных обязанностей стали известны сведения о проведении и результатах медицинского освидетельствования на выявление заражения вирусом иммунодефицита человека, обязаны сохранять эти сведения в тайне, охраняемой законом.
- 6.6. Практическое осуществление и ответственность за исполнение настоящих Правил возлагается на отделы, управления, департаменты здравоохранения местных исполнительных органов.

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

г. Астана

№ 708 от 19.07.2002 г.

ПРИКАЗ

Об утверждении программы противодействия эпидемии СПИДа Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2002–2005 годы

В целях реализации Программы по противодействию эпидемии СПИДа в Республике Казахстан на 2001–2005 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2002 года № 1207, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Программу противодействия эпидемии СПИДа Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2002–2005 годы.
2. Руководителям комитетов и департаментов Министерства здравоохранения Республики Казахстан, начальникам управлений (департаментов) здравоохранения, областей, гг. Астаны и Алматы принять меры по реализации программы.
3. Главным государственным санитарным врачам областей, гг. Астаны и Алматы обеспечить курацию центров по профилак-

1994

Принят действующий ныне закон «О профилактике заболевания СПИД в Республике Казахстан». Данный закон особо выделяет эффективную профилактику и декларирует социальные и медицинские государственные гарантии населению, медицинским работникам и людям, живущим с ВИЧ/СПИДом.

1995

В 1995 году на Украине начинается эпидемия ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков (ПИН). В середине года российские специалисты-эпидемиологи выражают обеспокоенность тем, что эпидемия может начать распространяться среди ПИН России. Такие же предположения делают эпидемиологи Казахстана.

Ряд американских и европейских фармацевтических компаний почти одновременно заявили о создании нового класса препаратов по лечению ВИЧ-инфекции — ингибиторов протеазы. В 1995 году сразу на нескольких международных конференциях по СПИДу были представлены доклады о поразительных результатах, показанных ингибиторами протеазы. Говоря коротко, разработка новых препаратов вплотную приблизила момент, когда ВИЧ-инфекция станет управляемым заболеванием, как, например, сахарный диабет. Люди, знающие о наличии у них ВИЧ, получили новую, и очень большую, надежду.

Неправительственные организации стали принимать непосредственное участие в работе по предотвращению негативных последствий эпидемии. В Казахстане создано более 20 некоммерческих проектов, целью которых являются профилактика ВИЧ и поддержка людей, практикующих наиболее рискованное поведение.

1996

До этого времени в СССР, а позднее в новых постсоветских государствах, в том числе в Казахстане, основным путем передачи инфекции был проникающий сексуальный контакт без использования презерватива. В 1996 году вирус попадает в среду потребителей инъекционных наркотиков, и ВИЧ-инфекция начинает распространяться в геометрической прогрессии.

В Казахстане зарегистрирована вспышка ВИЧ-инфекции среди инъекционных потребителей наркотиков в г. Темиртау Карагандинской области. В 1996 году на Темиртау приходилось около 90% ВИЧ-инфицированных от общего числа всех случаев, зарегистрированных в республике.

Инъекционное употребление наркотиков становится основным путем заражения. Новые случаи инфекции за год исчисляются уже не десятками, а тысячами. Становится понятно, что существующая сис-

тема СПИД-центров в одиночку не может справиться с нарастающим числом новых ВИЧ-инфицированных. Дополнительная сложность заключается в том, что большинство новых ВИЧ-инфицированных являются ПИН. В странах СНГ, в том числе в Казахстане, на тот момент еще нет опыта работы с ПИН, проводимой с целью содействовать изменению их поведения и предупредить распространение заболеваний, передающихся через кровь.

Остро встает вопрос о необходимости объединения усилий различных структур здравоохранения, правоохранительных органов, исполнительной власти и неправительственных организаций. Осознается потребность в проведении социологических и медицинских исследований в данной целевой группе.

На смену Глобальной программе ВОЗ по СПИДу приходит Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС). Основные цели программы:

- развитие эффективной политики в отношении ВИЧ-инфекции;
- объединение ресурсов и усилий правительственных и неправительственных организаций и отдельных людей на местном, национальном и международном уровнях.

1997

В Казахстане начинают работать сразу несколько проектов, направленных на изучение потребителей наркотиков как социальной группы и организацию в этой среде профилактических мероприятий. Наиболее крупные проекты развернуты в Карагандинской области (г. Темиртау и г. Алматы). Все они финансируются международными фондами и организациями.

В конце года в Республике Казахстан представители около 30 неправительственных организаций заявляют, что будут работать в области профилактики ВИЧ, предоставления помощи ВИЧ-инфицированным и людям, практикующим наиболее рискованное поведение. К этой работе подключаются организации, ранее занимавшиеся только профилактикой наркопотребления и вопросами сексуального здоровья населения. Профилактика ВИЧ-инфекции перестает быть исключительно медицинской проблемой и признается проблемой всего общества.

Создан Глобальный бизнес-совет по ВИЧ/СПИДу — первый международный орган, координирующий участие коммерческих структур в борьбе с эпидемией. ЮНЭЙДС начинает первый этап «инициативы по доступу к лечению», проекта по обеспечению доступности лекарств для развивающихся стран.

Американские центры по контролю заболеваемости впервые регистрируют снижение уровня смертности от СПИДа в США по сравнению с предыдущим годом, связанное с применением новых методов лечения.

- тяжело протекающие инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), — сифилис, гонорея, урогенитальный хламидиоз, генитальный герпес, вирусный папиломатоз, трихомоноз и др.;
 - генерализованная цитомегаловирусная инфекция;
 - генерализованная хроническая инфекция, вызванная вирусом простого герпеса;
 - рецидивирующий опоясывающий лишай у лиц младше 60 лет;
 - тяжелые хронические воспалительные заболевания гениталий неясной этиологии у женщин;
 - инвазивные новообразования женской половой сферы;
 - гепатиты В, С, D;
 - мононуклеоз (через три месяца от начала заболевания);
 - больные гемофилией и другими заболеваниями, систематически получающие переливание крови.
- 4.3. Другие состояния:
- беременность в случаях:
 - употребления когда-либо женщиной или ее половым партнером инъекционных наркотиков;
 - если женщина или ее половой партнер когда-либо страдали ИППП;
 - дети, родившиеся от ВИЧ-инфицированных матерей.

Лица со всеми указанными симптомами, синдромами, заболеваниями и состояниями имеют право отказаться от прохождения тестирования, и этот отказ не может служить основой для каких-либо ограничений, связанных с предоставлением им медицинской помощи.

5. Принудительное обследование на ВИЧ

- 5.1. Принудительное обследование на ВИЧ осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Заключительные положения

- 6.1. Обследование на ВИЧ проводят все лаборатории, имеющие государственную лицензию на право заниматься ИФА-диагностикой ВИЧ-инфекции. Положительные на ВИЧ сыворотки направляются для переконтроля в территориальные центры по профилактике и борьбе со СПИДом.
- 6.2. Результаты тестирования сообщаются обследуемому лично в ходе психосоциального послетестового консультирования. Положительные результаты сообщаются врачом центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Исключение составляют случаи принудительного тестирования, когда психосоциальное консультирование обследуемого может не представиться возможным.

2. Добровольное обследование

2.1. Все граждане Республики Казахстан, иностранные граждане и лица без гражданства, изъявившие желание пройти медицинское освидетельствование на ВИЧ, обследуются по выбору обследуемого: без предъявления документов (анонимно), с предъявлением документов или личных данных (конфиденциально, с соблюдением врачебной тайны).

3. Обязательное обследование

3.1. Обязательному обследованию подлежат доноры крови и других биологических жидкостей, органов и тканей — при каждом взятии.

4. Обследование по клиническим показаниям (взрослых и детей)

4.1. Синдромы и симптомы неясного происхождения:

- лихорадка длительностью более 1 месяца;
- увеличение двух и более групп лимфатических узлов более 1 месяца;
- диарея длительностью более 1 месяца;
- необъяснимая потеря массы тела 10% и более.

4.2. Предполагаемые или подтвержденные заболевания:

- затяжные рецидивирующие пневмонии и хронические бронхиты, не поддающиеся обычной терапии;
- пневмоцистная пневмония;
- туберкулез легочный и внелегочный;
- затяжные рецидивирующие пиодермии, не поддающиеся обычной терапии;
- кандидоз пищевода, бронхов, трахеи, легких, слизистых оболочек полости рта и носа;
- глубокие микозы (криптококкоз, споротрихоз, аспергиллез, изоспороз, гистоплазмоз, стронгилоидоз, актиномикоз и др.);
- саркома Капоши;
- ворсистая лейкоплакия языка;
- сепсис, затяжные и рецидивирующие гнойно-бактериальные заболевания внутренних органов;
- лимфома головного мозга;
- подострый менингоэнцефалит;
- прогрессирующая очаговая лейкоэнцефалопатия;
- токсоплазмоз центральной нервной системы;
- первичное слабоумие у лиц ранее здоровых;

Общее число людей, умерших от СПИДа, во всем мире составляет около 6,4 миллиона. Примерное число людей с ВИЧ-инфекцией в мире — 22 миллиона.

2001

В Казахстане наблюдается тенденция к росту заболеваемости во многих регионах.

Размах эпидемии в Казахстане еще не достиг угрожающих масштабов, как в России, на Украине и в Беларуси. По уровню распространенности ВИЧ-инфекции Республика Казахстан находится на четвертом месте среди стран, расположенных на территории бывшего СССР.

2002

2002 год — год начала работы международной неправительственной гуманитарной организации «СПИД Фонд Восток Запад» (*AIDS Foundation East-West — AFEW*) в Республике Казахстан. Деятельность *AFEW* началась с проекта «Консультирование до и после теста на ВИЧ» для медицинских работников и представителей НПО города Алматы и Алматинской области.

В Казахстане утверждены новые правила медицинского освидетельствования на выявление заражения вирусом иммунодефицита человека, которые предусматривают добровольное консультирование и тестирование на ВИЧ, а также внедрение дозорного эпиднадзора среди групп риска.

2003

В Республике Казахстан за 2003 год были проконсультированы 189 684 человека. Всего в РК кабинетов психосоциального консультирования (ПСК) — 203, кабинетов анонимного тестирования (АТ) — 200.

2004

12 февраля 2004 года приказом № 150 Министерства здравоохранения РК утверждены протоколы по предоставлению помощи и лечению при ВИЧ-инфекции и СПИДе.

Увеличилось количество кабинетов ПСК (до 221) и кабинетов анонимного тестирования (до 207).

По данным Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом с 1 января 1987 года по 1 декабря 2004 года в Казахстане были зарегистрированы 4631 случай ВИЧ-инфицирования (из них 221 человек — больные СПИДом, 251 — беременные женщины, 133 — дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей. На 1 декабря 2004 года число умерших от СПИДа в Республике Казахстан — 181 человек.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, для получения близкого к истинному значению количества

ВИЧ-инфицированных в стране на определенный момент официальные данные следует умножать на коэффициент от 5 до 10.

Большинство людей, живущих с ВИЧ или находящихся под угрозой заражения, составляют потребители инъекционных наркотиков (для Казахстана – 78%).

В обществе сформировались предпосылки для распространения ВИЧ-инфекции: совместное использование инъекционного инструментария, ограниченная распространенность практики безопасных сексуальных отношений, а также тот факт, что целевые программы системы здравоохранения находятся на начальной стадии развития.

Потенциал для дальнейшего распространения эпидемии огромен: по оценкам, в Республике Казахстан число потребителей инъекционных наркотиков составляет 140 000 человек. Очевидно, что сотням тысяч ПИН и их сексуальным партнерам грозит прямой риск инфицирования.

Таким образом, эпидемиологию ВИЧ-инфекции в Казахстане можно разделить на периоды:

- первый (1987–1989) — период появления ВИЧ-инфекции в Казахстане, когда случаи ВИЧ были выявлены среди иностранных граждан (студентов из стран Африканского региона);
- второй (1990–1995) — период регистрации местных случаев среди граждан Казахстана (для этого периода в основном характерен половой путь передачи: гомосексуальный путь передачи составил 35%, гетеросексуальный — 25%);
- третий (после 1996 года) — период осложнения эпидемиологической ситуации по ВИЧ/СПИДу в Республике Казахстан из-за вспышки ВИЧ-инфекции среди ПИН в г. Темиртау Карагандинской области.

2005

История продолжается...

пройти как условие продолжения его дальнейшей деятельности (доноры крови и других биологических жидкостей, органов и тканей);

- обследование по клиническим показаниям — обследование лиц, имеющих клинические показания, с их согласия на основе полной информации;
- обследование на основе полной информации — обследование на ВИЧ, выполняющееся только после того, как обследуемый в ходе предтестового консультирования получил полную информацию обо всех последствиях обследования на ВИЧ, а также об альтернативе данному обследованию;
- психосоциальное консультирование — конфиденциальный диалог между консультируемым и консультантом, имеющий целью обсуждение задач и причин обследования, оценки степени риска заражения ВИЧ-инфекцией, связанной с особенностями поведения консультируемого, определение эмоциональных реакций и возможных последствий после сообщения результатов теста, обучение навыкам безопасного поведения;
- принудительное обследование — обследование на ВИЧ на основе полной информации по постановлению уполномоченного правоохранительного органа, выданного в установленном порядке, вне зависимости от получения согласия со стороны обследуемого. Результаты такого обследования предоставляются только стороне, направившей обследуемого на принудительное обследование.

1.3. В Республике Казахстан проводятся следующие виды обследований:

- добровольное — анонимное или конфиденциальное на основе полной информации;
- обязательное — конфиденциальное с согласия обследуемого, полученного на основе полной информации;
- по клиническим показаниям — анонимное или конфиденциальное с согласия обследуемого, полученного на основе полной информации;
- принудительное — обследование на ВИЧ по постановлению уполномоченного правоохранительного органа.

Целями обследования на ВИЧ являются:

- обеспечение безопасности гемотрансфузий и трансплантаций;
- проведение эпидемиологического мониторинга: оценки уровня распространенности ВИЧ-инфекции, степени пораженности отдельных групп населения для прогнозирования эпидемии и определения групп, нуждающихся в предоставлении профилактических программ в первоочередном порядке;
- установление диагноза ВИЧ-инфекции.

Комитету государственного санитарно-эпидемиологического надзора обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

Контроль за исполнением приказа возложить на вице-министра здравоохранения Республики Казахстан Белоног А.А.

Министр

Ж. Доскалиев

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Министерства
здравоохранения Республики
Казахстан от 11 июля 2002 года № 575

ПРАВИЛА

медицинского освидетельствования на выявление заражения вирусом иммунодефицита человека

1. Общие положения

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 5 октября 1994 года «О профилактике заболевания СПИД» и от 19 мая 1997 года «Об охране здоровья граждан в Республике Казахстан», постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 декабря 2000 года № 1808 «О концепции государственной политики по противодействию эпидемии СПИДа в Республике Казахстан», постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2001 года № 1207 «Об утверждении Программы противодействия эпидемии СПИДа в Республике Казахстан на 2001–2005 годы», устанавливающих порядок проведения специальных мер профилактики заболевания СПИДом и направлены на выявление заражения вирусом иммунодефицита человека граждан Казахстана и других лиц, находящихся на территории республики.

1.2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

- добровольное обследование — обследование людей по их желанию на основе полной информации;
- анонимное обследование — обследование людей без предъявления документов, удостоверяющих личность;
- конфиденциальное обследование — обследование, при котором о результатах знают только обследуемый и медицинские работники, непосредственно оказывающие ему помощь. Результаты конфиденциального обследования не разглашаются и не передаются никакой третьей стороне;
- обязательное обследование — обследование с согласия обследуемого на основе полной информации, которое он должен

Раздел II

Консультирование до и после теста на ВИЧ

1. Международный опыт и рекомендации¹

Добровольное консультирование и тестирование (ДКТ) на ВИЧ доказало свою важную роль как в профилактике ВИЧ, так и в качестве отправной точки для оказания медицинской помощи людям, инфицированным ВИЧ. ДКТ дает возможность узнать и воспринять свой серологический статус в отношении ВИЧ в конфиденциальной обстановке, с предоставлением консультации и направлением на постоянное медицинское обслуживание и получение эмоциональной поддержки. В случае положительного результата теста на ВИЧ преимуществом, которое дает тестирование, является возможность предоставления соответствующего медицинского обслуживания и вмешательств на ранней стадии для лечения и/или профилактики болезней, сопутствующих ВИЧ. Беременные женщины, которым известен их сероположительный статус, могут предотвратить передачу вируса своим детям. Знание серологического статуса в отношении ВИЧ может также помочь людям принять соответствующие решения, чтобы защитить от инфекции себя и своих сексуальных партнеров. Исследования, проведенные в последнее время, показали, что ДКТ может быть экономически выгодным средством профилактики передачи ВИЧ.

2. Законодательная база для проведения тестирования на ВИЧ и консультирования

Министерство здравоохранения Республики Казахстан
Приказ № 708 от 19 июля 2002 г.

Об утверждении Программы
противодействия эпидемии СПИДа
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан на 2002–2005 годы

4.3. Добровольное освидетельствование и консультирование населения на ВИЧ-инфекцию

Открытие кабинетов до- и послетестового консультирования на ВИЧ во всех населенных пунктах с населением более 50 000 жителей,

¹ Технический обзор ЮНЭЙДС: Добровольное консультирование и тестирование (ДКТ). — ЮНЭЙДС, 2000.

в крупных городах в разных районах на базе лечебно-профилактических организаций из расчета не менее одного на 50 000 жителей.

Обеспечение преемственности между кабинетами до- и послетестового консультирования на ВИЧ и лечебно-профилактическими организациями, прежде всего наркологического, кожно-венерологического, акушерско-гинекологического и противотуберкулезного профиля.

4.4. Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку

Разработка и внедрение национального протокола профилактического лечения перинатальной трансмиссии ВИЧ-инфекции. Обеспечение специфическим профилактическим лечением всех нуждающихся ВИЧ-инфицированных беременных женщин и новорожденных.

Обеспечение всех детей, родившихся от матерей с ВИЧ-инфекцией, искусственным питанием на бесплатной основе.

Обеспечение доступа беременных женщин к анонимному добровольному тестированию на ВИЧ.

3. Консультирование и тестирование на ВИЧ

3.1. Историческая справка²

Службы консультирования и тестирования на антитела к ВИЧ возникли в 1985 году. Консультирование признано помочь людям правильно истолковать значение положительных и отрицательных результатов теста на антитела. В основе консультирования — понимание сложности процесса осознания статуса инфицированного ВИЧ.

С ростом распространенности ВИЧ все более актуальной становится информация о новых случаях инфицирования. С 1987 года ВИЧ-консультирование и тестирование стали применяться значительно шире. В настоящее время ДКТ предлагается всем, кто проходит лечение от ИППП, наркотической зависимости, а также клиентам репродуктивных центров. Цель консультирования и тестирования — уменьшить риск распространения ВИЧ-инфекции. Основная задача — помочь неинфицированным людям приобрести навыки поведения, снижающего риск инфицирования, а инфицированным клиентам — не заразить других и своевременно получить необходимую помощь и поддержку.

3.2. Элементы добровольного консультирования и тестирования на ВИЧ³

Добровольное консультирование и тестирование (ДКТ) на ВИЧ — это процесс, благодаря которому человек получает информацию, не-

ними, при необходимости консультируя его у других специалистов. Необходимо довести до клиента, что в случае отсутствия признаков заболевания ВИЧ/СПИДом определить, инфицирован человек или нет, только при помощи обычного тестирования невозможно. Следует убедить клиента периодически проходить обследования, пока окончательно не будет установлен его серологический статус, а до этого времени — предпринимать все меры предосторожности, рекомендуемые для ВИЧ-позитивных людей.

При разработке методического письма были использованы материалы:

1. Приказ Минздрава Республики Казахстан от 23.11.1994 г. № 445 «О мерах по реализации Закона Республики Казахстан «О профилактике заболевания СПИДом».
2. Сборник научно-практических работ «Медико-социальная служба и ее значение в профилактике СПИДа и других актуальных инфекций». — СПб., 1998.
3. Справочник по обучению консультированию по ВИЧ/СПИДу. — ВОЗ, Глобальная программа по ВИЧ/СПИДу.
4. Консультирование по ВИЧ/СПИДу, рекомендации, Глобальная программа.

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

г. Астана

№ 575 от 11 июля 2002 г.

ПРИКАЗ

Об утверждении Правил медицинского освидетельствования на выявление заражения вирусом иммунодефицита человека

В целях реализации законов Республики Казахстан от 5 октября 1994 года «О профилактике заболевания СПИД», от 19 мая 1997 года «Об охране здоровья граждан в Республике Казахстан», постановления Правительства Республики Казахстан от 5 декабря 2000 года № 1808 «О концепции государственной политики по противодействию эпидемии СПИДа в Республике Казахстан», постановления Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2001 года № 1207 «Об утверждении Программы противодействия эпидемии СПИДа в Республике Казахстан на 2001–2005 годы»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить прилагаемые Правила медицинского освидетельствования на выявление заражения вирусом иммунодефицита человека (далее Правила).

² Руководство по ВИЧ-консультированию, тестированию и направлению к специалистам. — CDC, 1994.

³ Технический обзор ЮНЭЙДС: Добровольное консультирование и тестирование (ДКТ). — ЮНЭЙДС, 2000.

Консультант должен:

- дать четкое объяснение значению положительного результата;
- подробно разъяснить разницу между инфекцией ВИЧ и СПИДом;
- объяснить, где и как можно получить психоэмоциональную поддержку и помощь во время последующих критических ситуаций;
- поддерживать позитивные тенденции в поведении инфицированного.

Напомнив, что по результатам теста нельзя судить о том, когда произошло заражение, консультант обсуждает с инфицированным лицом проблему оповещения половых партнеров и целесообразность информирования близких. Почти во всех случаях решение о сообщении сведений должно приниматься самим инфицированным лицом. Потребность в консультировании и психологической поддержке наиболее велика в том случае, когда на сообщение о наличии антител к ВИЧ пациент отвечает проявлением так называемых психоэмоциональных реакций. Некоторые реакции могут быть очень выраженными, но следует помнить о том, что подобные проявления являются нормальным ответом человека на новость, которая угрожает его жизни.

Проявление психоэмоциональных реакций следует предвидеть и быть готовым к оказанию помощи в этой ситуации.

Консультирование после неопределенного (сомнительного) результата тестирования

Результат теста считается неопределенным (сомнительным, спорным), если он не является определенно положительным или определенно отрицательным. В таком случае консультант должен решить два вопроса:

Тип применяемого теста

Если результат теста неопределенный, необходимо исследование повторить. Второй образец крови необходимо взять как минимум через две недели после первого и протестировать с помощью рекомендованной методики.

Если же тестирование и второго образца сыворотки дает сомнительный результат, необходимо еще раз повторить исследование через месяц и, в случае сомнительного результата, считать данного человека ВИЧ-негативным.

Профилактика и поддержка после неопределенного результата теста:

Период неуверенности после неопределенного результата теста может продлиться до трех месяцев и более, вплоть до получения окончательного результата. Чувство неуверенности, связанное с этим периодом, может привести к серьезным психологическим трудностям. Консультант должен оценить их и помочь клиенту справиться с

обходимую ему для принятия ответственного решения в отношении тестирования на ВИЧ и связанных с этим последствий. Это решение принимается исключительно самим клиентом — специалист предоставляет информацию, психологическую поддержку и обеспечивает конфиденциальность.

Консультирование по ВИЧ/СПИДу

Консультирование по вопросам ВИЧ/СПИДа определяется как «конфиденциальный диалог между клиентом и консультантом, помогающий человеку справиться со стрессом и принять информированные и ответственные решения, связанные с ВИЧ/СПИДом. Процесс консультирования включает оценку личного риска передачи ВИЧ и помощь в переходе к профилактическому поведению»⁴. Основными целями консультирования являются:

- предотвращение распространения ВИЧ-инфекции;
- оказание помощи и поддержки людям, жизнь которых оказалась связанной с ВИЧ-инфекцией.

Консультирование должно быть гибким, сосредоточенным на конкретных потребностях и ситуации клиента. Фактическое прохождение теста клиентом, как результат консультирования, не является обязательным. Важно помочь клиенту в формировании ответственного, снижающего риск или безопасного поведения. Этот процесс включает в себя три основных компонента (задачи консультанта):

- выяснение потребностей клиента,
- предоставление необходимой клиенту достоверной информации,
- оказание клиенту психологической поддержки в процессе принятия им решений.

Консультации могут проводить специалисты различного профиля, включая работников здравоохранения или социального обеспечения, добровольцев-неспécialистов, сотрудников общественных организаций, людей, живущих с ВИЧ/СПИДом (ЛЖВС), и других членов сообщества, прошедших специальную подготовку.

Специалисты, проводящие консультирование до и после теста на ВИЧ, должны обладать базовыми знаниями по медицине и психологии. Медицинские знания необходимы для предоставления корректной информации по теме; знания психологии — для оказания психологической поддержки человеку, который находится в сложной ситуации выбора, стресса и даже кризиса. Консультант должен относиться к клиенту как к уникальной, самостоятельной личности, обладающей правом самостоятельного выбора. Давление со стороны консуль-

⁴ Консультирование в связи с ВИЧ/СПИДом: подход к обслуживанию для работников, определяющих политику, планирующих и внедряющих консультационные услуги. — ВОЗ/ГПА, Женева, 1994.

танта мешает клиенту найти правильное решение и осознать всю меру принимаемой в этой связи ответственности⁵.

Добровольное тестирование

Тестирование на ВИЧ имеет большое значение для клиента: знание ВИЧ-статуса предоставляет человеку определенные преимущества. Вместе с тем не следует забывать, что ВИЧ может оказаться причиной серьезных негативных последствий в виде отторжения со стороны общества и близких людей. Отчуждение может стать препятствием к получению ВИЧ-положительными людьми ухода и поддержки, а также к предотвращению дальнейшей передачи ВИЧ. Именно поэтому ЮНЭЙДС настаивает на обязательном соблюдении принципа добровольности при тестировании, которое следует проводить одновременно с мероприятиями, направленными на борьбу со стигматизацией и дискриминацией. Информация о положительном результате теста может послужить причиной для внутреннего кризиса: все планы на будущее рушатся, человек начинает воспринимать себя как «никчемное, плохое создание». Как следствие, человек теряет уверенность в собственных силах и возможностях, становится менее активным в плане защиты окружающих от заражения и в плане защиты своего здоровья.

Тестирование на ВИЧ-инфекцию должно проводиться на добровольной основе и при наличии информированного согласия. Информированное согласие означает, что клиент самостоятельно принимает решение о прохождении теста на ВИЧ, руководствуясь объективной информацией о ВИЧ/СПИДе и анализом возможных преимуществ и последствий, связанных с возможным положительным результатом. Получение информированного согласия происходит во время консультирования клиента, до прохождения теста на ВИЧ.

3.3. Процесс консультирования⁶

Процесс консультирования делится на три этапа: **дотестовое, послетестовое и последующее** консультирование. Консультирование по поводу ВИЧ следует адаптировать к нуждам клиентов. Оно может проводиться индивидуально, для конкретной пары, для ребенка или группы детей. Консультирование должно соответствовать потребностям и возможностям тех учреждений, в которых оно осуществляется. Содержание и подходы консультирования могут в значительной мере варьироваться в зависимости от целевой группы: мужчины, женщины, подростки, МСМ, ПИН, секс-работники и т.д. Содержание и подходы могут отражать контекст вмешательства: например, консультирование в связи с конкретными вмешательствами (профилактическое лечение туберкулеза — ПЛТ, профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку).

⁵ Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. — М.: Академический проект, 1999.

⁶ Технический обзор ЮНЭЙДС: Добровольное консультирование и тестирование (ДКТ). — ЮНЭЙДС, 2000.

го результата тестирования на ВИЧ, обеспечения надлежащей информацией, оказания эмоциональной поддержки и помощи в выборе поведения, снижающего риск заражения.

Содержание консультирования зависит от результатов теста: положительный, отрицательный и сомнительный.

Тестирование позволяет выделить три категории людей, которые нуждаются в послетестовом консультировании:

- те, кто оказался инфицирован ВИЧ и нуждается в поддержке;
- ВИЧ-серонегативные лица из категории высокого риска;
- ВИЧ-серонегативные лица из категории низкого риска.

Во время послетестового консультирования при отрицательном результате теста консультант должен повторить всю информацию, которую он предоставил до тестирования. Это делается для того, чтобы обратившийся знал наверняка, чего нельзя делать, чтобы избежать заражения. Таким образом, в процессе послетестового консультирования при отрицательном результате консультант обсуждает значение полученного результата, напоминает о наличии «периода окна» и рекомендует повторить исследование через 3–6 месяцев, а также подкрепляет необходимость придерживаться правил безопасного поведения в отношении ВИЧ-инфекции.

Послетестовое консультирование при положительном результате представляет собой кризисное консультирование. Пациенту следует предоставить время для восприятия известия, для того, чтобы пережить шок, вызванный диагнозом, а затем оказать психологическую поддержку. Врач должен дать пациенту четкую информацию о долгосрочной природе ВИЧ-инфекции и о возможных путях развития болезни. В основе методики консультирования по разрешению проблем — эмоциональная поддержка и сочувствие. Консультирующему, с одной стороны, необходимо убедить клиента, что в течение длительного времени он сможет вести социально полноценный образ жизни, но, с другой стороны, акцентировать его внимание на том, что теперь от него во многом зависит безопасность окружающих людей, в том числе близких и друзей. Основываясь на знании о рискованном поведении, клиент должен принять решение о его изменении. Клиента следует убедить в необходимости заботы и о своем собственном состоянии здоровья, необходимости предохраняться от различных заболеваний и инфекций, способных ослабить иммунную систему и ускорить развитие СПИДа (особенно ИППП).

Консультант не должен:

- поддаваться панике;
- давать ложные заверения;
- обижаться на поведение консультируемого.

Консультант должен учитывать, что обратившийся может:

- быть слишком напуган, растерян, чтобы осознать сказанное консультантом;
- не понимать, почему его спрашивают об интимной жизни и не желать отвечать на подобные вопросы;
- возлагать на тест нереальные надежды;
- не высказывать желания изменить поведение.

Консультант должен рассказать обратившемуся о порядке последующего тестирования с целью подтверждения положительного результата. Положительный результат, полученный методом ИФА, нуждается в подтверждающем исследовании. Когда человек хочет пройти тестирование, но не имеет в анамнезе рискованного поведения, консультанту следует уточнить причину подобной озабоченности и предложить поддерживающее консультирование. Сведения и выводы, полученные в процессе беседы, заносятся консультантом в журнал консультативного приема. Результаты тестирования по телефону не сообщаются. Их сообщает консультант при послетестовом консультировании, время которого оговаривается с консультируемым до прохождения теста.

Особенности проведения дотестовой консультации для потребителей инъекционных наркотиков

Если в процессе проведения консультирования у пациентов выявляется риск заражения ВИЧ-инфекцией в связи с употреблением наркотиков, следует акцентировать внимание пациента на высоком риске передачи ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов при парентеральных вмешательствах.

Необходимо установить, стоит ли в данный конкретный момент обсуждать с пациентом вопрос о прохождении обследований на ВИЧ: например, в ситуации, когда он находится под воздействием определенного препарата? Если пациент недавно начал лечение, следует повременить с обсуждением возможности обследования, поскольку положительный результат теста может сам по себе привести к нежелательной реакции.

Период получения результата является особенно опасным для потребителей наркотиков, поэтому необходимо предусмотреть время для обсуждения непосредственно после предоставления результата.

Вне зависимости от результата тестирования следует убедить клиента в необходимости использования методик снижения вреда, которые включают: отказ от приобретения шприцев с наркотиками, отказ от употребления общих игл и шприцев, приобретение навыков дезинфекции инструментов, использование практик безопасного секса.

Послетестовое консультирование — это диалог между пациентом и работником органа здравоохранения с целью обсуждения полученно-

Установление хороших отношений, проявление уважения и понимания облегчают решение проблем в трудных обстоятельствах. Очень важно, в какой манере и каким тоном человеку сообщают о серологическом статусе. В идеальном случае консультирование в рамках ДКТ предполагает по меньшей мере две консультации — до и после теста. Могут проводиться дополнительные консультации до или после тестирования или в период ожидания клиентом результата теста.



4. Основы консультирования

4.1. Принципы консультирования

Клиент-центрированный подход⁷

Работа, построенная по принципу «клиент в центре внимания», представляет собой интерактивный процесс, основанный на индивидуальных потребностях клиента. Консультант не использует жестких схем, его действия направлены на побуждение клиента к размышлениям, высказываниям и самостоятельному принятию решений. Консультант не просто предоставляет информацию. Его цель — обсуждение возможных профилактических мероприятий и решений, принятых клиентом в отношении собственного будущего. При таком подходе требуется понимание личных особенностей клиента: поведения, образа жизни, сексуальных предпочтений, расы/этнической группы, культуры, уровня знаний, социального и экономического положения, а также признание за индивидуумом права и способности к свободному выбору и самоопределению.

Конфиденциальность

Конфиденциальность означает запрет на любое обсуждение ситуации или проблем клиента с посторонними людьми.

Многие люди боятся обращаться за услугами в области ВИЧ из-за боязни последствий (отчуждения со стороны семьи и/или общества). Для них весьма важно наличие гарантированной конфиденциальности. Конфиденциальность помогает установить доверительные отношения между консультантом и клиентом, которые необходимы для обсуждения вопросов профилактики ВИЧ и предоставления услуг по уходу. В некоторых обстоятельствах человеку, обратившемуся за ДКТ, может потребоваться присутствие на консультации его сексуального партнера, родственника или друга. Такое участие в конфиденциальных проблемах может быть не только уместным, но и весьма полезным для всех⁸.

Соблюдать конфиденциальность особенно важно при групповом консультировании. Предварительно каждый человек в группе должен подтвердить свое согласие на участие в групповом консультировании и принять на себя ответственность за неразглашение информации о других участниках.

⁷ Руководство по ВИЧ-консультированию, тестированию и направлению к специалистам. — CDC, 1997.

Данный подход отличается от подхода, предлагаемого К. Роджерсом (См.: К. Роджерс. Клиент-центрированная психотерапия: теория, современная практика и применение. — М., 2002), хотя навыки и стратегии совпадают.

⁸ Технический обзор ЮНЭЙДС: Добровольное консультирование и тестирование (ДКТ). — ЮНЭЙДС, 2000.

просы очень личного свойства, а также заверений относительно соблюдения конфиденциальности.

Консультант оценивает:

- особенности сексуального поведения;
- частоту смены сексуальных партнеров;
- правильность и частоту использования презервативов;
- наличие ВИЧ-инфицированного среди сексуальных партнеров;
- риск инфицирования (инъекционное употребление наркотиков, наличие среди сексуальных партнеров лиц, занимающихся коммерческим сексом, а также мужчин, вступающих в сексуальные отношения с мужчинами);
- наличие в прошлом гемотрансфузий, использование продуктов крови, пересадка органов;
- риск от нестерильных инвазивных процедур (инъекции, татуировка, надрезы).

Консультант выясняет:

- что думает обратившийся о своей реакции на положительный или отрицательный результат тестирования;
- кто поддержит обратившегося в случае положительного результата тестирования; консультант должен выявить и обсудить все неверные представления о планируемом тесте и убедиться в том, что обратившийся понимает значение положительного результата.

Консультант поясняет, что тест определяет только наличие антител к вирусу иммунодефицита человека. Присутствие антител к ВИЧ является доказательством наличия ВИЧ-инфекции, но не позволяет судить о других, связанных с ВИЧ-инфекцией болезнях, ни в настоящем, ни в будущем.

Консультант подчеркивает, что:

- не существует теста, который мог бы определить, как быстро ВИЧ может перейти в стадию СПИДа;
- на основании положительного результата тестирования нельзя сказать, когда произошло заражение;
- заражение ВИЧ не обязательно говорит о неверности партнера, так как оно могло произойти до начала данных взаимоотношений.

Необходимо разъяснить клиенту, что означает «период окна» (промежуток времени между заражением ВИЧ и появлением антител к ВИЧ), когда человек уже заражен, но при исследовании крови антитела к ВИЧ еще не обнаруживаются.

Консультант должен объяснить, что нужно делать, чтобы не приобрести и не передать ВИЧ в этот период (3–6 месяцев).

Дотестовое консультирование — это диалог между клиентом и работником органа здравоохранения на тему обследования на ВИЧ и его возможных результатах.

Цель: осознанное согласие клиента на тестирование на основе знаний о ВИЧ-инфекции, полученных при консультации, подготовка его к адекватному восприятию результатов тестирования, оценка степени личного риска и разработка планов по снижению риска в поведении.

С целью повышения уровня осведомленности и знаний о ВИЧ-инфекции желательно дотестовое консультирование проводить всем обратившимся в отдел лечебно-профилактической помощи (диспансерный отдел) центров СПИД.

Не должно быть никакого давления или принуждения при направлении на ВИЧ-тестирование, иначе оно может оказаться малоэффективным и не будет рассматриваться как истинно добровольное.

В процессе консультирования должны быть выяснены следующие основные моменты:

- личная история пациента;
- оценка степени риска в прошлом;
- степень информированности клиента о ВИЧ-инфекции;
- причина, побуждающая к обследованию;
- обсуждение с клиентом дальнейших аспектов жизни в зависимости от результата обследования на ВИЧ (отрицательный, положительный, спорный);
- информированность о профилактических мерах, которые необходимо соблюдать для собственной безопасности и безопасности окружающих (использование презервативов, одноразовых шприцев, варианты поведения в ситуации с риском заражения и т. п.).

С целью изучения распространения путей и факторов передачи ВИЧ-инфекции среди населения рекомендуется проводить анкетирование (анкеты № 1 и № 2 по дотестовому консультированию прилагаются) всех обратившихся на консультацию лиц. Консультирование может быть проведено в форме совета или беседы, быть откликом на индивидуальные психосоциальные проблемы. Стиль консультирующего должен быть убеждающим, уверенным и открытым, но учитывающим чувство страха клиента. В процессе собеседования все объяснения должны быть даны на языке, понятном клиенту, и в выражениях, доступных его восприятию. Консультируемый должен чувствовать полную свободу в отношении выражения своего согласия или отказа на проведение ВИЧ-тестирования.

Учитывая интимный характер многих сведений и определенную сдержанность в разговоре о половом поведении, получение психосоциального анамнеза требует такта, терпеливого и внимательного разъяснения причин, которые побуждают консультанта задавать во-

Доступность

Консультирование и тестирование на антитела к ВИЧ должно быть доступно любому человеку, которого беспокоит состояние собственного здоровья или возможность заражения ВИЧ. Консультирование должно осуществляться на постоянной основе. Важно, чтобы клиенты были уверены, что всегда могут перезвонить и/или назначить встречу еще раз. Службы консультирования должны быть легко доступны территориально, а их часы работы — удобны для клиентов. В случае если требуется помощь и консультации других служб и специалистов, службы консультирования должны располагать необходимой информацией и предоставлять ее своим клиентам.

Продолжительность консультации для клиента в кризисном состоянии

Консультирование, в зависимости от ситуации и состояния клиента, обычно продолжается от 15 до 30 минут. Если человек находится в кризисном состоянии, консультант должен привлечь к работе специалиста по кризисным состояниям: психотерапевта или психиатра. Как правило, консультанты не обладают навыками работы с людьми в кризисных состояниях, а в этой ситуации важно своевременно распознать состояние кризиса.

Процесс консультирования нельзя «подогнать» под определенный временной стандарт. Во-первых, необходимо предоставить клиенту время на обдумывание вопросов и выражение своего мнения. Во-вторых, время необходимо для установления доверительных отношений. В-третьих, психологические реакции клиента могут оказаться сложными и потребовать достаточного количества времени на разрешение.

Последовательность и четкость

Процесс консультирования должен быть четко структурирован по времени и последовательности изложения. Следует соблюдать принцип «необходимости и достаточности». Начиная консультирование иногда хочется сообщить клиенту как можно больше, но в результате клиент «тонет» в информации. Сохранить баланс поможет ориентация на нужды клиента. Консультант обязан использовать только достоверную информацию и действовать только в рамках своей компетенции. (Для повышения эффективности работы все консультанты должны иметь доступ к постоянному обучению!)

4.2. Личность и индивидуальные особенности консультанта

Кроме необходимых знаний и навыков в области медицины и психологии консультант должен обладать способностью к самодисциплине и уметь сдерживать свои эмоции. Он не обязан любить клиента, но обязан осознавать, что его собственные чувства, взгляды и предрассудки могут отрицательно сказаться на их взаимо-

отношениях. Профессионализм в данном случае заключается в умении предвосхитить возможный конфликт и понять его причины. Если вероятность конфликта велика, то клиента следует направить к другому специалисту. Свои личные эмоции консультанту следует отработать с супервизором.

Для проверки собственных потребностей и мотиваций консультант может задать себе следующие вопросы:

- Какие чувства я испытываю в отношении к людям с ВИЧ-инфекцией или СПИДом? Что я думаю о тех, чье поведение связано с высоким риском инфицирования? Я боюсь? Я подвергаю их критике? Что меня отталкивает или настораживает?
- Существуют ли такие люди или стереотипы поведения, которые я осуждаю настолько сильно, что наверняка не смогу работать, не выказывая своего осуждения?
- Не пытаюсь ли я навязать свои ценности клиентам? Насколько сильно мое желание повлиять на них или их контролировать?
- До какой степени я готов позволить клиентам решать, что им делать?

Отношение консультанта к клиенту должно основываться на принципе уважения и неосуждения.

4.3. Консультативный контакт

Качество консультативного контакта зависит от двух важных факторов: располагающей обстановки и коммуникативных навыков консультанта.

Располагающая обстановка имеет несколько значимых компонентов. Из «физических» компонентов наиболее значимыми являются: обстановка в помещении, где происходит процесс консультирования, расположение консультанта и клиента в пространстве (дистанция, манера сидеть и т.п.), время консультирования. К «эмоциональным» компонентам относятся: атмосфера обоюдного доверия, искренность консультанта, способность консультанта к проявлениям эмпатии и безусловного уважения.

В этом разделе мы рассмотрим эмоциональные компоненты располагающей обстановки и необходимые консультанту коммуникативные навыки (как вербального, так и невербального характера).

4.3.1. Эмоциональные компоненты консультативного контакта

Доверие — один из наиболее важных факторов во взаимоотношениях между консультантом и клиентом. Создать ситуацию обоюдного доверия значит создать атмосферу, располагающую к обсуждению значимых проблем. Насколько это будет успешно, зависит от индивидуальных качеств консультанта и его отношения к процессу консультирования.

должен развить в себе множество навыков, включая навыки слушания, сопереживания и т. п.

Для того чтобы оценить степень риска поведения клиента, консультирующий должен быть в состоянии получить информацию на delicate темы, такие как сексуальное поведение или инъекционное употребление наркотиков. Эту информацию можно получить только при помощи ответов на вопросы. Кроме того, вопросы нужно использовать и для того, чтобы закрепить понимание клиентом основной информации о ВИЧ-инфекции и ее профилактике.

Консультирование всегда должно быть направлено на то, чтобы помочь людям взять на себя ответственность за собственное здоровье и за здоровье окружающих.

Главные компоненты добровольного тестирования и консультирования

- Достаточное время для установления контакта, взаимопонимания, собственно консультирования.
- Конфиденциальность. Взаимоотношения участвующих в консультировании должны основываться на том принципе, что все обсуждаемые вопросы носят частный характер, если сам обратившийся не решит поделиться этой информацией еще с кем-либо.
- Легкодоступность консультаций. Люди, нуждающиеся в консультации, должны чувствовать, что могут попросить о встрече или связаться с консультантом в любое время.
- Согласие, основанное на знании, то есть выбор, сделанный самим человеком, будет ли он тестироваться на ВИЧ.
- Последовательность любой информации, предоставляемой при консультировании.
- Самоопределение в отношении своего жизненного поведения и лечения недуга.
- Поддержание чувства полной доброжелательности и благосклонности к обратившемуся со стороны консультанта, независимо от образа жизни, выбора половых партнеров, а также социально-экономических, этнических и религиозных особенностей. Недопустимо проявлять какие-либо субъективные эмоции по поводу индивидуальных особенностей обратившегося.
- Технические совершенства лабораторных тестов, высокое качество лабораторных исследований.

Программа консультирования

1. Дотестовое консультирование.
2. Послетестовое консультирование.
3. Практическая поддержка пациентов (обеспечение одноразовыми шприцами, презервативами, помощь в трудоустройстве, предоставление жилья, материальной помощи и т. п.).

Категории лиц, подлежащих консультированию по ВИЧ/СПИДу:

- Лица, которым предстоит тестирование на ВИЧ-инфекцию, независимо от того, инфицированы они или нет.
- Лица, инфицированные ВИЧ/СПИДом, или их партнеры.
- Лица, имеющие в прошлом или настоящем рискованное поведение (имеют венерические заболевания, употребляют инъекционные наркотики, а также имеют половых партнеров, употребляющих наркотики в/в и др.).
- Лица, испытывающие затруднения с трудоустройством, жильем, финансами, возникшие в результате инфицирования.
- Лица, которые считают, что подвергаются риску.

Добровольное анонимное обследование и консультирование проводятся в кабинетах психосоциального консультирования, которые, в соответствии с приказом Минздрава РК от 23.11.94 г. № 445, должны быть организованы при центрах профилактики и борьбы со СПИДом.

Преимущества добровольного тестирования в сочетании с консультированием

- Определяет наличие или отсутствие антител к ВИЧ в сыворотке крови.
- После периода неопределенности наступает психологическая разрядка.
- Инфицированные ВИЧ направляются для клинического наблюдения и лечения.
- Увеличивается мотивация применения способов и средств снижения риска заражения ВИЧ по отношению к самому клиенту и его партнерам.
- Определяется необходимость планирования предстоящих дел: обеспечение будущего детей, приведение в порядок финансовых и др. документов, принятие решения относительно родов и вскармливания грудью, а также будущих взаимоотношений с партнером и т. д.
- Значимость консультаций возрастает, если они сопровождаются конкретными мерами (обеспечение обратившегося презервативами, безопасным (разовым) оборудованием для инъекций и т. п.).

Кто может проводить консультирование по вопросам ВИЧ/СПИДа?

Специалисты центров по профилактике и борьбе со СПИДом, прошедшие подготовку по психосоциальному консультированию.

Требования, предъявляемые к лицам, проводящим консультирование

Процесс консультирования требует от консультанта не только знаний о ВИЧ/СПИДе, но и терпеливого внимательного отношения к пациенту, сдержанности, объективности, такта. Консультирующий

Консультанту необходимо наличие искреннего интереса к человеку и стремления помочь ему. Важно не любить человечество вообще, а с уважением относиться к конкретному его представителю. Нельзя забывать, что люди тонко чувствуют, как к ним относятся, и ведут себя в соответствии с этим.

Во время консультирования клиенту следует уделять как можно больше внимания, нельзя заниматься посторонними делами (разговаривать по телефону, разрешать входить коллегам и обсуждать с ними какие-то, пусть даже важные, вопросы и т.п.).

Необходимо предоставить клиенту максимальную возможность высказаться.

Консультант не должен напоминать детектива. Если консультант вынуждает клиента к чрезмерной откровенности, не исключено, что после встречи, в результате пережитого чувства вины, клиент откажется от позитивных решений, которые он мог принять в ходе консультации, а также начнет с опасением и недоверием относиться к консультанту.

Необходимо соблюдать профессиональную тайну. Если консультант по каким-то причинам обязан поделиться с другими сведениями о клиенте, следует сообщить об этом клиенту в начале беседы.

Клиент должен чувствовать себя в безопасности. Для этого консультант должен постараться войти в положение клиента, проявляя дружелюбие, искренность и заинтересованность.

К проблемам клиента следует относиться без осуждения. Консультант должен не оценивать, а слушать, слышать и понимать. Если он искренне и естественно демонстрирует установку на «прятие», клиент чувствует себя понятым, достойным уважения и, в свою очередь, откровенен и уважителен с консультантом.

Для установления обоюдного доверия консультанту особенно необходимы такие качества, как искренность, способность к эмпатии и безусловное уважение к людям. На это впервые указал в 1951 году известный американский психолог К. Роджерс.

Безусловное уважение клиента

Под понятием «безусловное уважение» имеется в виду безусловное и безоценочное прятие клиента как целостной личности. К. Роджерс предлагает следующее определение: «Безусловное позитивное отношение — это терпимость ко всем аспектам субъективного мира клиента, словно ты сам являешься его частью». Клиент должен чувствовать безоценочное прятие вне зависимости от своего ВИЧ-статуса, этнической или религиозной принадлежности, сексуальной ориентации, образа жизни или индивидуальных особенностей, социального и экономического статуса.

Позитивное отношение не выдвигает никаких условий («ты мне понравишься, если будешь таким-то...»), исключается разделение на хорошие и плохие качества. Необходимо учитывать все социальные характеристики клиента: не только положительные, но и негативные. Следует принять его противоречивость.

Эмпатия

Невозможно понять другого, если не идентифицировать себя с ним. Таким образом, проявление эмпатии в общении означает, что консультант чутко и точно реагирует на переживания клиента. Для того чтобы понять, какой смысл для клиента имеет то или иное событие, нужно попытаться избежать собственных оценок этого события и постараться понять, как оно оценивается клиентом. Безоценочная позиция консультанта помогает клиенту в первую очередь принять себя самого. Однако консультанту важно оставаться самим собой и не переносить переживания клиента в свой мир! Сопереживание консультанта клиенту никогда не должно быть тотальным, а только частичным и временным.

Искренность консультативного контакта (конгруэнтность)

Искренность — один из важнейших элементов создания терапевтического климата. Нужно уметь вести себя с клиентами так, чтобы они восприняли вхождение в свой внутренний мир как поддержку, а не как угрозу. Итак, искренность консультанта — это его способность оставаться самим собой и отсутствие потребности демонстрировать свой профессионализм. Искренний человек не прячется под маской и не старается играть роль. Он естественен в контакте, потому что чуток к своим реакциям и эмоциям, добросовестен и правдив, передавая их клиентам. Искренность предполагает соответствие высказываний чувствам и поведению. Открытый своим чувствам, мыслям, установкам и при этом не испытывающий тревоги консультант способствует комфортному состоянию клиента. Конгруэнтное взаимодействие позволяет и клиенту не скрываться за той или иной маской при общении с консультантом.

4.3.2. Невербальные аспекты коммуникации

Невербальное общение

При общении люди непрерывно передают информацию друг другу не только посредством речи, но и выражением лица, движениями тела, установлением дистанции и т.п. Таким образом, находясь в поле зрения друг друга, мы общаемся, даже если молчим. Невербальными способами можно показать, как мы себя чувствуем, что думаем, как хотели бы поступить. Невербальное поведение человека — очень существенная часть процесса общения. В консультировании мы также посылаем клиентам невербальные сообщения и «считываем» их невербальные реакции. Крайне важно, чтобы консультант отмечал

проведено конфиденциально, что означает, что сам факт обследования и его результаты известны только обследуемому и работнику органа здравоохранения, проводящему консультирование. Разглашение конфиденциальной информации кому бы то ни было (администраторам здравоохранения, лечащим врачам, работодателям) может привести к падению доверия населения к организации, проводящей тестирование, и снижению эффективности работы. Добровольное тестирование на ВИЧ — как анонимное, так и конфиденциальное — может и должно быть проведено только после осознанного согласия пациента.

ОСОЗНАННОЕ в данном контексте означает, что в процессе собеседования (дотестового консультирования) обратившийся получил исчерпывающую информацию о том, что такое серологический статус, осознал преимущества и недостатки информации такого рода, в том числе применительно к своему состоянию.

СОГЛАСИЕ означает выражение согласия на проведение обследования в обстановке, исключающей принуждение, человек должен чувствовать полную свободу в отношении выражения своего согласия или отказа. Результат консультирования — самостоятельное решение клиента, на основе полной информированности, о прохождении или отказе от тестирования на ВИЧ.

Консультирование представляет собой ценное психологическое воздействие даже в том случае, если обследование на ВИЧ не может быть проведено или если пациент решил не проходить обследование.

Цели добровольного обследования и консультирования:

- Индивидуальное обучение обратившихся поведению, снижающему риск заражения ВИЧ и др. инфекциями, передающимися половым путем или с кровью.
- Оказание психологической поддержки лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека.

Задачи консультирования:

- Дать обратившемуся лицу точную информацию о ВИЧ/СПИДе (пути передачи, мерах профилактики, результатах тестирования и др.).
- Помочь ВИЧ-инфицированным, их близким родственникам и друзьям справиться с эмоциональной реакцией (озлобленностью, тревогой, страхом и др.).
- Обсудить дальнейшее поведение консультируемого с учетом его жизненных обстоятельств, дать совет.
- Ознакомить со способами и средствами снижения риска заражения.

Министерство образования, культуры
и здравоохранения Республики Казахстан
Комитет здравоохранения
Республиканский центр по профилактике
и борьбе со СПИДом

**Организация и проведение психосоциального консультирования
по ВИЧ/СПИДу (методические рекомендации)**

Алматы, 1998 год

Республиканский центр по профилактике
и борьбе со СПИДом

Отдел лечебно-профилактической помощи

Составители:

Генеральный директор РЦ СПИД, канд. мед. наук **Чакликов Т.Е.**

Зав. отделом лечебно-профилактической помощи **Трумова Ж.З.**

Зав. кабинетом психосоциального консультирования **Тургенбаева Н.А.**

Врач-эпидемиолог **Сенчева Н.А.**

Методические рекомендации предназначены для врачей центров по профилактике и борьбе со СПИДом и кабинетов психосоциального консультирования.

В методических рекомендациях представлена программа консультирования, дифференцированы этапы ее реализации, определены пути по оказанию психологической поддержки лицам, инфицированным ВИЧ.

Рецензенты:

Главный психотерапевт Комитета здравоохранения МОКиЗ,
докт. мед. наук **Джангильдин Ю.Т.**

Доцент кафедры психологии КазНГУ, канд. псих. наук по мед.
психологии **Сапарова И.А.**

Консультирование по ВИЧ/СПИДу представляет собой конфиденциальный диалог между обратившимся лицом и работником службы здравоохранения, имеющий целью обсуждение задач и причин обследования, оценки степени риска заражения ВИЧ-инфекцией, связанной с особенностями поведения консультируемого, определение эмоциональных реакций и возможных последствий после сообщения результатов теста, обучение навыкам безопасного (в плане заражения ВИЧ-инфекцией) поведения. Консультирование и обследование по желанию обратившегося может быть проведено анонимно, в этом случае образец крови (или сыворотки крови) и результат обследования обозначаются кодом, известным только клиенту. Консультирование и добровольное обследование может быть

невербальные послания клиентов, реагировал на них и одновременно осознавал влияние своего невербального поведения на клиентов. Если вы заметили, что клиент «вдруг» закрылся: скрестил руки, откинулся на спинку стула, отгородился от вас сумкой или брошюрой, лежавшей на столе, — для вас это важный сигнал: «Что-то произошло, человеку некомфортно, он хочет защитить себя». Причины могут быть разными: тема не актуальна или, наоборот, слишком актуальна; человеку показалось, что его осуждают или пытаются «учить жизни», или слова консультанта вызвали обиду, неловкость. Человек непроизвольноотреагирует невербально: позой, мимикой, жестами. Хороший консультант обязательно заметит перемены и внесет коррективы в процесс общения.

В свою очередь, невербальное поведение консультанта оказывает большое влияние на процесс взаимодействия и результат консультирования. Рассмотрим четыре основных требования:

1. **Находиться с клиентом «с глазу на глаз».** Физическая обстановка должна позволять консультанту и клиенту полностью видеть друг друга. Недопустимо присутствие посторонних.
2. **Быть в открытой позе.** Скрещенные руки и ноги обычно интерпретируются как оборонительная, безучастная и отступательная поза. И наоборот — открытая поза означает, что консультант готов принять всю информацию, которая последует со стороны клиента. Конечно, скрещенные руки консультанта не обязательно означают, что он «вышел» из контакта. Здесь главное, чтобы консультант постоянно спрашивал себя: «В какой мере моя поза свидетельствует о моей открытости и расположении к клиенту?»
3. **Поддерживать контакт глаз с клиентом.** Это необходимо, чтобы подчеркнуть внимание и заинтересованность. Но контакт не должен быть непрерывным, потому что может вызвать ощущение дискомфорта. С другой стороны, если взгляд консультанта «блуждает» в пространстве, не останавливаясь на клиенте, то создается впечатление, что консультант не слушает клиента.
4. **Быть спокойным.** Так как большинство клиентов волнуются в ситуации консультирования, важно, чтобы консультант не был напряжен и тем самым не увеличивал беспокойство клиента.

В таблице приведены положительные и отрицательные стороны невербального метода общения (см. стр. 28).

Известный психолог Аллан Пиз в своей книге «Язык телодвижений» рассказывает об интересных экспериментах, проведенных для изучения влияния невербальной коммуникации на общение между людьми. Так, профессор Бердвислл провел замеры доли невербальных способов в общении людей. Он установил, что в среднем человек говорит словами только в течение 10–11 минут в день и что каждое предложение в среднем звучит не более 2,5 секунды. Он подсчитал, что словесное общение в беседе занимает менее 35%, и более 65% информации передается с помощью невербальных средств общения⁹.

| Позитивное | Негативное |
|--|--|
| Тембр голоса спокойный, без резких модуляций. | «Скачущий» тембр голоса. |
| Взгляд консультанта в основном фокусируется на лице клиента (лучше — на переносице), периодически (ненадолго) — на его глазах. | Часто смотрит в сторону или пристально, не переставая, в глаза собеседнику. |
| Открытая поза, движения спокойные и плавные. Выражение лица внимательное и доброжелательное. Желательно, чтобы кисти рук были видны собеседнику и не были зажаты в кулаки. | Хмурится, зевает, мрачнеет. Скрещенные (на груди, за спиной) руки, сцепленные в замок пальцы, ручка/карандаш в руках; невротические жесты (часто поправляет очки, тербит кончик носа, постукивает карандашом или пальцами по столу). Откинутое на спинку стула туловище, взгляд «свысока» и т.п. |
| Достаточное расстояние, разделяющее клиента и консультирующего ¹⁰ . | Слишком близкое расстояние или, наоборот, дистанция слишком велика. |
| Спокойный темп речи (ориентированный на темп речи клиента). | Говорит слишком быстро или слишком медленно. |
| Умеренная жестикуляция, подтверждающие внимание к словам собеседника кивки ¹¹ . | Отсутствие невербальной реакции на слова и жестикуляцию клиента. |
| При необходимости использование юмора. | Использует юмор не к месту или не вовремя; увеличивает напряженность тяжелым, слишком серьезным тоном. |

Пространство вокруг человека

Размеры личной территории человека можно разделить на 4 четкие пространственные зоны.

Интимная зона (от 15 до 46 см)

Из всех зон эта самая главная, поскольку именно эту зону человек охраняет так, как будто бы это его собственность. Разрешается проникнуть в эту зону только тем лицам, которые находятся в тесном эмоциональном контакте с ним. Это дети, родители, супруги, любовники, близкие друзья и родственники. В этой зоне имеется еще подзона радиусом в 15 см, в которую можно проникнуть только посредством физического контакта. Это сверх-интимная зона.

¹⁰ В некоторых культурах люди при разговоре находятся очень близко и почти всегда смотрят в глаза друг другу. В других — стоят на большом расстоянии, вполоборота друг к другу. Размеры личной пространственной зоны культурально обусловлены. Консультант, использующий «близкий» стиль общения, потерпит неудачу с человеком из «дистанционной» культуры.

¹¹ Люди интерпретируют молчание и определенные телодвижения по-разному. Пожатие плечами может означать для одних — «Я не знаю», а для других — «Мне все равно».

- ответы на вопросы обратившегося, предоставление информации о самом тесте;
 - обсуждение вероятности получения положительного, а также отрицательного результата, последствий и вариантов поведения обратившегося в каждой ситуации;
 - оценка, по возможности, способности обратившегося сохранить самообладание в случае получения положительного результата;
 - убеждение обратившегося в повторной явке для последующего консультирования;
- 3.2. Проведение послетестового консультирования при отрицательном результате тестирования:
- информирование обратившегося о наличии открытого периода инфекции, как причине необходимости повторного тестирования через 3 месяца;
 - разъяснение мер предосторожности от заражения ВИЧ-инфекцией и другими заболеваниями, передающимися половым путем.
- 3.3. Проведение послетестового консультирования при положительном результате тестирования:
- разъяснение значения повторного анализа и необходимости продолжения обследования для получения окончательного отрицательного результата в центре по профилактике и борьбе со СПИДом;
 - определение эмоциональной реакции обратившегося и оценка вероятности самоагрессии; по возможности обсуждение этих вопросов с самим пациентом;
 - убеждение пациента в необходимости обращения в центр по профилактике и борьбе со СПИДом.
- 3.4. Регистрация каждого обратившегося с указанием повода обращения в кабинет, группы, к которой по факторам риска заражения относится обратившийся, характера консультативных мероприятий и их эффективности.
- 3.5. Составление еженедельной (ежемесячной) и в конце года итоговой сводки и отчета о проводимой работе, предоставление их в отделение профилактики территориального центра.

*Начальник Главного управления
организации медицинской помощи*

Е.М. Мусин

бюджетов, добровольных взносов предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности, общественных объединений и граждан, пожертвований, благотворительной помощи, а также средств международных фондов и других источников.

*Начальник Главного управления
организации медицинской помощи*

Е. М. Мусин

**Приложение
к Положению о Республиканском, Областном и Городском центрах
по профилактике и борьбе со СПИДом
Министерства здравоохранения Республики Казахстан**

О работе кабинетов психосоциального консультирования и добровольного обследования на ВИЧ (методические рекомендации)

1. Общие положения

- 1.1. Кабинет психосоциального консультирования и добровольного обследования на ВИЧ организуется при диспансерном отделении центра по профилактике и борьбе со СПИДом.
- 1.2. Добровольное обследование производится по желанию обратившихся лиц как официально, так и анонимно.
- 1.3. Деятельность кабинета основывается на психосоциальном консультировании до забора крови на исследование и после получения результата исследования.
- 1.4. Консультирование представляет собой совокупность профилактической и санитарно-просветительской работы, проводимой в форме собеседования.
- 1.5. Штатная численность, порядок и режим работы кабинета определяются руководителем центра. Врач кабинета должен иметь специальную подготовку.

2. Задачи кабинета

- Обучение населения безопасному половому поведению в плане профилактики распространения ВИЧ-инфекции.
- Оказание психологической поддержки обратившимся.
- Оценка эффективности санитарно-просветительских мероприятий.

3. Функциональные обязанности сотрудников кабинета

- 3.1. Проведение дотестового консультирования:
 - определение объема знаний обратившегося по вопросам ВИЧ и СПИДа;

Личная зона (от 46 см до 1,2 метра)

Это расстояние, которое обычно разделяет нас, когда мы находимся на вечеринках, приемах, других мероприятиях, где намерены общаться с присутствующими там преимущественно знакомыми нам людьми из одного с нами сообщества и общих с нами интересов.

Социальная зона (от 1,2 до 3,6 метра)

На таком расстоянии мы держимся от посторонних людей, например водопроводчика или плотника, пришедшего заняться ремонтом в нашем доме, почтальона, нового служащего на работе и от людей, которых не очень хорошо знаем.

Общественная зона (более 3,6 метра)

Когда мы обращаемся к большой группе людей, то удобнее всего стоять именно на этом расстоянии от аудитории.

Практическое использование зон

Обычно наша интимная зона нарушается человеком по нескольким причинам: когда «нарушитель» является нашим близким родственником, другом или сексуальным партнером; когда это необходимо для получения определенных услуг (врача, портного и т.п.); когда «нарушитель» проявляет враждебные намерения и атакует нас. Если реакцию на вторжение посторонних людей в личные и социальные зоны на протяжении некоторого времени мы вполне можем контролировать, то вторжение в интимную зону сразу вызывает внутри организма определенные физиологические реакции и изменения: учащается сердцебиение, происходит выброс адреналина в кровь, кровь приливает к мозгу и мышцам как сигнал готовности организма к бою. Знания о персональном пространстве необходимы для правильной организации консультативного пространства и стиля общения с клиентом.

4.3.3. Вербальные аспекты коммуникации

Барьеры на пути передачи информации

| Название | Причины возникновения | Как преодолеть |
|-----------------------------|---|---|
| Понятийный | Разное понимание значений слов и сложных синтаксических конструкций | Переспрашивать, задавать вопросы, говорить просто, лаконично. |
| Способы передачи информации | а) Невозможность передавать словами визуальную информацию; б) дистантные формы передачи информации: общение по телефону, по электронной почте. | Стараться задействовать как можно больше органов восприятия |

| Название | Причины возникновения | Как преодолеть |
|---------------|---|---|
| Восприятие | а) Отсутствие возможности принятия информации (например, нет удобных бланков); б) отсутствие навыков слушания; в) усталость; г) ограниченность по времени. | Учиться слушать, вырабатывать навыки активного слушания и умения задавать вопросы. |
| Ассоциативный | Существуют слова-ассоциации: имя, «папа», «мама», «времена года», «секс» и т.п. При упоминании этих слов человек может «уйти» в свои ассоциации. | Быть внимательнее к невербальным аспектам, стараться отслеживать «уход» — собственный или собеседника. Изменить позу — перейти в позу активного слушания. |

Несмотря на большое значение невербального общения в консультировании, важнейшие события происходят на вербальном уровне, тем более что повышение уровня информирования является одной из задач и неотъемлемой частью консультирования по вопросам ВИЧ/СПИДа. Поскольку консультирование практически всегда подразумевает общение на очень деликатные темы и отличается от простого предоставления советов, консультант должен обладать и развивать следующие навыки эффективного общения. Очень важен язык диалога. Консультант должен говорить на языке, понятном клиенту, стараться избегать профессиональных терминов или разъяснять их значения. При консультировании по вопросам ВИЧ/СПИДа консультанту часто придется оперировать медицинскими терминами. Чтобы избежать потери информации на языковом уровне, предоставьте клиенту возможность задавать вопросы и уточнять детали в течение всей беседы. Консультант должен владеть специальными навыками, которые позволяют ему поддерживать контакт с клиентом и делают процесс консультирования максимально эффективным и конструктивным. Основными навыками, необходимыми консультанту для успешной работы, являются:

- **Активное слушание** — консультант словами, выражением лица или жестикуляцией — всем своим видом показывает, что он сосредоточен на нуждах клиента и понимает его.
- **Предоставление возможности выразить эмоции** — игнорируя текущие эмоции и чувства клиента, очень трудно понять его потребности и провести хорошую консультацию.
- **Поощрение** — см. об этом: «Техники активного слушания».
- **Распознавание** — консультант должен иметь достаточные навыки в распознавании и определении различных состояний и эмоций клиента.
- **Признание** — консультант должен признавать за клиентом право на такие чувства, как злость, грусть, страх, и подтвердить, что

внедрению республиканской программы профилактики и борьбы со СПИДом и в пределах своих полномочий осуществляет:

- организационно-методическое руководство и контроль за работой органов здравоохранения, областных и городских центров и других лечебно-профилактических учреждений по вопросам профилактики и борьбы со СПИДом;
- паспортизацию диагностических лабораторий, ведущих обследование на ВИЧ;
- проводит клиничко-лабораторную экспертизу, арбитражные исследования и исследование крови в иммуноблоте с целью верификации диагноза СПИД и носительства ВИЧ-инфекции;
- специализацию и повышение квалификации врачей и средних медицинских работников в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 30.12.92 г. № 572, аттестацию работников со средним медицинским образованием;
- организацию и проведение семинаров, совещаний и научно-практических конференций;
- подготовку обзоров научной литературы и информации из областных центров СПИД (статистические данные) об инфицированности и заболеваемости ВИЧ/СПИДом по материалам, поступающим из ВОЗ и Европейского центра по эпидемиологическому контролю за СПИД (Франция, Сент-Морис);
- взаимодействие по проблеме СПИДа с международным постом в Центральноазиатском регионе Европейского регионального бюро ВОЗ в г. Алматы, а также центрами по профилактике и борьбе со СПИДом стран СНГ.

7. Меры социальной защиты

- 7.1. Медицинские работники, служащие и технические работники центров, других учреждений здравоохранения и ведомств, медицинских и научно-исследовательских институтов, непосредственно занятые профилактической, лечебно-диагностической и научно-исследовательской работой со СПИДом, имеют право на сокращенный 6-часовой рабочий день, дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 24 рабочих дня, дополнительную оплату труда за профессиональную вредность в размере 60% установленной платы, а также на государственное страхование на случай профессионального заражения вирусом иммунодефицита человека и заболевание СПИДом с выплатой единовременного пособия в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об охране труда».

8. Финансирование

- 8.1. Финансирование мероприятий по профилактике и борьбе со СПИДом осуществляется за счет республиканского и местного

5. Профилактические и противоэпидемические мероприятия

5.1. Центры осуществляют:

- организацию, разработку и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на охрану территории от заноса и распространения ВИЧ-инфекции с учетом взаимного признания сертификатов о прохождении тестирования на ВИЧ;
- эпидемиологический надзор за ВИЧ среди населения и групп риска (доноры крови, тканей и органов, наркоманы, гомо- и бисексуалы, проститутки, лица, совершившие половые преступления и пострадавшие от них);
- скрининг населения в соответствии с Правилами медицинского освидетельствования на выявление заражения вирусом иммунодефицита человека (заболевание СПИД), утвержденными Минздравом Республики Казахстан с соблюдением врачебной тайны;
- регистрацию ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом;
- компьютерную программу «ВИЧ-прогноз»;
- эпидемиологическое обследование каждого ВИЧ-инфицированного и больного СПИДом с целью выявления источника и путей заражения, установления контактировавших с ними лиц, организации их обследования на ВИЧ, диспансерного наблюдения и проведение других противоэпидемических мероприятий;
- эпидемиологический анализ состояния заболеваемости и эффективности проводимых профилактических и противоэпидемических мероприятий;
- координацию работ по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией между министерствами и ведомствами Республики;
- меры профилактики заражения СПИДом в отношении медицинских и фармацевтических работников, работников сферы бытового обслуживания, зараженных вирусом иммунодефицита человека и подлежащих отстранению от выполнения служебных обязанностей или переводу на другую работу;
- меры по социальной поддержке и защите ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом;
- организацию и проведение просветительной работы среди населения по профилактике ВИЧ-инфекции с привлечением средств массовой информации: печати, телевидения, радио, общественных организаций АнтиСПИД и др.

6. Республиканский центр

6.1. Республиканский центр является координирующим, консультативно-диагностическим, лечебным учреждением по разработке и

он понимает, какие чувства есть у клиента по поводу обсуждаемой темы. Это признание должно быть высказано просто и без личного участия консультанта в чувствах клиента: «Я вижу/слышу/понимаю, что вы испытываете страх/грусть/злость». Данные слова могут быть подкреплены невербальным выражением — например, кивками головы. При этом не нужно говорить таких фраз, как: «Я хорошо понимаю ваше чувство» или «На вашем месте я чувствовал бы то же самое!»

Техники активного слушания

Правила:

- больше слушайте, меньше говорите;
- воздерживайтесь от оценок;
- стремитесь реагировать на значимую информацию.

| Приемы | Цель | Реализация | Примеры |
|------------------|--|--|---|
| Поощрение | Продемонстрировать заинтересованность, поддержать стремление к рассказу. | Не надо соглашаться или не соглашаться с тем, что вы слышите. Используйте благожелательный тон и «уклончивые выражения». | «Я вас понимаю», «Мгм», «Это интересно», «Пожалуйста, продолжайте». |
| Повторение | Повторение сказанного поможет клиенту лучше понять себя, разобраться в своих мыслях, идеях, установках. | Консультант может, например, дословно «отразить» ключевую фразу или слово клиента. Но при этом избегайте «попугайства», т.е. слишком частого дословного повторения высказывания клиента. | «Если я вас правильно понял...», «Вы считаете...», «Если я вас правильно понял, вы боитесь, что семья не будет заботиться о вас...» |
| Отражение чувств | Показать, что вы понимаете чувства собеседника. Консультанту следует помнить, что, только проанализировав проблему на эмоциональном уровне, можно выходить на рациональный уровень ее решения. | Отражайте ведущие чувства собеседника. | «Вы чувствуете...», «Вы беспокоитесь по поводу...», «Ваши чувства очень сильны, и я признаю их». |

| Приемы | Цель | Реализация | Примеры |
|----------------------------|---|--|---|
| Обобщение | Прояснить направление беседы, заложить основу для дальнейшего обсуждения. | В сжатом виде повторяйте основные факты и чувства собеседника. | «Из того, что вы сказали, самое главное, по-моему, это...» |
| Уточнение | Прояснить, уточнить мысли, чувства, представления собеседника. | Обратиться к собеседнику с просьбой дополнить, разъяснить свои высказывания. | «Пожалуйста, уточните это...», «Что вы имеете в виду?», «Что вас больше всего беспокоит?» |
| Дальнейшее развитие мыслей | Прояснить, проговорить скрытые мысли и чувства собеседника. | Реагировать на то, что партнер чувствует, но не решается высказать открыто. Повторять слова или короткие фразы клиента, которые несут эмоциональную нагрузку, — возможно, именно это клиент хотел бы обсудить. | «Да, ситуация серьезная, видимо, вам хотелось бы...», «Я вижу, вы испытываете беспокойство по поводу здоровья?» |
| Ответ-проекция | Прояснить реальные желания, чувства и узнать решение клиента. | При использовании данной техники значительное внимание следует уделить интонациям, которые консультант использует, задавая вопросы клиенту. Подчас довольно очевидно, что клиент знает, чего он хочет, даже тогда, когда обращается за советом, одобрением или в поисках решения проблемы. | «Что бы вы хотели от меня услышать?», «Если бы я удовлетворил вашу просьбу найти решение, с каким решением вы могли бы согласиться?». |

Три основные цели повторения:

- Показать клиенту, что консультант очень внимателен и пытается его понять.
- Четко сформулировать мысль клиента, повторяя его слова в сжатом виде.
- Проверить правильность понимания высказанных клиентом идей.

Три простых правила:

- Перефразируется основная мысль клиента.
- Нельзя исказить или заменять смысл сказанного клиентом, нельзя добавлять что-либо «от себя».
- Следует использовать термины и определения, которыми оперирует клиент.

ранения, а также необходимости обеспечения производственного и социального развития службы.

3.2. Обеспечивают ведение учетной документации по утвержденным формам и представляют отчеты в сроки, в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 3.04.92 г. № 163 «Об утверждении форм медицинской документации служб СПИД» и от 5.08.93 г. № 328 «О порядке экстренной сигнализации ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом в Республике Казахстан».

3.3. Республиканский, областные и городские центры используют в работе автоматизированную систему управления и анализа «ВИЧ-очаг» и «ВИЧ-поиск».

4. Лечебно-диагностические мероприятия

4.1. Центры обеспечивают гражданам Республики Казахстан, иностранным гражданам и лицам без гражданства право на добровольное, конфиденциальное и анонимное медицинское освидетельствование на заражение вирусом иммунодефицита человека.

4.2. Центры организывают и оказывают гражданам Республики Казахстан и лицам без гражданства, зараженным вирусом иммунодефицита человека, медицинскую помощь в государственных учреждениях здравоохранения:

- амбулаторную, амбулаторно-консультативную и юридическую помощь;
- больничную в стационарных отделениях центра, а при их отсутствии — в стационарах инфекционных больниц, родильных домов и других лечебно-профилактических учреждениях;
- бесплатное лекарственное обеспечение и возмещение расходов, связанных с проездом к месту лечения и обратно, за счет учреждений здравоохранения по месту жительства;
- психосоциальное консультирование в соответствии с Методическими рекомендациями «О работе кабинета психосоциального консультирования и добровольного обследования на ВИЧ» (приложение).

4.3. Центры осуществляют:

- лабораторную диагностику ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, иммунологические, клинико-диагностические, биохимические, другие виды лабораторных исследований и контроль за качеством их проведения;
- организационно-методическое консультирование лечебно-профилактических учреждений по вопросам диагностики, диспансерного наблюдения и лечения ВИЧ-инфицированных, больных СПИДом, СПИД-ассоциированными и индикаторными инфекциями.

- 1.6. Республиканский, областные и городские центры в деле профилактики и борьбы со СПИДом взаимодействуют со станциями переливания крови, центрами здоровья, кожно-венерологическими диспансерами, инфекционными больницами (стационарами) и другими учреждениями здравоохранения, независимо от ведомственной принадлежности, а также с Министерством внутренних дел Республики Казахстан, другими министерствами и ведомствами.
- 1.7. Предложения Республиканского, областных и городских центров в деле профилактики и борьбы со СПИДом являются обязательными для исполнения органами и учреждениями здравоохранения.
2. Структура и штаты
- 2.1. Структура и штаты центров устанавливаются территориальными органами здравоохранения с учетом объема работы и конкретных условий.
- 2.2. В структуру центров входят:
- отдел лечебной помощи (диспансерное отделение с кабинетом психосоциального консультирования, стационарное отделение);
 - отдел профилактики (организационно-методический, эпидемиологический отделы);
 - диагностические лаборатории (вирусологическая, иммунологическая, клинико-диагностическая, биохимическая, токсоплазма и другие);
 - административно-технический отдел.
- 2.3. В штатах центра предусматриваются должности специалистов со средним и высшим медицинским и немедицинским образованием.
- 2.4. Главные врачи могут вносить изменения в структуру центра и при необходимости привлекать врачей-консультантов, в том числе и докторов и кандидатов медицинских наук.
- 2.5. Главный врач назначается и освобождается в установленном порядке и ему придаются права координатора органа здравоохранения по вопросам профилактики и борьбы со СПИДом. Руководитель Республиканского центра — генеральный директор центра — является национальным координатором республиканской программы профилактики и борьбы со СПИДом, членом республиканской аттестационной комиссии врачей.
3. Планирование, учет и отчетность, АСУ
- 3.1. Центры планируют и осуществляют свою деятельность в рамках республиканской программы борьбы со СПИДом, определяют перспективы своего развития, исходя из положения здравоохранения.

При работе с чувствами следует использовать:

- Поощрение — консультанту необходимо поощрять выражение чувств. Именно работая с чувствами, можно достичь конструктивных перемен.
- Распознавание — консультант должен иметь достаточные навыки в распознавании и определении различных эмоций клиента.
- Признание — консультант должен уметь признавать различные чувства клиента, в том числе такие, как озлобленность, грусть и страх, и делать это открыто и бесстрастно.

4.3.4. Процедуры и техники консультирования

Существуют определенные процедуры и техники, которые позволяют консультанту развить с клиентом конструктивный диалог, при этом обеспечивая активное участие самого клиента в процессе консультирования. Ниже перечислены те из них, которые консультанту необходимо знать и активно использовать в своей практике.

Эффективные вопросы

Получить информацию о клиенте и побудить его к самоанализу возможно без умелого опроса. Как известно, вопросы обычно разделяют на «закрытые» и «открытые». Закрытые вопросы используются для получения конкретной информации и обычно предполагают либо ответ в одном-двух словах, либо подтверждение/отрицание («да», «нет»). Например: «Сколько вам лет?», «Можем ли мы встретиться через неделю в это же время?» и т.п. Открытые вопросы не столько служат для получения сведений о жизни клиента, сколько открывают путь для обсуждения. Открытые вопросы расширяют и углубляют контакт; закрытые вопросы ограничивают его. «Проясняющие вопросы» задают с целью уточнить значение или содержание утверждений клиента. Примеры открытых вопросов: «Как бы вы хотели начать сегодняшнюю нашу беседу?», «Что вы чувствуете?», «Могу я узнать, почему именно сейчас вы решили пройти тестирование?» и т.п.

Открытые вопросы перекладывают на клиента ответственность за беседу и побуждают его исследовать свои установки, чувства, мысли, ценности, поведение, т.е. свой внутренний мир.

Ободрение и поддержка

Эти техники очень важны для создания и укрепления консультативного контакта. Приободрить клиента можно краткой фразой, означающей согласие или/и понимание. Это побуждает клиента продолжить повествование. Например: «Продолжайте, пожалуйста», «Да, я понимаю», «Так» и т.п. Довольно распространена одобрительная реакция: «Ага», «М-мм». В переводе на язык речи эти частицы означали бы: «Продолжайте, я с вами, я внимательно слушаю вас». Ободрение выражает поддержку, а это основа консультативного контакта.

Отражение содержания: перефразирование и обобщение

Чтобы продемонстрировать клиенту, что его внимательно слушают и понимают, необходимо время от времени отражать содержание его высказываний, а именно: перефразировать сказанное или обобщить несколько высказываний. Отражение содержания помогает клиенту лучше понять себя, разобраться в своих мыслях, идеях, установках.

Перефразирование особенно уместно в начале консультирования, так как это побуждает клиента более открыто обсуждать свои проблемы. Оно преследует три основные цели:

- показать клиенту, что консультант внимателен и пытается его понять;
- выкристаллизовать мысль клиента, повторяя его слова в сжатом виде;
- проверить, правильно ли вы понимаете мысли клиента.

При перефразировании надо помнить три простых правила:

1. Перефразируется основная мысль клиента.
2. Нельзя искажать или подменять смысл утверждения клиента, а также добавлять что-либо от себя.
3. Следует использовать термины и определения, которыми оперирует клиент. Можно, например, дословно «отразить» ключевую фразу или слово клиента. Но при этом избегайте «попугайства», т.е. слишком частого дословного повторения.

Хорошо перефразированная мысль клиента становится короче, яснее, конкретнее, а это помогает клиенту самому понять, что он хотел сказать. Например: «Если я вас правильно понял, вы боитесь, что ваша семья не будет заботиться о вас». Клиент может согласиться с интерпретацией, если же нет, консультанту следует уточнить, что клиент имел в виду.

Отражение чувств

Распознавание и отражение чувств клиента представляется одной из главнейших техник консультирования. Это больше чем техника, это — неперенная составляющая в отношениях двух людей. Отражение чувств тесно связано с перефразированием высказываний; разница лишь в том, что при перефразировании внимание сосредоточено на содержании, а при отражении чувств — на том, что скрыто за этим содержанием. Желая отразить чувства клиента, консультант внимательно выслушивает его признания, перефразирует отдельные утверждения, но акцент делает на эмоциях, которые могут быть выражены клиентом явно или скрываться за содержанием его признаний.

Взаимодействие на уровне чувств очень важно, так как, не проработав ситуацию в эмоциональной плоскости, нельзя добиться успеха в плоскости рациональной.

Приложение № 1

К приказу Министерства здравоохранения Республики Казахстан № 445 от 23.11.1994 г.

Положение о республиканском, областном, городском центрах по профилактике и борьбе со СПИДом Министерства здравоохранения Республики Казахстан

1. Общие положения

1.1. Центры по профилактике и борьбе со СПИДом* (*центры по профилактике и борьбе со СПИДом далее по тексту именуются центры) являются специализированными лечебно-профилактическими учреждениями особого типа, выполняющими комплекс мероприятий, направленных на своевременное выявление, лечение и предупреждение распространения заболевания СПИД.

1.2. Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом находится в подчинении Министерства здравоохранения Республики Казахстан, областные и городские центры — в подчинении областных и городских отделов (управлений, департаментов) здравоохранения, имеют гербовую печать, самостоятельный баланс и счет в банке.

Городские центры по вопросам профилактики и борьбы со СПИДом работают под руководством областных центров, областные центры — под руководством Республиканского.

1.3. Центры в работе руководствуются Законами Республики Казахстан «Об охране здоровья народа» от 10.01.1992 г., «О профилактике заболевания СПИДом» от 5.10.1994 г., приказами Министерства здравоохранения Республики Казахстан и другими нормативными актами.

1.4. Областные центры организовываются в каждой области республики.

Алматинский областной центр входит в структуру Республиканского центра на правах подразделения, руководитель которого является заместителем генерального директора Республиканского центра.

Реорганизация областных центров, влекущая за собой изменения (сокращение) задач и функций, либо их ликвидация производится по согласованию с Министерством здравоохранения Республики Казахстан.

1.5. Городские центры создаются и ликвидируются территориальными органами здравоохранения с учетом местных особенностей.

Республики Казахстан от 01.06.1994 г. № 15/4 «О состоянии и мерах по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией и вензаболеваниями в Талдыкорганской и Акмолинской областях» в части организации областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом, и потребовать принять незамедлительные меры по открытию центра.

3. Генеральному директору Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом Клебанову Я.А.:
 - 3.1. В 3-месячный срок разработать и представить на утверждение республиканскую программу по профилактике и борьбе со СПИДом;
 - 3.2. Внести в установленном порядке предложения о строительстве Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом;
 - 3.3. Совместно с областными и городскими управлениями (департаментами) здравоохранения активизировать работу службы профилактики и борьбы со СПИДом, повысить эффективность проводимых мероприятий, особенно среди групп риска — наркоманов, гомосексуалистов и проституток;
 - 3.4. Совместно с Министерством образования Республики Казахстан принять действенные меры по реализации программ для школ, ПТУ, ССУЗов и ВУЗов «Проблемы СПИД и его профилактика», утвержденной в феврале 1994 года.
4. Республиканскому центру здоровья, А.А. Адылханову:
 - 4.1. Увеличить объем и улучшить качество выпускаемой наглядной литературы по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией в количестве, обеспечивающем потребность учреждений здравоохранения;
 - 4.2. Обеспечить действенную пропаганду знаний по профилактике заболеваний СПИДом с использованием средств массовой информации — печати, радио, телевидения.
5. Считать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан № 47 от 09. 02. 1994 г.

Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника Главного управления организации медицинской помощи Е. Мусина.

Первый зам. министра

А. Дуйсекеев

Важно обратить внимание на баланс фактов и чувств (рационального и эмоционального) в консультативной беседе. Нередко консультант может игнорировать чувства клиента. Следует помнить, что на рациональный уровень решения вопроса можно будет выходить, только проработав его на эмоциональном уровне. При этом надо использовать:

- **Поощрение.** Консультанту следует поощрять выражение чувств; только задействовав чувства, можно достичь конструктивных перемен.
- **Распознавание.** Консультант должен иметь достаточные навыки в распознавании и определении различных эмоций клиента.
- **Признание.** Консультант должен уметь признавать различные чувства клиента, особенно такие, как озлобленность, грусть и страх, причем делать это прямо и неэмоционально: «Ваши эмоции очень сильны, и я признаю их».
- **Ключевые слова и фразы.** Можно повторять слова или короткие фразы, взятые из речи клиента и несущие эмоциональную нагрузку: возможно, это как раз то, что клиент хотел бы обсудить.
- **Повторение.** Иногда в состоянии стресса или кризиса люди понимают не все из того, что им говорится, потому что могут находиться в состоянии отрицания или подавленности. Консультант должен уметь распознавать эти состояния и при необходимости повторять клиенту информацию.
- **Ответ-проекция.** Часто клиенты предпочитают принять решение, которое предлагает консультант, а не свое собственное. В некоторых случаях не вызывает сомнений, что клиент знает, чего он хочет, хотя и обращается к консультанту за советом, одобрением или в поисках решения проблемы. В подобных ситуациях ответ-проекция оказывается довольно эффективным методом, например: «Что бы вы хотели от меня услышать?», «Если бы я мог удовлетворить вашу просьбу найти решение, что бы вы хотели, чтобы я сделал?» Обычно ответ на подобные вопросы в той или иной степени раскрывает реальные желания и настроения клиента. При использовании данной техники следует уделить серьезное внимание интонации, с которой задается вопрос.
- **Конструктивная конфронтация.** Эта реакция выстраивается с той целью, чтобы обратить внимание клиента на противоречия в его высказываниях. Например: «Вы говорите, что, хотя у вас есть инфекция, которая передается точно так же, как и ВИЧ, но вы считаете, будто не можете заразиться ВИЧ?» При использовании техники конструктивной конфронтации противоречия во взглядах пациента следует отражать в нейтральной манере.
- **Подчеркивание.** Иногда люди избегают акцентировать внимание на действительных проблемах. Консультант должен выделить

наиболее важные моменты. Например: «Из всего затронутого вами вы, кажется, больше всего обеспокоены...»

- **Паузы, молчание.** Умение молчать и использовать тишину — один из важнейших навыков консультирования. Хотя тишина иногда означает нарушение консультативного контакта, тем не менее она бывает и глубоко осмысленной. Паузы в разговоре дают время клиенту собраться с мыслями и чувствами, а консультанту — включиться в процесс и прояснить услышанное.
- **Структурирование.** Структурирование позволяет разделить проблемы и заботы на те, которые нуждаются в неотложном внимании, и на те, с которыми можно подождать. Это неотъемлемая часть планирования и, возможно, самый важный навык в консультировании.

Структурирование проходит через весь процесс консультирования. Оно включает организацию отношений консультанта с клиентом, выделение отдельных этапов консультирования и оценку их результатов, а также предоставление клиенту информации о процессе консультирования. Работа с клиентом осуществляется по принципу «шаг за шагом». Закончив один этап, вы вместе с клиентом обсуждаете результаты, формулируете выводы. Каждый новый этап начинается с оценки того, что достигнуто (необходимо убедиться, что ваши оценки совпадают). Это способствует желанию клиента активно сотрудничать с консультантом, а также дает возможность в случае неудачи на отдельном этапе вновь вернуться к нему. Таким образом, суть структурирования — участие клиента в планировании процесса консультирования.

- **Подведение итогов.** Консультант резюмирует происходившее во время встречи, проговаривает основные моменты беседы, достигнутые результаты и принятые решения. Например: «В ходе нашей встречи мы обсудили... пришли к выводу, что... и вы приняли решение...». Данный процесс помогает клиенту еще раз осознать проделанную работу, закрепить принятые решения и взять ответственность за это на себя.

4.4. Основные компоненты процесса консультирования

Консультирование до и после теста на ВИЧ-инфекцию состоит из следующих основных компонентов:

Уточнение и обращение к проблеме

Во время приема все действия консультанта должны быть направлены на выяснение наиболее актуальных для клиента проблем. Например, одной из них может быть проблема, как сообщить супруге/супругу о результатах тестирования на ВИЧ.

СПИДом, имеют право на сокращенный 6-часовой рабочий день, дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 24 рабочих дня, дополнительную оплату труда за профессиональную вредность в размере 60% установленной заработной платы.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям областных, Алматинского и Ленинского городских управлений (департаментов) здравоохранения, руководителям республиканских научных и лечебно-профилактических учреждений, высших и средних медицинских учебных заведений:
 - 1.1. Принять к руководству и исполнению Закон Республики Казахстан «О профилактике заболевания СПИДом»;
 - 1.2. Утвердить «Положение о республиканском, областном, городском центрах по профилактике и борьбе со СПИДом (приложение № 1) и методические указания по организации лечебно-диагностической помощи и диспансерного наблюдения за больными ВИЧ-инфекцией и СПИДом (приложение № 2);
 - 1.3. В целях межведомственной координации работы по профилактике и борьбе со СПИДом в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан, других министерствах и ведомствах, средствах массовой информации и общественных организациях создать при Главном управлении медицинской помощи Координационный совет по профилактике и борьбе со СПИДом (приложение № 3);
 - 1.4. Осуществить неотложные меры по укреплению материально-технической базы областных и городских центров по профилактике и борьбе со СПИДом, обеспечивающие развертывание иммунологических лабораторий, диспансерных отделений и стационарных центров, согласно приложению № 4;
 - 1.5. Изыскать необходимые ассигнования, в том числе и валютные, для оснащения центров по профилактике и борьбе со СПИДом и лабораторий станций переливания крови лабораторным оборудованием;
 - 1.6. Заложить в смету центров по профилактике и борьбе со СПИДом и станций переливания крови на 1994 г. достаточные ассигнования для оплаты диагностических наборов на ВИЧ для тестирования на ВИЧ подлежащих контингентов в строгом соответствии с Правилами медицинского освидетельствования на выявление заражения ВИЧ, утвержденными Минздравом Республики Казахстан 8 октября 1993 г. № 7-2-1-3300.
Запретить тестирование на ВИЧ контингентов лиц, не предусмотренных указанными Правилами.
2. Указать заведующему Акмолинским облздравотделом Мальцеву В.А. на невыполнение постановления коллегии Минздрава

Статья 10. Ответственность лиц за халатное исполнение профессиональных обязанностей

Медицинские работники и работники сферы бытового обслуживания, допустившие халатное отношение к своим профессиональным обязанностям, повлекшее за собой заражение вирусом иммунодефицита человека других лиц, привлекаются к установленной законодательством ответственности.

Статья 11. Соблюдение врачебной тайны

Медицинские работники и другие лица, которым в связи с выполнением служебных обязанностей стали известны сведения о лицах, инфицированных вирусом иммунодефицита человека и больных СПИДом, обязаны хранить эти сведения в тайне, охраняемой законом.

Статья 12. О профессиональном заболевании СПИДом

Заражение вирусом иммунодефицита человека медицинских и фармацевтических работников, а также работников медицинских, научно-исследовательских институтов и сферы бытового обслуживания при исполнении служебных и профессиональных обязанностей относится к профессиональным заболеваниям.

Статья 13. Страхование медицинских и других работников на случай профессионального заражения вирусом иммунодефицита человека и заболевания СПИДом

Медицинские и другие работники, исполнение служебных обязанностей которых может привести к профессиональному заболеванию СПИДом, подлежат обязательному государственному страхованию. В случае инфицирования, заболевания, инвалидности и смерти от СПИДа им выплачивается единовременное пособие в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об охране труда».

Право на указанное пособие имеют также лица, заражение вирусом иммунодефицита человека или заболевание СПИДом которых произошло в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей медицинскими работниками и работниками сферы бытового обслуживания.

Статья 14. Льготы медицинским работникам, занятым профилактикой и лечением заболевания СПИДом

Медицинские работники, служащие и технические работники центров по профилактике и борьбе со СПИДом, других учреждений здравоохранения и ведомств, медицинских и научно-исследовательских институтов, непосредственно занятых профилактической, лечебно-диагностической и научно-исследовательской работой со

Предоставление информации по теме и об источниках помощи

После того как проблема была идентифицирована, можно приступать к обсуждению путей ее разрешения. Роль консультанта заключается в предоставлении информации по теме консультирования и об источниках помощи. Опытные консультанты всегда должны иметь наготове несколько вариантов решения наиболее часто встречающихся проблем, а также информацию об организациях и специалистах, которые могут помочь клиенту реализовать его намерения и решения.

Выбор реальных альтернатив

Консультирование должно помочь клиенту выбрать осуществимые альтернативы, которые смогут обеспечить ему чувство личной удовлетворенности и ощущение поддержки, необходимые при решении конкретной проблемы. Но нужно всегда помнить, что решение должно быть принято клиентом, а не навязано консультантом!

Составление плана действий

Консультанту следует помочь клиенту выработать приемлемую для него последовательность действий, помочь разработать реалистичные планы и действовать в соответствии с ними.

Мотивация к изменению поведения

Консультант мотивирует своих клиентов, поощряя их к принятию осознанных и ответственных решений, которые помогут клиенту защитить его здоровье. Наиболее важные решения, которые клиент может принять: как он будет относиться к факту тестирования и к личному риску заражения (или положительному ВИЧ-статусу), что в его поведении требует изменений и каких, а также, какую помощь и от кого он готов попросить. Если клиент признает важность вопросов, связанных с ВИЧ, для своего благополучия, это может стать самым важным мотивом для последующего изменения поведения на менее опасное или безопасное. При этом важно помнить, что мотивация в большей степени определяется возможностью получить, нежели страхом потерять.

4.5. Развитие диалога с клиентом

Во время консультирования до и после теста на ВИЧ-инфекцию могут быть затронуты очень личные, интимные вопросы. При этом клиент может не иметь представления о том, что такое консультирование и какая от него может быть польза. Необходимость разговора с незнакомым человеком на личные темы может пугать или быть запрещенной в данной культуре. Теплая и открытая манера консультанта вести беседу имеет здесь первостепенное значение.

Встречу следует начать с выяснения степени информированности клиента о консультировании и прояснить его ожидания от встречи с

консультантом. При необходимости можно вкратце описать весь процесс, обсудить страхи клиента относительно него, а затем выслушать, как клиент видит проблему.

Важно понять, что консультирование направлено на помощь индивиду, а так как все люди разные, то для него не может быть жесткой схемы. Содержание консультирования зависит от нужд человека, конкретной ситуации, запроса клиента.

4.6. Наиболее распространенные ошибки при консультировании

Консультанты, как и другие профессионалы, могут совершать ошибки. Ниже приведены некоторые из них:

- Контроль вместо поощрения спонтанного выражения клиентом своих чувств и потребностей.
- Осуждение, замечания, на основании которых можно сделать вывод, что клиент не отвечает «требованиям» консультанта.
- Выражение чрезмерной опеки, поучения на тему о том, как надо вести себя, как жить.
- «Навешивание ярлыков» вместо попыток выяснить мотивы, причины страха или тревоги пациента.
- Необоснованные попытки успокоить, внушить оптимизм, недооценка сложности проблемы.
- Неумение сочувствовать, принять переживания клиента такими, какие они есть.
- Преждевременное предоставление советов (например, до того, как клиент получил достаточную информацию, чтобы принять собственное решение).
- Вопросы в обвинительной манере (даже вопрос «почему?» может восприниматься как осуждение).
- Поощрение зависимости клиента от консультанта, потребности в его руководстве.
- Лесть, убеждение принять иной тип поведения при помощи комплиментов или обмана.

5. Консультирование до теста на ВИЧ

Консультирование должно быть предложено до проведения теста на ВИЧ. Его целью является профилактика передачи ВИЧ и оказание эмоциональной поддержки.

Консультанту следует подготовить клиента, объяснив, что представляет собой тест на ВИЧ, обсудить мифы и исправить неверные представления относительно ВИЧ/СПИДа. Можно также рассмотреть индивидуальную характеристику риска, которому подвергается клиент. Сюда может быть включено: обсуждение сексуальности; интимных отношений; возможных стилей поведения в связи с сексуаль-

цита человека или заболевания СПИДом выдворяются за пределы Республики Казахстан.

Не подлежат выдворению иностранные граждане, у которых муж или жена являются гражданами Республики Казахстан.

Статья 7. Социальная защита лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека

Граждане Республики Казахстан и лица без гражданства в случае заражения вирусом иммунодефицита человека имеют право на бесплатное лекарственное обеспечение, амбулаторную и стационарную помощь в государственных учреждениях здравоохранения и возмещение расходов, связанных с проездом к месту лечения и обратно, за счет учреждений здравоохранения по месту жительства.

На детей в возрасте до 16 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека или больных СПИДом, устанавливается государственное ежемесячное пособие в размере 80% минимальной заработной платы.

За одним из родителей, в случае расторжения им трудового договора в связи с уходом за детьми в возрасте до 16 лет, инфицированными вирусом иммунодефицита человека или больными СПИДом, сохраняется непрерывный трудовой стаж.

Детям и подросткам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека или больным СПИДом, обеспечивается обучение в школе и других учебных заведениях.

Не допускаются увольнения с работы, отказ в приеме на работу, в детские дошкольные учреждения и учебные заведения, а также ущемление иных прав и законных интересов лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека или больных СПИДом, равно как ущемление жилищных и иных прав их родных и близких.

Статья 8. Меры профилактики заражения СПИДом в отношении отдельных лиц и профессий

Медицинские и фармацевтические работники, работники сферы бытового обслуживания, зараженные вирусом иммунодефицита человека, подлежат отстранению от выполнения служебных обязанностей и переводу на другую работу.

Лицам, зараженным вирусом иммунодефицита человека, запрещается быть донорами крови, тканей и органов.

Статья 9. Ответственность за заражение вирусом иммунодефицита человека

Заведомое поставление в опасность заражения либо заражение другого лица вирусом иммунодефицита человека лицом, знавшим о наличии у него этого заболевания, влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Статья 4. Финансирование мероприятий по профилактике и борьбе со СПИДом

Финансирование мероприятий по профилактике и борьбе со СПИДом осуществляется за счет республиканского и местного бюджетов, добровольных взносов предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности, общественных объединений и граждан, пожертвований, благотворительной помощи, а также средств международных фондов.

Статья 5. Право граждан Республики Казахстан, иностранных граждан и лиц без гражданства на медицинское освидетельствование на СПИД

Граждане Республики Казахстан, а также иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории республики, имеют право на добровольное, конфиденциальное, анонимное медицинское освидетельствование в государственных учреждениях здравоохранения на выявление заражения вирусом иммунодефицита человека.

Статья 6. Обязанности граждан Республики Казахстан, иностранных граждан и лиц без гражданства проходить медицинское обследование на СПИД

Граждане Республики Казахстан, иностранные граждане и лица без гражданства обязаны проходить медицинское освидетельствование при наличии достаточных оснований полагать, что эти лица могут быть заражены вирусом иммунодефицита человека.

Основания и порядок направления граждан на обследование и лечение регламентируются Законом Республики Казахстан «Об охране здоровья народа в Республике Казахстан».

Сотрудники дипломатических, представительских и консульских учреждений иностранных государств и другие лица, пользующиеся на территории Республики Казахстан дипломатическими привилегиями и иммунитетом, освидетельствуются на заражение вирусом иммунодефицита человека только с их согласия. Предложение о необходимости их освидетельствования Министерство здравоохранения Республики Казахстан предварительно согласовывает с Министерством иностранных дел Республики Казахстан.

Лица, зараженные вирусом иммунодефицита человека, письменно уведомляются об этом учреждениями здравоохранения, выявившими факт инфицирования. Указанные лица обязаны соблюдать меры по предупреждению распространения инфекции, установленные Министерством здравоохранения Республики Казахстан.

Иностранные граждане, проживающие на территории республики, в случае уклонения от освидетельствования или профилактического наблюдения, а также в случае заражения вирусом иммунодефи-

чными отношениями и/или употреблением наркотиков, которые увеличивают риск заражения; методов профилактики ВИЧ. Консультант должен обсудить, что значит для человека знание своего серологического статуса, а также способы адаптации к этой новой информации. Часть сведений о ВИЧ и ДКТ возможно сообщать группам клиентов. Этот подход используется для сокращения затрат и может быть подкреплен распространением печатных материалов. Вместе с тем необходимо, чтобы каждому, обратившемуся за ДКТ, была доступна и индивидуальная дотестовая консультация.

Отказ от дотестового консультирования не должен препятствовать добровольному тестированию на ВИЧ (например, люди, ранее проходившие ДКТ, могут обратиться с целью тестирования, не нуждаясь в еще одной дотестовой консультации). Тем не менее получение информированного согласия от человека, подвергающегося тестированию, является минимальным требованием для прохождения теста на ВИЧ¹².

Дотестовое консультирование позволяет:

- Помочь клиенту/пациенту оценить личный риск в отношении заражения ВИЧ.
- Представить клиенту/пациенту процедуру тестирования и значение результатов теста.
- Понять клиенту/пациенту возможные последствия прохождения теста.
- Принять клиенту/пациенту осознанное решение о прохождении тестирования.
- Повысить осведомленность клиента/пациента по вопросам ВИЧ/СПИДа. Сформировать представление о безопасном поведении, поддержать изменения в поведении или попытки таких изменений.

Содержание дотестового консультирования

1. Оценка персонального риска заражения ВИЧ пациентом (информация о путях передачи ВИЧ и связь с поведением риска).
2. Оценка уровня знаний и способности справиться с кризисом.
 - Что знает пациент о тестировании и его пользе?
 - Почему пациент хочет пройти тест (и хочет ли)?
 - Что знает пациент о ВИЧ?
 - Думал ли пациент о реакции на различные результаты тестирования?
 - Если результат положительный, кто обеспечит поддержку?

¹² Технический обзор ЮНЭЙДС: Добровольное консультирование и тестирование (ДКТ). — ЮНЭЙДС, 2000.

3. Дать пациенту общие сведения о ВИЧ/СПИДе.
4. Информация о процедуре тестирования, возможных результатах, «периоде окна». (Здесь для консультанта важно точно знать, какие тест-системы используются, так как в зависимости от чувствительности тест-системы период, когда тест-система еще не может определить наличие антител в крови может длиться от 3–4 недель до 3–4 месяцев.)
5. Обсуждение потенциального значения (личное, медицинское, социальное, психологическое, юридическое) возможных результатов теста.
6. Получение согласия/отказа от пациента на прохождение теста.
7. Установление доброжелательных взаимоотношений в качестве основы для послетестового консультирования (если клиент решил пройти тест) или следующего обращения (если клиент решил не проходить тест).

Особенности консультирования до теста представителей уязвимых целевых групп представлены в таблице (см. стр. 40–41).

6. Консультирование после теста на ВИЧ

Послетестовое консультирование должно предлагаться при всех возможных результатах тестирования. Задачи и содержание консультирования после теста, безусловно, зависят от результата теста, который может быть положительным, отрицательным или неопределенным.

Задача послетестового консультирования при положительном результате — дать клиенту возможность понять и в ближайшей перспективе принять свой диагноз и начать планировать свою жизнь в новом качестве. Если тест отрицательный, задача заключается в том, чтобы клиент не забыл опыт и переживания, связанные с его прохождением. Они могут быть хорошей основой для формирования у клиента безопасного в отношении заражения ВИЧ поведения. При неопределенном результате важно способствовать тому, чтобы клиент с пониманием отнесся к техническим проблемам лаборатории (ничто не идеально!) и согласился на повторный тест для получения ясного результата.

Консультирование после теста — это процесс, который может уместиться в одну встречу консультанта с клиентом, но может потребовать и нескольких встреч.

Приложение VIII Законы и подзаконные акты о ВИЧ-инфекции

Алматы

№ 445 от 23 ноября 1994

ПРИКАЗ О мерах по реализации Закона Республики Казахстан «О профилактике заболевания СПИД»

ОБЪЯВЛЯЮ: Закон Республики Казахстан
«О профилактике заболевания СПИД» от 5 октября 1994 г.

Статья 1. Понятие СПИД

СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита — особо опасное инфекционное заболевание, связанное с заражением вирусом иммунодефицита человека.

Статья 2. Органы, учреждения и организации, осуществляющие профилактику и лечение СПИДа

К органам, учреждениям и организациям, осуществляющим при поддержке средств массовой информации и общественных объединений профилактику и лечение заболевания СПИДа, относятся: Министерство здравоохранения Республики Казахстан, отделы и управления (департаменты) здравоохранения, центры по профилактике и борьбе со СПИДом, станция переливания крови, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, другие министерства и ведомства.

Государство берет на себя ответственность по осуществлению необходимых мер и правовой защиты граждан по реализации настоящего Закона.

Лица, виновные в нарушении настоящего Закона, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Статья 3. Центры по профилактике и борьбе со СПИДом

Республиканский, областные, городские центры по профилактике и борьбе со СПИДом являются специализированными лечебно-профилактическими учреждениями особого типа, выполняющими комплекс лечебно-диагностических, профилактических, противоэпидемических мероприятий, направленных на своевременное выявление, лечение и предупреждение распространения заболевания СПИДа.

| План дотестового консультирования | Содержание дотестового консультирования для различных целевых групп (примерные фразы консультанта) | Осужденные, имеющие сексуальные контакты | Беременные женщины |
|--|---|--|---|
| 1. Обсуждение причины прихода на консультацию (или объяснение причины тестирования) и предложение услуг консультирования | Потребители инъекционных наркотиков (ПИН) — Добрый день. — Я вас слушаю... — У нас вы можете сдать кровь на ВИЧ, получить консультацию по вопросам ВИЧ/СПИДа. — Вы приглашены для прохождения теста на ВИЧ, есть ли у вас вопросы (хотите ли проконсультироваться по вопросам ВИЧ)? — Что вы знаете о ВИЧ/СПИДе? — Вы слышали о ВИЧ? | То же | То же |
| 2. Выяснение уровня знаний о ВИЧ и путей его передачи | — Если я правильно понял, вы считаете что... ваши представления ошибочны (правильны). — ВИЧ это... — ВИЧ передается... | То же | То же |
| 3. Исправление неправильных представлений о ВИЧ | — Как вы считаете, есть ли (была ли) у вас возможность заразиться ВИЧ? — Как вы поняли, существует много факторов, влияющих на вероятность заражения ВИЧ. Например, при употреблении наркотиков повышает риск инфицирования использование общих игл, шприцев... (консультант застывает задуматься потребителя над своим рискованным поведением, побуждает задавать вопросы, обсуждать конкретные случаи употребления наркотиков на воле или в заключении). | То же | Сказать о возможности передачи ВИЧ от матери ребенку (во время родов, при кормлении грудным молоком). |
| 4. Совместная оценка личного риска заражения ВИЧ | Например, при занятиях незащищенным сексом (при необходимости пояснить, что речь идет о презервативе) риск заражения ВИЧ повышается, если у партнера есть ИППП, раздражения слизистых, во время половых контактов присутствует кровь и т.д. Вероятность заражения зависит от вида сексуальной активности: анальный — самый высокий риск заражения, оральный — менее рискованный, чем вагинальный и анальный и т.д. | | В зависимости от рискованного поведения давать информацию (см. п.4 для ПИН и осужденных, имеющих сексуальные контакты). |

| Содержание дотестового консультирования для различных целевых групп (примерные фразы консультанта) | | | |
|--|--|---|--|
| План дотестового консультирования | Потребители инъекционных наркотиков (ПИН) | Осужденные, имеющие сексуальные контакты | Беременные женщины |
| 5. Информация о тестировании на ВИЧ (процесс тестирования, значение результатов теста, «период окна») | — Итак, мы с вами обсудили ваш риск заражения ВИЧ, и вы поняли, что действительно рискуете... — Я хочу предоставить вам информацию о процессе тестирования... (информация о «периоде окна», результаты теста, время и порядок тестирования). | То же | Сколько плановых тестирований предусмотрено в зависимости от срока беременности. |
| 6. Проверка степени понимания информации | — У вас возникли какие-либо вопросы по этой информации? — Что бы вы еще хотели узнать по этой теме? | То же | То же |
| 7. Обсуждение значення положительного и отрицательного результата и возможных рисков последствий. Принятие решения о прохождении теста или отказе от него. | — Итак, вы решили пройти тестирование на ВИЧ? — В случае положительного результата теста на ВИЧ вы можете обратиться за мед. помощью... вам нужно больше следить за своим здоровьем... вам нужно подумать, как это отразится на вашей дальнейшей жизни... | То же | Вам следует подумать о вашем будущем и о вашем ребенке (принять решение о прерывании или продолжении беременности). Возможность повысить вероятность рождения здорового ребенка. |
| 8. Обсуждение личного плана снижения риска заражения ВИЧ-инфекцией | — Таким образом, мы с вами обсудили возможные риски инфицирования ВИЧ, договорили о возможных последствиях, что вы решили? — После нашей беседы думаете ли вы изменить свое поведение? — Если я правильно понял, вы раньше не знали, что промывание шприца хлорным раствором уменьшает риск заражения ВИЧ и теперь вы намерены использовать эту процедуру при возможных случаях употребления наркотиков (расскажите об этой процедуре своим знакомым) — Если я правильно понял, вы решили отказаться от употребления внутривенных наркотиков? | — Если я правильно понял, то вы раньше не знали, что презерватив защищает от ВИЧ и теперь при посещениях комнаты свиданий будете использовать презервативы? — Я рад, что после нашей беседы вы поняли, насколько опасен анальный секс без презерватива и решили снизить неоправданный риск заражения ВИЧ | — Если я вас правильно понял, на время беременности вы постараетесь воздержаться от наркотиков? |
| 9. Прощание, Планирование дальнейших встреч | — Результат вашего теста будет готов... жду вас тогда-то. — Если у вас возникнут еще вопросы, можете обратиться ко мне в такое-то время. | То же | То же |

Приложение VII Оппортунистические инфекции (ОИ)

В течении ВИЧ-инфекции наступает момент, когда снижение иммунитета делает возможным развитие оппортунистических заболеваний. Термин «оппортунистический» (приспосабливающийся, пользующийся случаем) подчеркивает, что они развиваются в случаях иммунной депрессии.

Оппортунистические заболевания имеют инфекционную и неинфекционную природу. Инфекции могут быть вызваны бактериями, вирусами, грибами, простейшими. Неинфекционные процессы чаще всего представляют собой различные опухоли (лимфомы).

Для Казахстана в период с 1993 по 1999 год и в настоящее время значимыми остаются туберкулез, герпетическая инфекция (ГИ), кандидоз, поражение нервной системы, бактериальные инфекции (сепсис, пневмонии). Причем туберкулез занимает лидирующее положение в структуре оппортунистических инфекций, встречаясь у 30–35% больных и в одной трети случаев являясь причиной смерти от СПИДа.

Примерный сценарий дотестового консультирования

| Цели, задачи | Слова, фразы | Невербалика | Материал | Другое |
|--|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Приветствие, 1–2 мин | | | | |
| Создать атмосферу доверия, познакомиться. | «Добрый день», «Проходите, пожалуйста», «Располагайтесь», «Как мне вас называть?» | Смотреть в глаза, открытая поза, мимика, жесты, улыбка. | Бейджи, таблички на дверях. | Удобно расположить стул, снять халат. |
| 2. Выяснение потребностей клиента, 7–10 мин | | | | |
| Узнать причину прихода. | «Чем я могу помочь?», «Слушаю вас». | Взгляд, кивки, наклон вперед | Визитки, листовки с перечнем услуг. | Взгляд деловой. |
| 3. Предложение своих услуг, 2–5 мин | | | | |
| Обозначить поле деятельности, мотивировать на информацию, пробудить интерес к услугам. | «Да, у нас вы можете...», «Я могу дать информацию...», «Вы можете задавать любые вопросы». | | | |
| 4. Выход на возможные проблемы, 5–7 мин | | | | |
| Определить поведение с точки зрения риска, дать информацию о ВИЧ, совместно оценить риск. | «Как вы думаете, ваше сексуальное поведение связано с риском?», «Вы знаете, как передается ВИЧ?», «Что вы знаете о ВИЧ?» | | Наглядные пособия. | |
| 5. Рекомендации, советы, предложения, информация, 5–7 мин | | | | |
| Принять решение, сформировать отношение к проблеме, информация о способах защиты, справочные службы, мотивированность на получение дополнительных услуг. | «Мы обсудим, и вы примете решение», «Что вы решили?» | Не смотреть на часы, не торопиться. | Телефоны других организаций, буклеты. | |
| 6. Прощание, 1–3 мин | | | | |
| Оставить дверь открытой, согласовать план следующей встречи. | «До свидания», «Если у вас возникнут вопросы, приходите». | Телесный контакт, похлопывание. | | |

6.1. Отрицательный результат

Консультирование при отрицательном результате теста не менее важно, чем при положительном. В то время как клиент, вероятно, будет испытывать облегчение и предпочтет быстрее покинуть кабинет, консультант должен постараться объяснить ему истинную значимость полученного опыта. Важно дать клиенту возможность подумать над тем, что он чувствует по поводу отрицательного результата, и рассказать, что он может сделать, чтобы сохранить ВИЧ-отрицательный статус.

Уместно повторить основную информацию о безопасном сексуальном поведении (использование презервативов, снижение числа сексуальных партнеров) и о рисках, связанных с употреблением психоактивных веществ через инъекции. Возможно, стоит обсудить, пользуется ли клиент презервативами, и если нет, то выяснить причины отказа, предоставить информацию об эффективности и правильном применении презервативов для профилактики ВИЧ и ИППП.

Если клиенту требуется поддержка или помощь в связи с химической зависимостью, важно предоставить ему информацию о доступных программах лечения химических зависимостей, о программах снижения вреда или группах/программах психосоциальной поддержки и реабилитации.

Так же важно еще раз повторить информацию о «периоде окна» (приблизительно 4–6 недель после заражения, когда тест-системы не способны определить наличие антител), и упомянуть в связи с этим о возможности сдать повторный тест по истечении этих 4–6 недель.

Примерная схема консультирования после теста при отрицательном результате:

- Поприветствовать клиента.
- Подтвердить гарантии конфиденциальности.
- Напомнить пациенту о содержании консультирования до теста.
- Сообщить результат тестирования и объяснить значение такого результата.
- Убедиться, что клиент правильно понимает результат теста.
- Спросить о том, что клиент думал и чувствовал в ожидании результата?
- Обсудить индивидуальный план безопасного поведения/снижения риска заражения.
- Предоставить информацию о службах, куда можно обратиться за информацией, помощью и поддержкой.
- Объяснить возможность повторного тестирования, причину, по которой оно может понадобиться.

Приложение VI Влияние лечения на течение ВИЧ-инфекции

Поиск эффективных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции — одна из самых актуальных задач современной медицины. Существующие лекарственные препараты не могут излечить это заболевание, но способны снизить скорость или остановить его прогрессирование.

Терапия несколькими препаратами (комбинированная терапия), предотвращающими реализацию разных этапов процесса размножения вируса, позволила перевести ВИЧ-инфекцию в разряд хронических заболеваний.

Цель терапии — подавление количества вируса в организме до минимального уровня.

Решение о начале антиретровирусной терапии должно быть принято врачом совместно с пациентом.

Антиретровирусная терапия (АРТ) является неотъемлемой и важнейшей частью комплексной терапии ВИЧ-инфекции, которая включает также лечение и профилактику оппортунистических инфекций, патогенетическую, симптоматическую, общеукрепляющую терапию и психосоциальную поддержку.

При правильном применении существующих схем терапии ВИЧ-инфицированный человек может многие годы сохранять хорошее самочувствие, физическую и социальную активность.

В Казахстане зарегистрировано более десяти антиретровирусных препаратов. Комбинированная терапия используется с 2001 года, в том числе и для лечения ВИЧ-положительных женщин во время беременности.

- Ответить на возникшие вопросы и уточнения.
- Напомнить, что пациент, в случае возникновения вопросов, всегда может обратиться в данную службу.

6.2. Консультирование после неопределенного результата теста

Результат теста считается неопределенным, если он ни определенно положительный, ни определенно отрицательный.

Интерпретация результата тестирования

Объясните клиенту, что этот результат неокончательный и может означать:

- человек не инфицирован, но в организме имеются сходные с антителами к ВИЧ компоненты;
- человек инфицирован ВИЧ, но в организме еще нет достаточного количества антител.

Чувство раздражения из-за того, что служба (лаборатория) не предоставила ясного результата, может привести к импульсивному желанию клиента отказаться от завершения тестирования (получения ясного результата). Консультант должен постараться объяснить клиенту, что ясный результат необходим для того, чтобы уверенно планировать свою дальнейшую жизнь. Если клиент все же отказывается от повторного теста, важно «оставить двери открытыми»: предложить клиенту пройти повторный тест в любое время, когда он решит, что хочет это сделать. В этой ситуации не стоит «давить» на клиента или запугивать его. Основной упор должен быть сделан на искреннее желание помочь клиенту, если у него возникнет потребность в помощи или информации.

Примерная схема консультирования после теста при неопределенном результате:

- поприветствовать клиента.
- Подтвердить гарантии конфиденциальности.
- Напомнить пациенту о содержании консультирования до теста.
- Сообщить результат тестирования и объяснить значение такого результата.
- Убедиться, что клиент правильно понимает результат теста.
- Объяснить необходимость повторного тестирования и предложить срок тестирования.
- Обсудить, кто может оказать клиенту поддержку в данный период, в том числе предоставить информацию о службах, куда можно обратиться за информацией, помощью и поддержкой.
- Напомнить, что клиент до выяснения своего ВИЧ-статуса должен предпринимать все меры предосторожности, не допуская

контактов других людей со своей кровью, спермой или вагинальной жидкостью.

- Обсудить индивидуальный план безопасного поведения/снижения риска заражения.
- Ответить на возникшие вопросы и уточнения.
- Напомнить, что пациент, в случае возникновения вопросов, всегда может обратиться в данную службу.

6.3. Положительный результат

В случае положительного результата консультант должен сообщить об этом клиенту спокойно и ясно, без выражения сожалений. При этом консультант не должен быть полностью формален. Необходимо показать клиенту, что консультант понимает сложность ситуации и готов поддержать клиента, обсудить, как ему лучше справиться с ситуацией. Во время этой встречи консультант должен убедиться, что человек имеет непосредственную эмоциональную поддержку со стороны ближайшего окружения: постоянного сексуального партнера, родственника или друга. По мере готовности клиента консультант может проинформировать его о возможности направления к специалистам, которые могут помочь клиенту принять его ВИЧ-статус и настроиться на положительную перспективу. Возможность поделиться известием о сероположительном результате с партнером, членом семьи или другом часто бывает полезной, и некоторые клиенты могут пожелать, чтобы кто-то сопровождал их и участвовал в консультации. Необходимо также обсудить вопросы предотвращения передачи ВИЧ неинфицированному или не прошедшему тестирования сексуальному партнеру/партнерам. При этом на первой консультации не стоит слишком настойчиво предлагать клиенту обязательно сообщить о его ВИЧ-статусе его сексуальным партнерам и привести их для консультации и тестирования. Эта тема может быть безболезненно обсуждена после того, как клиент получит ответы на вопросы о своей собственной перспективе.

Главной целью консультирования после теста при сообщении положительного результата является оказание клиенту помощи и поддержки, где профилактика дальнейшей передачи ВИЧ является одной из тем: чем меньше окружающие будут бояться ВИЧ-позитивного человека, тем большую помощь они будут готовы ему оказать. Часто при получении положительного результата теста клиенту может понадобиться кризисное консультирование, так как известие о ВИЧ-инфекции воспринимается как немедленная угроза жизни.

Консультирование будет особенно эффективным, если до- и послетестовое консультирование будет проводить один консультант, так как на основании первой встречи консультант сможет выбрать наиболее подходящий способ сообщения этого известия данному клиенту и затронуть наиболее актуальные темы. При положительном результате теста конфиденциальность приобретает особенное значение. Клиен-

Приложение V Медицинское наблюдение

Дополнительные виды исследований для ВИЧ-инфицированных клиентов

Диагностические тесты (ИФА, ПЦР) для выявления СПИД-индикаторных инфекций: оксиплазма, цитомегаловируса, вирусов простого герпеса, гепатитов В и С. При положительных результатах проводятся дополнительные исследования и в случае необходимости назначают лечение выявленных инфекций.

Иммунологическое обследование. Одним из наиболее важных является исследование таких характеристик иммунного статуса, как число CD4+ клеток (клеток Т-хелперов) в крови. Этот тест дает врачу важную информацию о состоянии иммунной системы ВИЧ-инфицированного и о том, какое влияние на нее оказывает ВИЧ.

В норме у взрослых число CD4+ лимфоцитов составляет около 700–1200 в мм³. Иммунодефициты, приводящие к снижению CD4+ клеток, бывают наследственными и приобретенными. Приобретенные иммунодефициты могут возникать по причине ВИЧ-инфекции, из-за перенесенных вирусных инфекций (грипп, мононуклеоз, краснуха и др.) и в качестве побочных эффектов применения некоторых лекарств. Эффективность иммунного ответа может также уменьшаться после переливания крови, хирургических операций, недостаточного питания и стресса. После устранения причин временного снижения иммунного статуса число CD4+ клеток обычно возвращается к норме.

ВИЧ-инфицированные клиенты должны обсуждать результаты лабораторных исследований со своим врачом. Проводить диагностику заболевания и объяснять результаты теста могут только компетентные специалисты.

ту нужно дать время, чтобы воспринять это известие. После периода предварительной адаптации клиенту нужно дать четкое объяснение значения результата теста.

Кроме того, это время для стимуляции позитивного мышления клиента. Клиенту с диагностированной ВИЧ-инфекцией скорее всего предстоит безболезненно прожить многие годы, к тому же лечение некоторых оппортунистических заболеваний очень эффективно и доступно. Данную информацию следует предоставить клиенту. Возможность лечения антиретровирусными препаратами (АРВ-терапию) следует упомянуть, но предложить клиенту подробнее обсудить этот вопрос с врачом, который будет его наблюдать. Если у клиента есть потребность в дополнительной помощи или поддержке, необходимо сообщить, как связаться с консультантом в моменты кризиса или тяжелого стресса.

Необходимо также подчеркнуть важность плановых встреч со специалистами СПИД-центра, соблюдения их рекомендаций и назначений, с целью поддержания здоровья клиента.

Кроме знания о возможностях для сохранения здоровья, клиент должен понять, что он является источником инфекции и что ему необходимо подумать о предохранении от инфекции своего сексуального партнера.

Как объявлять положительный результат теста на ВИЧ:

- Поприветствовать клиента.
- Подтвердить гарантии конфиденциальности.
- Напомнить пациенту о содержании консультирования до теста.
- Сообщить результат тестирования прямо, коротко, нейтральным тоном: «У вас положительный результат». Показать результат теста.
- Дать возможность клиенту отреагировать на информацию, выразить свои чувства.
- Убедиться, что человек правильно понимает результат тестирования. Ответить на его вопросы.
- Оказать эмоционально-психологическую поддержку. Подчеркнуть, что возникшие чувства нормальны в таких ситуациях.
- Оценить способность справиться со стрессовой ситуацией и выяснить потенциальные источники поддержки.
- Обсудить, кто в настоящий момент может оказать человеку поддержку, кому он может рассказать о своем результате.
- Обсудить с клиентом значение здорового образа жизни: здоровое питание, полноценный сон, физические упражнения и пр.
- Объяснить клиенту важность последующего медицинского наблюдения, обследования, необходимость раннего начала лечения симптомов.

- Обсудить индивидуальный план безопасного поведения/снижения риска передачи ВИЧ-инфекции. Обсудить, что и как клиент может изменить в своем поведении. Объяснить безопасность бытовых контактов.
- Предоставить информацию об организациях и службах, предоставляющих помощь и поддержку людям, живущим с ВИЧ/СПИДом.
- Ответить на вопросы пациента.

7. Консультирование людей, живущих с ВИЧ/СПИДом

Описанное в главах 7 и 8 выходит за рамки консультирования до и после теста на ВИЧ. Эти главы помещены в руководство по консультированию до и после теста исходя из предположения, что многие специалисты, направляющие своих пациентов/клиентов на тест и проводящие консультирование по поводу теста, продолжают работать с теми, у кого в ходе тестирования обнаружен ВИЧ.

Фактически речь здесь идет о **долговременном сопровождении** пациентов/клиентов с ВИЧ. Вопросы, описанные ниже, могут несколько раз затрагиваться клиентом и консультантом в течение длительного времени.

7.1. Вопросы для обсуждения с ВИЧ-позитивными клиентами

С человеком, только что узнавшим, что он инфицирован ВИЧ, необходимо обсудить несколько тем. Важно помнить, что клиент находится в психотравмирующей ситуации, переживает стресс. Одна из главных задач консультирования на данном этапе — эмоциональная поддержка. Другой задачей является предоставление клиенту необходимой фактической информации по ВИЧ/СПИДу и обсуждение вопросов жизни с ВИЧ. Консультант должен понимать, что клиент может оказаться не в состоянии воспринять весь объем информации за одну встречу, соответственно нужно установить с ним доверительные отношения, чтобы человек смог обратиться еще раз в случае, если потребуется дополнительная информация или помощь. Клиенту нужно сообщить и о других организациях и службах, предоставляющих помощь ЛЖВС.

Темы, обсуждаемые в этом разделе, определены как полезные для разговора с ВИЧ-положительными клиентами. Многое зависит от эмоционального состояния клиента, его открытости к получению информации и возможностей ее принять и понять.

ВИЧ или СПИД?

Клиент может не знать, что быть инфицированным — не то же самое, что болеть СПИДом. Раннее выяснение этого обстоятельства может исключить непонимание в дальнейшем. Краткое объяснение,

- клиент не инфицирован, но в организме имеются сходные с антителами к ВИЧ компоненты;
- у клиента — СПИД (иммунная система значительно ослаблена и уже не способна производить достаточное количество антител).

Обычно при неопределенном результате ИБ клиенту предлагают пройти повторное тестирование через две недели, один месяц, три месяца и шесть месяцев. Стабильный неопределенный результат в течение шести месяцев (при отсутствии клинических проявлений) говорит о том, что человек не инфицирован.

4. Полимеразная цепная реакция (ПЦР)

ПЦР позволяет определять наличие вирусных компонентов РНК или ДНК в клетке. Чувствительность и специфичность этого теста ниже тех, которые были указаны для ИФА-тестов и иммуноблотинга. ПЦР также является высокотехнологичным тестом, и малейшее нарушение методики его проведения может повлиять на результат. В связи с этим он пока не может быть рекомендован в качестве «золотого» критерия для постановки и подтверждения диагноза ВИЧ-инфекции. В то же время тест ПЦР крайне полезен в следующих случаях:

- определение наличия/отсутствия ВИЧ в «период окна»;
- количественное измерение вирусных частиц в плазме (вирусная нагрузка);
- определение ВИЧ-статуса детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей, в возрасте до 18 месяцев.

5. Алгоритм лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции в Республике Казахстан

Биообразец — сыворотка крови.

I этап — **скрининговый**: используются скрининговые тест-системы. Метод исследования — ИФА.

При получении двух положительных результатов сыворотку передают на подтверждающий этап.

II этап — **подтверждающий**: используются экспертные тест-системы (тесты, рекомендованные ВОЗ). Метод исследования — ИФА.

При подтверждении положительного результата сыворотку передают на экспертный этап.

III этап — **экспертный**: используется подтверждающий тест. Метод исследования — иммуноблот (ИБ).

Следует сказать, что качество ИФА-тестов может варьироваться; иногда специфичность теста составляет 98%, и в таком случае риск ложноположительных результатов возрастает до 20 из 1000. Необходимо также отметить, что некоторые заболевания и состояния сопряжены с риском появления антител, похожих на антитела к ВИЧ, что снижает их специфичность и ведет к ложноположительным результатам теста на ВИЧ.

Ложноположительные результаты теста теоретически возможны в следующих случаях:

- у беременных женщин, особенно если это первая беременность;
- при почечной недостаточности;
- у реципиентов крови или у людей, перенесших пересадку органов (за исключением пересадки собственной кожи);
- у больных раком и некоторыми аутоиммунными заболеваниями (например, ревматическим артритом).

Поэтому положительный результат теста ИФА всегда должен быть подтвержден другими тестами.

3. Вестерн Блот (иммуноблот, ИБ)

Чаще всего в качестве подтверждающего теста выбирают ИБ, тест, также выявляющий в крови антитела к ВИЧ. Это второй по распространенности тест для исследования на ВИЧ. Но, так как это достаточно сложный в постановке и достаточно дорогой тест, обычно его используют для подтверждения положительных результатов ИФА.

ИБ может иметь три результата: положительный, отрицательный и неопределенный. Специфичность и чувствительность иммуноблота составляет 99,9%. Это означает, что его результаты в подавляющем большинстве случаев соответствуют истине.

Негативный результат ИБ говорит о том, что антител к ВИЧ не найдено. Если после положительного результата ИФА-теста ИБ показывает негативный результат, это значит, что результат ИФА-теста был ложноположительным.

Положительный результат ИБ говорит о том, что в пробе крови присутствуют специфические антитела к ВИЧ (gp120 или gp160, gp41 и p24), т. е. человек, сдавший кровь, ВИЧ-инфицирован.

Ложноположительные и ложноотрицательные результаты ИБ возможны, но их вероятность крайне мала и составляет 1–5/100 000. Ложные реакции ИБ чаще всего связаны с нарушением технологии постановки теста. Неопределенным считается результат, когда у клиента выявляется наличие менее двух из перечисленных выше специфических антител. Это может произойти в случае, если:

- клиент инфицирован ВИЧ, но в организме еще нет достаточного количества антител;

как ВИЧ может повредить организму, также часто бывает полезно для многих обращающихся.

Объясните, что сопротивляемость иммунной системы у людей различается и что есть много примеров, когда люди, живущие с ВИЧ, ведут полноценную и продуктивную жизнь.

Медицинское наблюдение и помощь

Объясните, что за состоянием здоровья клиента обязательно должен постоянно наблюдать врач, специалист по ВИЧ/СПИДу. Дайте информацию об учреждениях, которые оказывают медицинскую помощь людям, живущим с ВИЧ/СПИДом.

Подчеркните необходимость полного врачебного обследования. Объясните важность обследования на другие инфекции, передающиеся при сексуальных контактах, вирусные гепатиты В и С.

Справочная служба и рекомендации

Чтобы оказывать эффективную помощь обратившимся к вам людям, необходимо располагать информацией о существующих и доступных клиенту службах (телефонах доверия, кабинетах психологической помощи, группах поддержки), государственных и неправительственных организациях, которые предлагают необходимую помощь и услуги (медицинские, психологические, социальные, юридические) людям, живущим с ВИЧ/СПИДом. Важно постоянно обновлять и проверять информацию о тех службах, которые вы сможете рекомендовать своим пациентам/клиентам. Удобным вариантом является предоставление информации в печатной форме.

Информационная поддержка

Напомните клиенту, что он сам может и должен играть активную роль в поддержании своего здоровья. Что ему полезно быть в курсе новой информации, связанной с ВИЧ-инфекцией и здоровьем. Особенно это касается выбора лечения. Существует много источников, которые могут быть полезными клиенту. Сообщите адреса и телефоны организаций, которые являются надежным источником информации.

Практическая поддержка

Клиент может нуждаться в обсуждении психосоциальных аспектов жизни с ВИЧ — таких, как поиск работы, финансы, сообщение о своем ВИЧ-статусе членам семьи и другим людям. Не забывайте, что ваша инициатива в обсуждении этих вопросов может усилить волнение клиента. Оцените, насколько вы готовы говорить на эти темы. В случае если ваших практических навыков коммуникации недостаточно или вы ограничены во времени, порекомендуйте соответствующую организацию или службу, которая поможет клиенту разобраться в этих вопросах.

Эмоциональная поддержка

Сообщите клиенту, что группы поддержки (если они есть) представляют собой великолепную возможность для обмена информацией о лечении, обсуждения путей управления стрессом, взаимной эмоциональной поддержки. Индивидуальное консультирование психотерапевта выбирают те, кто невосприимчив к групповым занятиям, те, кто нуждается в более глубоком консультировании, а также те, кому группа недоступна (по причине ее отсутствия, например). Расскажите об имеющихся и доступных службах, сообщите адреса, телефоны, назовите контактных лиц.

7.2. Рекомендации по охране здоровья

Обсудите с клиентом значение профилактики заражения какими-либо инфекциями и обращения к врачу при появлении первых симптомов заболевания.

Важно принять меры против повторного заражения ВИЧ. Лица с ВИЧ рискуют получить при заражении дополнительную дозу вируса или инфицироваться другим субтипом ВИЧ. Это может увеличить риск развития СПИДа.

Необходимо предотвращать заражение другими инфекциями, передающимися при сексуальном контакте. Так, для лечения сифилиса на фоне ВИЧ-инфекции требуются значительно большие, чем обычно, дозировки антибиотиков. Антибиотики же обладают сильным иммунодепрессивным действием и разрушают флору желудка, что нарушает усвоение пищи и приводит к сильным поносам или запорам. Саркома Капоши — наиболее частое раковое заболевание, диагностируемое у больных СПИДом. Ее причина не до конца изучена, но ведущая гипотеза объясняет возникновение этого заболевания присоединением другой инфекции, передающейся при сексуальном контакте (в добавление к ВИЧ). Поэтому ВИЧ-инфицированным людям следует всегда практиковать безопасный секс.

Человек с опоясывающим лишаем не должен ухаживать за человеком с ВИЧ-инфекцией, пока проявления заболевания не исчезнут. Это необходимо делать потому, что опоясывающий лишай и ветряная оспа вызываются одним и тем же вирусом; контакт с человеком, больным опоясывающим лишаем, может привести к развитию у ВИЧ-инфицированного либо ветряной оспы, либо опоясывающего лишая. Если ВИЧ-инфицированный был в контакте с больным опоясывающим лишаем или ветряной оспой, он должен обратиться к своему врачу в течение 24 часов. Ацикловир, принятый своевременно, может помочь предотвратить развитие серьезных осложнений у ВИЧ-инфицированного.

ВИЧ-инфицированным женщинам рекомендуется ежегодно проводить исследование влагалищного мазка.

Приложение IV Тестирование

1. Лабораторные тесты и их результаты

Диагностика ВИЧ-инфекции представляет собой комплексный процесс, основанный на данных лабораторного, клинического и эпидемиологического обследований. В настоящее время наиболее распространенным способом лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции является исследование образца крови.

Лабораторные тесты для диагностики ВИЧ можно разделить на:

- **непрямые** (устанавливающие наличие в организме человека не самого вируса, а антител к нему);
- **прямые** (устанавливающие наличие в организме определенных белков, составляющих неотъемлемую часть вируса, таких как белки вирусной оболочки или вирусная РНК).

Первая группа тестов — **серологические**:

Иммуноферментный анализ (ИФА или ELISA в английской транскрипции): определение антител к ВИЧ и p24 антигена.

Иммуноблот (ИБ): определение антител к белкам ВИЧ.

Вторая группа тестов — молекулярные (ПЦР). С их помощью определяют качественное и количественное содержание РНК или ДНК вируса, устойчивость ВИЧ к различным лекарственным препаратам.

2. Иммуноферментный анализ (ИФА)

Этот относительно недорогой тест имеет широкое распространение в большинстве стран.

Результат ИФА может быть позитивным или негативным. Негативный результат означает, что в данной пробе крови не обнаружено антител к ВИЧ.

Современные ИФА-тесты являются высокочувствительными методами диагностики — до 99,8%. Иными словами, если в организме человека есть то, на что реагирует тест, вероятность наличия инфекции составляет 998 случаев из 1000.

Другая, не менее важная характеристика теста — его специфичность: вероятность того, что в случае, когда он дает положительную реакцию, он реагирует именно на антитела к ВИЧ. Последние поколения тестов ИФА — высоко специфичны. При специфичности теста 99,8% вероятность того, что человек с положительным результатом теста на ВИЧ является ВИЧ-инфицированным, составляет 998 из 1000. В тех случаях, когда тест оказывается положительным, а человек не инфицирован ВИЧ, говорят о ложноположительном тесте.

При общении с домашними животными:

- людям, живущим с ВИЧ/СПИДом, рекомендуют не чистить кошачьи туалеты, аквариумы и птичьи клетки. Если они все-таки этим занимаются, им следует надевать латексные или виниловые перчатки (некоторые источники рекомендуют также маски на лицо);
- необходимо мыть руки с мылом каждый раз после того, как они гладили или держали на руках животных, особенно после чистки подстилок или жизненной территории животных;
- ВИЧ-инфицированным не следует брать на руки больных животных и иметь дело с их подстилками.

Основные правила приготовления пищи, которые помогут человеку с ВИЧ/СПИДом обезопасить свое здоровье:

- избегать употребления не пастеризованного молока;
- не употреблять сырые яйца, включая блюда, в процессе приготовления которых были использованы сырые яйца (домашний майонез, домашнее мороженое и др.);
- мясо и домашняя птица должны быть хорошо прожарены (они не должны иметь следов сырой крови — розового цвета внутри); нельзя есть сырую рыбу или моллюсков;
- тщательно очищать кожуру сырых овощей, фрукты тщательно мыть (лучше — ошпаривать кипятком).

Для предотвращения взаимной контаминации пищи (особенно при обработке сырого мяса или птицы):

- мыть руки перед едой;
- мыть с мылом или при помощи других моющих средств (например, соды) всю посуду непосредственно перед ее использованием. Это необходимо делать с целью удаления с посуды пыли и следов насекомых (если, например, на тарелке сидела муха), в которых могут содержаться опасные для кишечника инфекции;
- следить, чтобы необработанные в процессе варки жидкости от продуктов (кровь от мяса, вода от рыбы, креветок или других морепродуктов) тщательно смывались и не попадали на другие продукты;
- использовать пластиковую, а не деревянную доску для резки, поскольку ее легче очистить.

7.3. Здоровый образ жизни

Обсудите с клиентом важность здорового образа жизни, включая сбалансированное питание, диету и умеренную (но обязательную — для поддержки мышечной массы) физическую нагрузку.

Обсудите преимущества отказа от алкоголя и табака, которые влияют на здоровье и/или ослабляют сопротивляемость организма. Давно

известно, что курение табака чрезвычайно вредно для здоровья всех людей. Отказ от курения приводит к снижению риска заболевания респираторными инфекциями, которые при наличии хронических заболеваний часто становятся причиной смерти ВИЧ-инфицированных. Если отказ от алкоголя не представляется возможным, можно снизить его употребление до минимума: не более 30–50 граммов крепких спиртных напитков или 150–200 граммов сухого вина в сутки. Если у клиента есть алкогольная зависимость, можно посоветовать ему обратиться к наркологу и/или в специальные группы взаимопомощи.

Обсудите вопрос необходимости снятия стресса. Умение справиться со стрессом включает физические упражнения, проведение времени с друзьями, посещение групп поддержки, медитацию, упражнения по расслаблению, витаминотерапию.

7.4. Сексуальные отношения и профилактика передачи ВИЧ-инфекции

Объясните клиенту, что он/она может передавать ВИЧ-инфекцию и сам/сама заразиться ИППП или повторно ВИЧ-инфекцией в том случае, если происходит обмен жидкостями организма (кровью, спермой или вагинальным секретом) с другими людьми. Будьте внимательны и не читайте клиенту нотаций, чтобы не возник барьер в общении. Хорошим способом обсуждения этой проблемы является такая постановка вопроса: «Вы знаете, что такое безопасный секс?» или «Что вы думаете о безопасном сексуальном поведении?»

Обсудите с клиентом важность безопасного сексуального поведения, которое исключает обмен жидкостями организма. Обсудите применение презервативов, лубрикантов, спермицидов. Будьте готовы обсудить риск использования общих шприцев и игл. Кроме того, убедитесь, что клиент понял: реинфекция ВИЧ или заражение другими болезнями, передающимися половым путем, может принести вред его собственному здоровью. С другой стороны, при ИППП увеличивается содержание ВИЧ в семенной жидкости и влагалищных секретах, что приводит к повышению риска передачи ВИЧ.

Рекомендации по снижению риска при сексуальных контактах для людей с ВИЧ-инфекцией ничем не отличаются от рекомендаций для не инфицированных ВИЧ людей.

7.5. Советы опытных специалистов по консультированию людей, живущих с ВИЧ/СПИДом

Памятка для консультанта

- Не делайте заранее предположений, что ВИЧ-инфицированный клиент обязательно что-либо знает о ВИЧ/СПИДе.
- Спросите, существует ли у клиента поддержка со стороны друзей, близких, медицинских работников и пр.

На скорость прогрессирования болезни могут влиять такие факторы, как состояние иммунной системы человека, его возраст, образ жизни, наличие сопутствующих заболеваний (например, туберкулеза или сифилиса).

В настоящее время существуют медикаменты, способные снизить темп развития ВИЧ-инфекции, — это антиретровирусные препараты. Другие препараты могут предотвратить или вылечить некоторые оппортунистические заболевания. Ранняя диагностика дает больше возможностей для профилактики и лечения. Поэтому для человека, живущего с ВИЧ/СПИДом, важно оставаться хозяином положения и своей жизни. В этом ему поможет информация о развитии ВИЧ-инфекции, о значении результатов анализов, о способах поддержания своего здоровья, о новых лекарственных препаратах и методах лечения.

связи представляется особенно актуальным наличие предварительной договоренности между партнерами об использовании методик безопасного секса.

2. Период инфицирования

Человека следует считать инфицированным с момента предполагаемого опасного воздействия, но достоверный диагноз может быть поставлен только по результатам тестирования на ВИЧ.

Проведенные исследования указывают, что наиболее высокий риск инфицирования других людей приходится на период, непосредственно следующий за инфицированием (продолжительность периода — около полугода). В это время риск может быть в 100–1000 раз выше, чем в «бессимптомном периоде». Развитие ВИЧ-инфекции во многом сходно с развитием таких инфекций, как грипп или ветряная оспа, — они наиболее заразны до появления антител к вирусу.

3. Период выработки антител («период окна»)

Сегодня наиболее распространенным методом выявления ВИЧ являются тесты на наличие антител. Организму требуется некоторое время, чтобы в ответ на проникновение вируса выработать антитела. Временной промежуток между инфицированием и производством достаточного для обнаружения количества антител называется периодом «сероконверсии» или «периодом окна». У подавляющего большинства ВИЧ-инфицированных людей достаточное для обнаружения количество антител образуется в течение первых трех месяцев после инфицирования (в среднем 25 дней). В очень редких случаях этот период может длиться до шести месяцев.

4. Инкубационный период

Инкубационный период — это время от момента инфицирования до момента появления клинических симптомов острой стадии ВИЧ-инфекции. Но у некоторых людей стадия острой ВИЧ-инфекции может протекать без клинических проявлений, переходя в стадию бессимптомной инфекции, когда уже определяются антитела.

Сейчас среди специалистов по ВИЧ не принято употреблять термин «инкубационный период», так как он применим в основном по отношению к острым инфекциям, а не к хроническим, каковой является ВИЧ-инфекция.

5. Прогноз для людей, живущих с ВИЧ

Период от момента инфицирования до проявления клинических симптомов и последующей постановки диагноза СПИДа может продолжаться несколько лет (без применения АРВ-терапии в среднем 10–13 лет). У небольшой части ВИЧ-инфицированных клинических проявлений может не наблюдаться на протяжении 15 и более лет.

- Часто ВИЧ-инфицированные клиенты обращаются за консультацией потому, что они испуганы и хотят с кем-то поговорить. Дайте им возможность выговориться, прежде чем давать информацию.
- Будьте готовы к тому, что вне зависимости от того, насколько вы хотите помочь кому-либо, возможны моменты, когда вы почувствуете себя абсолютно беспомощными.
- Помните, что вы не несете ответственности за ситуации, находящиеся вне зоны вашего влияния. Если вам кто-то звонит из сельской местности, где вокруг на 300 километров нет ни одной службы помощи, — это не ваша вина.
- Не перегружайте клиента информацией. Дайте ему/ей знать, что можно перезвонить/прийти в другое время и поговорить о наиболее волнующей проблеме.
- Всегда будьте честны. Не приукрашивайте факты только для того, чтобы клиент чувствовал себя лучше. Когда он узнает правду — будет только хуже.
- Умейте сказать: «Я не знаю». Если вы затрудняетесь ответить на какой-либо вопрос, не стесняйтесь в этом признаться. Это только поможет укрепить доверие между вами и клиентом. Вы можете пообещать, что к следующей встрече постараетесь найти ответ на этот вопрос или дать конкретные рекомендации, куда лучше обратиться за информацией.
- По какой-то причине клиент может разозлиться. Не принимайте этого на свой счет. Вы не виноваты и не должны отвечать за то, что кто-то в автобусе был груб с ним. Ваша цель — говорить о ВИЧ-инфекции и помочь принять эффективные меры для сохранения его здоровья.
- Чрезвычайно важно, чтобы по вашему тону и общему отношению клиент понял: он/она остается человеком, полноправным членом общества, обладателем человеческого достоинства. Для многих людей, получивших положительный результат при тестировании на ВИЧ или диагноз СПИД, основным кризисным вопросом становится: «Кто я теперь? Как мне дальше думать о себе? Отвергнут ли меня другие?»

Темы, чаще всего затрагиваемые во время консультаций

Проблемы, которые поднимают люди в ходе консультирования, часто касаются широкого круга тем: неопределенности, сохранения тайны, утраты. Консультанты отмечали, что спектр проблем необычайно широк. В таблицу сведены темы, перечисленные 177 консультантами по ВИЧ/СПИДу.

Те, кто оказывают заботу и поддержку людям, живущим с ВИЧ/СПИДом, тоже часто испытывают значительный эмоциональ-

| Темы, чаще всего затрагиваемые во время консультаций | % |
|--|----|
| Беспокойство по поводу взаимоотношений (сексуальных и прочих) с людьми | 15 |
| Как избежать передачи ВИЧ | 13 |
| Смерть и умирание | 12 |
| Развитие болезни и определение собственной стадии | 11 |
| Как владеть собой | 10 |
| Практические, финансовые вопросы, работа | 10 |
| Кому и как рассказать? | 8 |
| Позор, страх изоляции/предвзятости | 7 |
| Здоровый образ жизни | 5 |
| Вопросы конфиденциальности | 5 |
| Принятие решения о прохождении теста на ВИЧ | 4 |

ный дискомфорт и страх общественной изоляции. В результате анкетирования, проведенного среди этих специалистов (470 участников), были получены следующие определения причин подобных переживаний: 35% хотели обеспечить возможно лучший уход и стремились этого достичь; 23% сосредоточились на собственном эмоциональном дискомфорте (чувство утраты, гнева, беспомощности, вины, беспокойства и депрессии); 27% волновал риск передачи ВИЧ и 20% беспокоило осуждение и дискриминация их самих и тех, о ком они заботятся.

8. Психологические аспекты жизни с ВИЧ/СПИДом

8.1. Типы психологических состояний человека при положительном результате теста на ВИЧ

Диагноз ВИЧ-инфекция создает значительные психологические нагрузки. Психологические состояния, в которые попадает ВИЧ-инфицированный, связаны с тем, что часто диагноз становится для человека неожиданностью, и потребуется время, чтобы его принять и адаптироваться к жизни в новой реальности.

ВИЧ-инфекция дает толчок неуверенности во всех аспектах жизни человека, включая качество и продолжительность жизни, эффективность лечения и реакцию со стороны общества. Эти вопросы необходимо обсудить открыто и откровенно.


В ответ на неуверенность ВИЧ-инфицированный должен предпринять какие-то шаги, чтобы адаптироваться к новым условиям. Даже отсутствие какой-либо реакции на сообщение результата может быть попыткой адаптироваться через отрицание (см. ниже).

Приложение III Течение болезни

1. Что происходит, когда человек подвергается контакту с ВИЧ

Известно, что контакт с ВИЧ не всегда приводит к инфицированию. В свою очередь, инфицирование ВИЧ не обязательно в скором времени приведет к развитию СПИДа.

На схеме показано, что происходит в организме человека при контакте с ВИЧ.



Воздействие и инфицирование

Воздействие происходит, когда человек вступает в контакт с т. н. инфекционным материалом. Но контакт с ВИЧ не всегда означает заражение. Последнее зависит от количества вируса, попавшего в организм, особенностей иммунной системы человека и других факторов.

Заражение может произойти, если инфицирован один из сексуальных партнеров. Но люди могут не знать о своем ВИЧ-статусе. В этой

ВИЧ и животные

ВИЧ-инфекция не обнаружена ни у одного из живых существ, кроме человека. В этой связи риск заражения ВИЧ-инфекцией от животного отсутствует.

Укусы насекомых

Проведенные исследования не подтвердили предположений о передаче ВИЧ через укус насекомых — даже в районах с высоким уровнем распространенности СПИДа и большим количеством насекомых (как, например, в Экваториальной Африке)²⁶.

Ученые исследовали механизм комариных укусов и обнаружили, что насекомое не вводит при укусе кровь предыдущей жертвы — оно вводит слюну.

Кроме того, ВИЧ не может размножаться вне клеток человека. Насекомые не являются переносчиками и вируса гепатита В, который содержится в крови в гораздо больших количествах.

²⁶ Руководство «Консультирование до и после теста на ВИЧ-инфекцию», с. 41–42.

Не существует возможности точно предсказать возможную реакцию человека на сообщение положительного диагноза на ВИЧ-инфекцию.

Шок

Это естественная реакция человека на информацию, представляющую угрозу для жизни. Шоковая реакция обычно включает:

- состояние оцепенения, «оглушенного» молчания, выражение недоверия к сказанному;
- чувство смущения, смятения, неуверенности в настоящем и будущем;
- отчаяние («О, Боже, все пропало!»);
- состояние эмоциональной нестабильности (быстрый и непредсказуемый переход от слез к смеху, и наоборот);
- отстраненность, дистанцирование от существующих вопросов и обстоятельств, нежелание участвовать в разговоре, деятельности или составлении планов лечения.

Отрицание

Некоторые люди могут реагировать на сообщение о постановке диагноза категорическим отказом поверить в вероятность такового («Это не может случиться со мной!»). На первоначальном этапе отрицание, ослабляя стресс, способно оказать благотворное влияние на пациента, но в дальнейшем оно только затрудняет процесс его адаптации к новым жизненным условиям. Если не противостоять отрицанию, человек может не осознать той социальной ответственности, которая налагается на него с момента информирования.

Суицидальные мысли и поступки

У человека, узнавшего о своем ВИЧ-статусе, значительно повышается риск суицидального исхода. Самоубийство может трактоваться как возможность избежать физических страданий и прекратить переживания родных и близких. Самоубийство может быть активным (намеренное членовредительство, влекущее за собой смерть) и пассивным (разрушающее здоровье поведение).

Страх

У человека, живущего с ВИЧ, много страхов. Самые серьезные из них — страх смерти и страх умирания от боли и/или в одиночестве. Среди прочих следует выделить страх оказаться брошенным (отвергнутым) близкими и обществом, страх оставить детей/семью без поддержки, страх потери телесных или умственных способностей, страх потери конфиденциальности. Иногда причина появления страха обоснована опытом других людей. Но во многих случаях она связана с недостаточностью информации о ВИЧ/СПИДе. Страхи можно уменьшить, обсудив их открыто.

Депрессия

Очень часто человек приходит в состояние депрессии в момент осознания, что вирус полностью завладел телом, заболевание неизлечимо, и над ситуацией потерян контроль. Внешним поводом к депрессии могут послужить участвовавшие медицинские осмотры. Кроме того, свой «вклад» в развитие депрессии могут внести утрата способности к воспроизводству, выполнению родительских функций, а также невозможность долгосрочного планирования.

Беспокойство/Тревога

Беспокойство входит в жизнь ВИЧ-инфицированного, как следствие чувства неопределенности в связи с заболеванием. Беспокойство может быть вызвано разными причинами, например: увеличившимся риском заражения другими заболеваниями; ухудшающейся способностью к эффективной деятельности, потерей здоровья и финансовой независимости.

Снижение самооценки

Самооценка начинает страдать сразу же после диагностирования ВИЧ-инфекции. Отстраненность соседей, коллег по работе, знакомых и близких людей может вызвать ощущение потери социальной значимости и уверенности в себе, что, в свою очередь, приводит к снижению самооценки. Усугубить положение могут сопутствующие ВИЧ-инфекции заболевания, вызывающие изменение внешнего облика, а также физическое истощение, потеря физических сил и контроля над собственным телом.

Ипохондрия

К ипохондрии человека может привести чрезмерная озабоченность состоянием своего здоровья, когда сильнейшее беспокойство вызывают даже малейшие физические изменения. Ипохондрия может носить временный характер, проявляясь сразу же за сообщением диагноза, или постоянный, когда приспособляемость к заболеванию затруднена.

Любому человеку, узнавшему о диагнозе ВИЧ/СПИД, требуется психологическая поддержка и помощь в прохождении последующих стадий адаптации к диагнозу через выслушивание, отражение и принятие его чувств, через предоставление информации, усиление уверенности в том, что он сам может управлять своей жизнью.

Человек время от времени испытывает различные чувства

Озлобленность

Некоторые люди впадают в ярость, чувствуя, что им «страшно не повезло», что они заразились. Их поведение становится разрушаю-

при нахождении в одном помещении; через укусы насекомых и животных.

Травмы, полученные при занятиях спортом

Незначительный риск передачи ВИЧ может сопровождать занятия теми видами спорта, которые связаны с прямым контактом между участниками (например, боевые виды спорта), а также с возникновением кровотечения.

В случае травмы во время занятий спортом необходимо:

- прервать занятия;
- немедленно обработать участок кожи антисептиком (веществом, которое препятствует размножению бактерий, вирусов, грибков и простейших) и затем тщательно перевязать;
- кровь, оставшуюся на полу или в других местах, обработать хлоркой (уборку следует производить в латексных перчатках).

Домашний уход

Люди, контактировавшие с ВИЧ-инфицированными в домашних условиях, но не занимавшиеся с ними сексом и не использовавшие совместный инъекционный инструментарий, не могут быть инфицированы ВИЧ. Передача ВИЧ в таких условиях признана невозможной²⁵.

Контакт с мочой, фекалиями, гноем

Моча, гной и фекалии могут содержать кровь, а также представляют собой потенциальный источник других заболеваний, поэтому, если контакт произошел, следует промыть кожу мылом и теплой водой (если вода недоступна, протереть салфеткой с антисептическим раствором).

Укусы человеком

Очень маловероятно, чтобы человек был инфицирован в результате укуса. Государственным департаментом здравоохранения Флориды (США) описан единственный случай, когда взрослая ВИЧ-позитивная женщина с кровотечением из десен укусила взрослого мужчину, обширно повредив его кожные покровы и тем самым вызвав у него кровотечение. Впоследствии при тестировании было выявлено генетическое родство вируса женщины и ВИЧ, обнаруженного у мужчины.

Эта информация может вызвать тревогу в связи с возможностью укусов, например, среди детей в детских садах. В этой связи считаем необходимым напомнить, что природа укуса в описанном инциденте очень специфична и не похожа на природу укусов, которые случаются среди детей: последние редко вызывают кровотечения и повреждения кожи.

²⁵ Российский научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИД. — Цит. по: Руководство «Консультирование до и после теста на ВИЧ-инфекцию», с. 33, 39.

2.3.2. Заражение во время родов (наиболее вероятно)

При прохождении младенца по родовому каналу (шейка матки, влагалище) его кожа соприкасается с кровью и влагалищными выделениями матери, которые содержат ВИЧ. Через слизистые, а также возможные ранки и ссадины на коже ребенка вирус может попасть в его организм.

При прохождении по родовым путям младенец может заглатывать материнскую кровь и влагалищные выделения. В этом случае есть вероятность попадания вируса в организм через слизистые полости рта, пищевода и желудка, которые к этому времени еще не сформировались до конца и не могут служить барьером для инфекции.

2.3.3. Заражение во время грудного вскармливания (высокий риск, особенно при вскармливании более года)

ВИЧ проникает в молоко. Концентрация вируса в молоке ниже его концентрации в крови. На риск заражения влияют такие факторы, как длительность кормления грудью, а также наличие отягощающих факторов: мастит, абсцесс молочной железы. В среднем на долю грудного вскармливания приходится до 20% всех случаев перинатального инфицирования.

2.4. Бытовые контакты и вероятность передачи ВИЧ

Внешняя среда

Французские ученые под руководством Л. Монтанье выяснили, что ВИЧ не может жить вне жидкостей организма человека. Гиперконцентрации ВИЧ могут сохранять жизнеспособность в строго контролируемых и ограниченных лабораторных условиях, однако исследования, проведенные центрами по контролю заболеваемости (США) начиная с 1984 года, показали, что высыхание даже очень высоких концентраций вируса сокращает число контагиозных вирусов на 90–99% в течение нескольких часов²⁴. Концентрации вируса, используемые в лабораторных условиях, гораздо выше обнаруживаемых в реальных условиях в крови или других жидкостях. Следовательно, высыхание ВИЧ-инфицированной крови или других жидкостей организма сводит даже теоретический риск к нулю.

Так же важно отметить, что ВИЧ не размножается вне организма человека, а точнее — вне живой клетки.

Бытовой контакт

Доказано, что ВИЧ **не передается**: при рукопожатиях, объятиях, социальных поцелуях, кашле и чихании; при пользовании общей посудой/столовыми приборами, полотенцами и постельным бельем; при совместном пользовании туалетами, душем, бассейном;

²⁴ Руководство «Консультирование до и после теста на ВИЧ-инфекцию», с. 39.

щим, и они способны нанести вред и себе, и окружающим. У них может появиться склонность к частому самоубийству (как я мог заразиться ВИЧ и т.д.), не исключены суицидальные настроения.

Потеря

Люди с ВИЧ/СПИДом испытывают чувство потери собственных притязаний, физической привлекательности, возможности сексуальных отношений, общественного положения, финансовой стабильности и независимости. По мере того как усугубляется потребность в физическом уходе, усугубляется ощущение потери уединенности и контроля над собственной жизнью. Крайне опасной является потеря уверенности в себе, так как в связи с этим может снизиться способность справиться с ВИЧ/СПИДом.

Горе

Люди с ВИЧ/СПИДом часто испытывают состояние глубокого горя и потери. Их страдания могут усиливаться из-за переживаний близких и друзей, являющихся свидетелями ухудшения здоровья ЛЖВС.

Вина

В момент, когда человеку сообщают о диагнозе ВИЧ, он обычно испытывает чувство вины перед теми, кого по неведению мог инфицировать, или за свое поведение, результатом которого явилась ВИЧ-инфекция (опыт небезопасного секса или инъекционное употребление наркотиков). Во многом состояние человека еще более усугубляется отношением общества к проблеме ВИЧ/СПИДа. Он испытывает чувство вины за печаль, беспокойство или потери, которые его болезнь причиняет любимым людям, семье и особенно детям.

Стремление к изоляции

Реакцией ВИЧ-инфицированного может быть полный отказ от социальных контактов. Одна из важных причин подобной реакции — страх быть покинутым и реакция на него: «Все равно все отвернутся от меня, так лучше я сделаю это первым». На начальном этапе консультирующий должен проявить уважение к потребности клиента в изоляции. Но если это состояние затягивается, консультанту следует выяснить причины и побудить человека изменить отношение.

Душевное смятение

Бывает, что страх смерти или другие реакции на известие о неизлечимом заболевании вызывают или повышают заинтересованность в решении духовных вопросов. Осознание греха и вины, состояние прощения, примирения и приятия могут стать результатом поиска религиозной поддержки.

Факторы, влияющие на степень проявления негативных эмоций и психическое состояние клиента

- Состояние здоровья клиента на момент сообщения ему диагноза ВИЧ.
- Готовность клиента к восприятию диагноза ВИЧ.
- Уверенность/неуверенность в поддержке со стороны общества, в помощи друзей или членов семьи.
- Прежние ценности. Особенности психики клиента.
- Отношение к вопросам ВИЧ/СПИДа, болезни, смерти, обусловленное культурной традицией и духовными воззрениями клиента.

8.2. Этапы адаптации к диагнозу

Сообщение о неизлечимой болезни может по-разному сказаться на жизни человека и близких ему людей. Кто-то догадывался о болезни, для других она оказалась полной неожиданностью. Но так или иначе, получение этой информации в большинстве случаев расценивается как чрезвычайное событие.

Психологический кризис — неотъемлемая часть процесса принятия болезни, потому что болезнь затрагивает и изменяет всю жизнь человека. Болезнь включает несколько компонентов: *сенсорный* — восприятие боли или других нарушений; *эмоциональный* — переживание по поводу случившегося с широким спектром эмоций, от страха до надежды; *волевой* — необходимость справиться с болезнью; *рациональный* — знание о болезни.

Отношение человека к болезни может быть *адекватным* — соответствующим состоянию, *пренебрежительным* — серьезность заболевания недооценивается, *отрицающим* — связанные с заболеванием мысли и факты отвергаются, *фобическим* — серьезность состояния преувеличивается; *позитивным* — заболевание связывается преимущественно с положительными переживаниями (например, болезнь как новый опыт, как возможность иначе взглянуть на себя и мир, получить новые материальные или иные выгоды).

Знания о психологии болеющего человека необходимы консультанту, работающему с неизлечимо больными и затронутыми проблемами ВИЧ-инфекции людьми.

Психиатр и танатолог Элизабет Кюблер-Росс, изучая процесс адаптации пациентов к диагнозу рака, выделила пять условных стадий на пути к адаптации¹³:

- шок и отрицание (отказ верить),
- гнев (раздражение, обращенное вовне),

онных агентов, находящихся в материнской крови, в том числе и от ВИЧ. Однако если плацента воспалена или повреждена, она уже не так эффективно защищает плод.

Пример организации обсуждения темы «Инфицирование ВИЧ»:

Клиент: В каких ситуациях человек может заразиться ВИЧ?

Консультант: Человек может заразиться ВИЧ, когда происходит контакт с кровью, спермой или вагинальным секретом ВИЧ-позитивного партнера. Это возможно при незащищенном сексуальном контакте с ВИЧ-позитивным партнером, при совместном использовании игл или шприцев. Инфицированная мать может передать вирус ребенку во время беременности, родов или при кормлении грудью. Вас беспокоит что-либо из перечисленного или вы хотели обсудить другие ситуации?.. Я могу рассказать вам о некоторых методах профилактики. Хотите, чтобы я объяснил подробнее?

Другие варианты ответов:

Консультант: Я постараюсь помочь. Не стесняйтесь останавливать меня и задавать интересующие вас вопросы. Заразиться ВИЧ гораздо сложнее, чем «подхватить» вирус простуды или гриппа. В отличие от них ВИЧ не летает по воздуху, не передается воздушно-капельным путем. Им нельзя заразиться, если находишься в одной комнате с инфицированным человеком, касаешься его или если пользуешься после него ванной, туалетом и т.д. Человек может заразиться только в результате действий, при которых происходит контакт с определенными жидкостями организма. Вы знаете о том, что это за жидкости?

Клиент: Да, я читал, что заразиться можно через кровь, сперму или вагинальный секрет, а также грудное молоко.

Консультант: Да, вы правы. Именно поэтому инфицирование в основном происходит через сексуальные контакты с ВИЧ-инфицированным человеком или совместное использование игл и шприцев при инъекционном употреблении наркотиков. У вас есть вопросы относительно этих аспектов ВИЧ-инфекции?

Клиент: Как человек заражается СПИДом?

Консультант: Человек может заразиться ВИЧ-инфекцией, но не СПИДом. ВИЧ — вирус иммунодефицита человека — может передаваться при контакте с кровью, спермой или вагинальным секретом инфицированного человека. Вот почему секс с инфицированным человеком и совместное использование игл для инъекций являются основными путями заражения.

После этого, возможно, будет полезным объяснить разницу между ВИЧ-инфекцией и СПИДом.

¹³ Кюблер-Росс Э. О смерти и умирании. — София, 2000.

Слюна

Согласно мнению большинства исследователей, передача вируса даже при затяжном, глубоком поцелуе маловероятна. Незначительный риск присутствует только в том случае, если в слюне окажется значительное количество инфицированной крови.

В 1995 году было сделано сообщение об обнаружении в слюне протеина, который в пробирке препятствовал проникновению ВИЧ в белые кровяные клетки. Это открытие объясняет, почему не происходит передачи ВИЧ через поцелуй и почему столь редки случаи передачи вируса при оральном сексе²².

Влияние других заболеваний, передающихся сексуальным путем, на инфицирование ВИЧ

Статистические данные показывают, что наличие какой-либо инфекции, передающейся половым путем (ИППП), с очагами или без, увеличивает риск инфицирования ВИЧ в три–пять раз²³.

Целостность слизистой оболочки и кожи гениталий является важным фактором защиты от инфекции. ИППП, сопровождающиеся появлением язв на половых органах (например, сифилис, генитальный герпес и шанкроид), могут способствовать передаче вируса. При ИППП, не вызывающих язв и повреждений (например, гонорея, хламидиоз и трихомониаз), имеются очаги воспаления в уретре, влагалище, прямой кишке. Нормальная физиологическая реакция подразумевает миграцию макрофагов и Т-лимфоцитов в очаг воспаления. Таким образом, возросшее количество инфицированных Т-лимфоцитов и макрофагов в генитальном тракте у ВИЧ-позитивного человека могут увеличить риск передачи ВИЧ.

Нет данных о сохранении риска ВИЧ-инфицирования в случае, если человек проходил лечение и излечился от ИППП. Все теории о влиянии других ИППП на увеличение подверженности человека инфицированию ВИЧ имеют в виду текущую инфекцию.

2.3. Передача ВИЧ-инфекции от матери ребенку

ВИЧ может перейти от женщины к ее ребенку во время беременности, родов или при кормлении грудью. Если не использовать методы профилактики, то вероятность передачи ВИЧ может составлять от 25 до 50%. При соблюдении всех компонентов профилактической программы риск передачи вируса может быть снижен до двух и менее процентов.

2.3.1. Заражение во время беременности (менее вероятно)

Вирус может проникнуть в кровоток плода через плаценту. Плацента, кроме всего прочего, защищает плод от различных инфекци-

- торг, сделка,
- депрессия (раздражение, обращенное вовнутрь), печаль,
- принятие.

Человек, узнавший о своем неизлечимом заболевании, может отвергать неизбежность тяжелой болезни и фатального конца. Это — естественная психологическая защита. Человек ошеломлен, потрясен. Он отказывается верить: «Этого не может быть! Это неправда! Этому не могло случиться со мной! Это ошибка!» Отрицание является наиболее мощной защитной реакцией из всех последующих. Однако при длительном существовании отрицание вызывает невроз.

Есть и эмоциональная сторона ситуации узнавания положительного диагноза — часто это вызывает страх. Но это связано не с ВИЧ конкретно, а с тем, что он, как и любая другая болезнь, связан с темой смерти, а вот об этом-то знания, концепции, или предположения, зачастую у человека нет.

Если врач, социальный работник или психолог работают с отрицающим факт болезни клиентом, то более всего следует использовать активное слушание. Не стоит активно вмешиваться: возможности ускорить принятие диагноза — невелики. Вместо сосредоточения на последующих шагах следует предложить клиенту исследование имеющихся у него планов, надежд, страхов и опасений, которые могут мешать принять реальность. Так же клиенту, находящемуся на этой стадии, необходимо рассказать о том, где он может получить дополнительную информацию, и дать печатные материалы, в которых будут ясно и, желательно, кратко описаны последствия заболевания и основные рекомендации по сохранению здоровья (см. главу 7).

Гнев

Когда человек понимает, что он теряет в связи с заболеванием, происходит переход на стадию гнева. Гнев здесь — простая агрессия по отношению к врагу. Если ранее человек пытался «врага» не заметить, отказать ему в существовании, то когда выясняется, что «враг» настолько силен, что существует, начинается попытка его уничтожить.

Человек, понимающий, что болезнь может кардинально изменить его жизнь, привычки, увлечения, отдалить от него друзей и привычного окружения, раньше или позже начинает переживать гнев. Это негодование на несправедливость судьбы может переходить в явную агрессию в адрес окружающих. Гнев и враждебность являются нормальным этапом переживания болезни. Человека мучительно занимает вопрос: «Почему я?». И не найдя ответа, он переходит к раздражению, гневу, ярости или зависти. В случае ВИЧ-инфекции обвинения и сильный гнев часто бывают обращены на виновника заражения. Это следующая попытка человека защититься от угрожающей ему реальности.

²² Руководство «Консультирование до и после теста на ВИЧ-инфекцию». — М.: СПИД инфосвязь, 2000, с. 32.

²³ Там же.

В случае встречи с этими реакциями консультант должен принять их, воздерживаясь от искушения осудить или наказать собеседника собственным возмущением.

Торг. Сделка

Когда эмоциональные ресурсы истощаются, человек может попытаться прибегнуть к сделкам. Болезнь прогрессирует, а силы, истраченные на отрицание и гнев, не восстанавливаются так быстро, как хотелось бы. Человек начинает выпрашивать, выторговывать поблажки у окружающих, которые, по его мнению, могут хоть чем-то помочь, часто делая ставкой в сделке собственную жизнь: «Если меня вылечат, я никогда не буду обманывать», «Если я брошу курить, вы мне поможете остаться в живых?». Эти попытки сделок длятся некоторое время и являются вполне естественными реакциями, помогая человеку смириться с реальностью болезни или оканчивающейся жизни. Человек может стать общительным или доверительным, ожидая за хорошее поведение вознаграждения — избавления от болезни или продления жизни. Отсутствие успеха в прошлых сделках приводит к тому, что ставки в новых сделках становятся все меньше и они касаются все более ограниченных целей.

Сделка, по сути, продолжение попытки уничтожить врага, но не силой, а обманом. Когда и это не удается, человек возвращается к себе и начинает обдумывать свое новое состояние и свои возможности в этом состоянии...

Беседуя с человеком, консультанту следует помнить, что предлагаемую «сделку» необходимо принять. Этот подход, хотя и может показаться игрой, для тяжелобольного человека будет долгожданным утешением. Нет смысла обсуждать темы, находящиеся за пределами его сознания, — это вызовет лишь непонимание и усталость.

Депрессия (горе, печаль)

Когда сделки не приносят желаемого изменения к лучшему, а сил становится все меньше, неизбежно возникает депрессия. Окружающее кажется мрачным, человек чувствует себя незащищенным, он постепенно теряет интерес к жизни, становится малообщительным. Если главным переживанием является потеря здоровья, то депрессия проявится в виде сильного чувства обиды, вины, в меланхолическом настроении. Если главным переживанием является скорбь по поводу утраты семьи, друзей, жизни и будущего, то это может свидетельствовать о приближении этапа принятия. Беседовать с человеком в депрессии очень трудно.

Человека в состоянии депрессии не следует чрезмерно ободрять — это выглядит неуместным на фоне реальности печальных обстоятельств. Важно, чтобы консультант находился рядом, поскольку ничто так не травмирует человека в депрессии, как утрата значимых отношений. Даже молчаливое присутствие вызывает благотворные перемены, создавая ситуацию душевного комфорта и эмоциональной теплоты. Консультан-

Обсуждение этих факторов риска может оказать помощь в поиске более реалистичного и, следовательно, более эффективного подхода к снижению риска инфицирования. Важно учитывать, что информация, полученная от консультанта, является лишь одним из многих факторов, которые в конечном счете определяют выбор человека в отношении своего сексуального поведения.

Пример организации обсуждения темы «Оральный секс»:

Клиент: Вы могли бы рассказать, какой риск представляет собой оральный секс?

Консультант: Вас интересует вопрос предоставления или получения оральных ласк?

Клиент: Предоставление мужчине.

Консультант: Это может быть рискованно. Вы опасаетесь, что уже подвергались риску?

Клиент: Да. Мой партнер ВИЧ-позитивный, и мы занимались оральным сексом.

Консультант: Степень риска зависит от того, был ли контакт со спермой. Если использовался презерватив, риск практически отсутствует.

Клиент: Нет, мы не использовали презерватив.

Консультант: Если контакт был прерван до эякуляции, то риск инфицирования значительно снижается.

Клиент: В данном случае контакт был с проглатыванием спермы.

Консультант: Да, в этом случае риск заражения существует... Я хотел(а) бы обратить ваше внимание на следующее обстоятельство: если в паре один партнер инфицирован, это не означает, что после орального секса другой партнер обязательно окажется инфицированным. Одно то, что человек был в контакте с вирусом, еще не означает, что он заразился. Понимаете? Это не всегда происходит автоматически.

Клиент: А есть зарегистрированные случаи заражения при оральном сексе?

Консультант: Да, есть зарегистрированные случаи инфицирования при оральном сексе. Конечно, оральный секс подвергает риску. Современные данные позволяют сказать, что он менее значителен, чем при незащищенном анальном или вагинальном сексе. Если вы действительно обеспокоены вероятностью инфицирования, лучший способ узнать результат наверняка — пройти тестирование.

Клиент: Да, я знаю.

Консультант: (Предоставьте основную информацию о тестировании и расскажите о том, где можно пройти тестирование на ВИЧ.) Мы можем также поговорить о способах снижения риска инфицирования. (Предоставьте информацию о профилактике.)

Неповрежденная кожа является надежной преградой на пути ВИЧ и других вирусов и бактерий.

Реципиент семенной жидкости подвергается большему риску заражения, чем инсертивный партнер. Это справедливо для любых ИППП. Однако сказанное не означает, что инсертивный партнер вообще не рискует.

Следует понимать, что перечисленные факторы не определяют заражения, а повышают риск передачи вируса. Вероятность заражения ВИЧ-инфекцией возрастает при сочетании различных факторов.

Передача ВИЧ при оральном сексе

В литературе по СПИДу серьезно обсуждается вопрос эффективности профилактических мероприятий, основанных на предположении, что риск, вне зависимости от ситуации, всегда несет в себе серьезную опасность. Практика показывает, что данный подход может привести к неожиданным результатам: столкнувшись с перспективой всю жизнь заниматься только безопасным сексом, люди оказываются настолько ею подавлены (ввиду отсутствия привычки, навыков, доступных презервативов), что способны полностью отказываться от каких-либо изменений в своем сексуальном поведении, в том числе и рискованном. В особой мере это распространяется на молодых людей. Специалисты пришли к заключению, что имеет смысл говорить о различной степени риска, присущей разным сексуальным практикам. В частности, о том, что риск инфицирования при оральном сексе меньше, нежели риск при анальном и вагинальном контакте.

Зарегистрированы единичные случаи передачи ВИЧ при орально-генитальном контакте.

Незащищенный оральный секс представляет некоторую угрозу передачи ВИЧ, так как он предполагает контакт со спермой, вагинальным секретом и/или кровью. Риск при получении оральных ласк сравним с риском при «влажном» поцелуе, так как элементы передачи вируса те же (например, необходимо присутствие значительного количества крови в слюне). Риск инфицирования при предоставлении оральных ласк выше вследствие вероятности контакта с семенной или вагинальной жидкостью и, возможно, — с кровью.

Считается, что оральная стимуляция ануса не представляет высокой угрозы инфицирования ВИЧ для рецептивного партнера, по причине отсутствия риска передачи вируса через слюну. Однако, так как во рту может присутствовать кровь, риск нельзя исключать полностью. Активный партнер также подвергается некоторому риску, так как есть вероятность присутствия крови или следов крови в кожных складках ануса. Важно помнить, что оральная стимуляция ануса может представлять угрозу передачи герпеса или паразитов, что может вызвать различные заболевания, повышающие риск ВИЧ-инфицирования.

ту следует выразить свои мысли простыми, понятными и краткими предложениями. Он должен быть заботливым и понимающим.

У кого-то могут появляться **мысли о самоубийстве**. Чаще всего это происходит:

- а) у людей, испытывающих интенсивную потребность в контроле;
- б) при внезапном сообщении о неизлечимом заболевании («Вряд ли что-то можно сделать, вы обратились слишком поздно»);
- в) если обещанные перспективы выздоровления оказываются недоступны (например, человек узнает, что лекарство существует, но он не может его приобрести);
- г) в состоянии **одиночества**.

Принятие

На данном этапе человек как бы смиряется с неизбежностью происходящего с ним: «Я прожил полную и завершённую жизнь. Я могу умереть». В этом принятии, как писал А. Маслоу¹⁴, проявляется самоактуализация человека. Принимая неизбежное, многие напоминают людей, обреченных на выполнение приговора. Но иные как будто неожиданно обретают мир и спокойствие.

У людей, приближающихся к смерти в результате заболевания, могут наблюдаться несколько видов реагирования на ситуацию¹⁵:

- Человек начинает «цепляться за жизнь», использует любые средства для того, чтобы остаться в живых. Болезнь (или борьба с болезнью) становится главным смыслом жизни. Это лишает человека всех радостей, кроме одной, желанной — победы над болезнью. Такая реакция свойственна довольно небольшому количеству людей.
- Принятие ситуации смерти как вероятной. Как правило, люди, принимающие ситуацию возможной смерти, начинают жить в полную силу. Стараются максимально обогатить себя духовно, не дать болезни взять над собой верх. Болезнь становится чем-то второстепенным, но постоянным, неким «фоном» жизни, но не руководящей силой.
- Принятие ситуации как неизбежной. Такая реакция влечет за собой апатию, уход в болезнь, тяжелые переживания по поводу любых ее проявлений. Болезнь определяет жизненный выбор, становится стержнем поведения.

Страх смерти лишает человека душевного покоя и внутреннего равновесия. Как правило, страх выражается в мыслях о том, что будет дальше, и тревоги по поводу собственной неготовности к возможным событиям.

¹⁴ Исаев И.Д., Шерстков К.В. Психология суицидального поведения. — Самара, 2000, http://nadesika.narod.ru/psy_suicid1.htm.

¹⁵ Исаев И.Д., Шерстков К.В. Там же.

С другой стороны, любовь к жизни наполняет жизнь человека творчеством, любовью, радостью, светом, приносит душевный мир, делает человека открытым любым событиям.

Человеку нужна помощь в том, чтобы обрести спокойствие и продолжать радоваться жизни.

Чувства гнева, печали и отрицания могут возвращаться. Но со временем они становятся все менее острыми. Если человек не может преодолеть одну из стадий переживания горя, ему скорее всего необходима дополнительная помощь психолога или психиатра.

Не каждый человек обязательно проходит через все перечисленные стадии переживания и необязательно они происходят в указанном порядке. Может быть «выпадение» какой-либо из них или «хождение по кругу» (когда негативное событие провоцирует депрессию или гнев). Если подобное происходит, значит, адаптация к диагнозу была ложной, временной, не стойкой и разрушилась при появлении личностно-значимых проблем.

Принятие диагноза ВИЧ-позитивными клиентами/пациентами

О принятии диагноза в полной мере свидетельствует способность человека спокойно говорить о своем статусе, изменение его поведения, ориентация на поддержку и сохранение здоровья, социальная активность, часто связанная с болезнью: профилактика ВИЧ-инфекции, защита прав людей, живущих с ВИЧ/СПИДом.

Кюблер-Росс писала о ситуациях быстрого прогрессирования болезни¹⁶. ВИЧ, как известно, прогрессирует значительно медленнее других болезней. «Сделка» в ситуации с ВИЧ начинается тогда, когда человек устает быть агрессивным. При этом вовсе не обязательно, что состояние его здоровья ухудшается. Могут быть психосоматические проявления, но они проходят быстро, сразу после простейшей психотерапии или приема релаксантов с ноотропами. Отчасти усталость от агрессии приходит потому, что человек не находит подтверждения своим опасениям: он не чувствует бессилия и сильной боли, не замечает изменений в своей внешности. После того как человек соглашается с тем, что он инфицирован, он начинает ждать. И очень часто, не дождавшись каких-либо признаков ухудшения состояния, начинает переоценивать свое состояние и перспективы. То есть в случае с ВИЧ, в отличие от рака (когда есть явное подтверждение в виде вполне физической опухоли), после агрессии идет «не торг и сделка», а переоценка своего состояния. Эта переоценка может происходить быстро, а может затянуться. Выглядит это как подобие ступора, когда человек пристально «вслушивается» в свои ощущения.

Следующая за этой переоценкой попытка «сделки» выглядит примерно так же, как описано Кюблер-Росс, только в ней нет того напряжения, которое присутствует у умирающего человека.

¹⁶ Исаев И.Д., Шерстков К.В. Там же.

- оральная стимуляция ануса (римминг);
- любой вид сексуальной активности, допускающий контакт крови, спермы и вагинального секрета обоих участников.

Низкий риск/Менее опасные сексуальные практики

Риск может повышаться или понижаться в зависимости от действий партнеров (правильно ли использовался презерватив, использовался ли презерватив при каждом виде сексуальной активности, использовался ли презерватив от начала до конца проникновения). *Риск возрастает при увеличении числа партнеров и применяемых сексуальных практик.*

Ниже перечислены сексуальные практики в порядке снижения степени риска инфицирования ВИЧ:

- анальный секс с презервативом;
- вагинальный секс с презервативом;
- оральная стимуляция ануса с презервативом;
- прерванный оральная стимуляция ануса (без семяизвержения в рот);
- куннилингус через латексную салфетку (салфетка может быть сделана из презерватива, разрезанного вдоль);
- поцелуи «французские», «влажные» или «глубокие»;
- взаимная мастурбация.

Отсутствие риска/Безопасные виды сексуальной активности:

- поцелуи и ласки тела языком (при отсутствии орального контакта с инфекционно опасными жидкостями организма или открытыми повреждениями кожи);
- трение тела о тело (фроттаж);
- объятия/массаж тела;
- самостоятельная мастурбация;
- индивидуальное использование сексуальных игрушек;
- «сухой» поцелуй;
- фантазии, разговоры с прикосновениями друг к другу;
- другие виды сексуальной активности, при которых не происходит контактов с инфекционно опасными жидкостями: кровью, спермой и вагинальным секретом.

Дополнительные факторы, влияющие на передачу ВИЧ

Повторяющееся воздействие (контакт с жидкостями, содержащими ВИЧ) может стать дополнительным фактором, увеличивающим риск заражения.

Наличие у человека других ИППП, в особенности с язвенными проявлениями, значительно увеличивает риск заражения ВИЧ (т.к. заболевание ИППП сопровождается повреждением кожных покровов и слизистой, а также снижением иммунитета).

Потенциал: Происходил ли контакт с жидкостями организма, потенциально опасными для инфицирования ВИЧ: кровью, спермой/вагинальным секретом?

Путь: Какова вероятность, что вирус мог попасть в кровоток? (Есть ли основания предполагать, что определенные обстоятельства увеличивают вероятность попадания инфекционно опасных жидкостей в кровоток: наличие ран, изъязвлений на коже и слизистой?)

При оценке риска заражения ВИЧ, связанного с сексуальной активностью, необходимо обсудить следующие вопросы:

- Использовался ли презерватив из латекса?
- Использовался ли презерватив из латекса при каждом проникающем сексуальном контакте?
- Использовался ли презерватив от начала до конца проникающего контакта?
- Не произошло ли разрыва презерватива во время сексуального контакта?
- Если презерватив не использовался, был ли акт прерван до эякуляции (семяизвержения)?
- Был ли контакт со спермой/вагинальным секретом/менструальными выделениями?

Степень риска

Степень риска неодинакова для различных видов сексуальной активности и неодинакова в отношении каждого из партнеров.

Анальный половой контакт без использования презерватива и специальной смазки на водной основе особенно опасен в силу высокой травматичности: повреждение слизистых открывает путь для проникновения ВИЧ непосредственно в кровоток. При анальном контакте активный партнер подвергается меньшему риску, но следует помнить, что ВИЧ может попасть в кровоток через микроскопические повреждения кожи и/или слизистой на половом члене.

Вагинальный половой контакт без использования презерватива — следующий по степени риска инфицирования ВИЧ. При наличии повреждений слизистой половых органов вероятность передачи вируса возрастает. При вагинальном контакте женщина более уязвима к ВИЧ, чем мужчина.

Высокий риск/Опасные сексуальные практики:

- анальное проникновение без презерватива;
- вагинальное проникновение без презерватива;
- прерванное анальное или вагинальное проникновение без презерватива (прекращение до наступления семяизвержения);
- оральные секс с семяизвержением в рот;
- орально-вагинальный контакт (куннилингус);

То, что происходит в ситуации с ВИЧ, сродни скорее процессам, связанным с принятием старения, но они ускорены. У ВИЧ-инфекции нет явных признаков, которые позволяют человеку сразу ощутить разрушение организма. Это бывает только на финальной стадии, которая наступает через 5—15 лет после заражения. Когда появляются физически ощутимые последствия заражения, ВИЧ-позитивный человек может снова встать перед необходимостью принять себя, уже «реально» больного.

В ситуации, когда после заражения прошло 1—2 года и человек почти ничего не знает о ВИЧ, можно наблюдать т.н. двойной цикл процесса принятия диагноза.

Первый цикл:

- **Гнев.**
- **Сомнение и переоценка, похожие на депрессию, но ею не являющиеся (чтобы сократить этот период и снизить «накал» будущего торга, именно здесь нужно просто и ясно рассказать человеку, в какой ситуации он оказался).**
- **Торг (очень длительный период, часто не очень выраженный).**
- **Принятие текущего состояния (часто происходит с рецидивами торга).**

Второй цикл (по описанию Кюблер–Росс):

- **Гнев (когда появляются первые физически различимые признаки иммунодефицита).**
- **Торг.**
- **Депрессия.**
- **Принятие.**

9. Закономерности изменения поведения.

Процесс принятия решения и модели изменения поведения

Почему мы говорим об изменении поведения?


Поступки человека в повседневной жизни, как правило, определяются привычной для него схемой поведения. Находясь в необычной для себя ситуации или перед необходимостью выбора, он может сделать совершенно неожиданный шаг либо последовать одной из опробованных ранее стратегий. Люди, обладающие широким и разнообразным набором коммуникативных стратегий, легче адаптируются в нестандартных ситуациях, чаще принимают взвешенные и ответственные решения. Если же у человека в арсенале только одна или две стратегии, это значительно снижает его свободу выбора и повышает вероятность принятия неудачных решений.

Изменение поведения

Основным методом профилактики ВИЧ является изменение поведения с опасного на менее опасное, или безопасное (см. главу о профилактике ВИЧ). Консультирование до и после теста на ВИЧ является неотъемлемой частью этой работы. Консультирование важно в

первую очередь для актуализации вопроса для клиента, эффективной передачи ему информации по теме и поддержки процесса принятия клиентом решений о его собственных будущих действиях. Остальные этапы изменения поведения — обучение личностным и социальным навыкам, различная терапия, поддержка измененного поведения — «отрабатываются» другими технологиями, неразрывно связанными с консультированием, но отделенными от него территориально и по времени. Важно заметить, что отсутствие консультирования существенно осложняет или делает невозможным реализацию следующих за ним этапов работы по изменению поведения.

Модель изменения поведения¹⁷



Данная схема иллюстрирует, какого рода взаимосвязь существует между информацией, мотивацией, поведенческими навыками и поведением. Каждый человек обладает определенным набором поведенческих навыков. Эти навыки в повседневной жизни образуют картину типичного для него поведения. Модель поведения зависит не только от того, как человек себя ведет, но и от того, какие цели он преследует своим поведением. Иными словами, всякое поведение определяет мотивация. Мотивация — это толчок, побуждение к действию, направление его активности. Мотивация расценивается психологами как причина поведения. Успешность и эффективность реализации мотивов определяет характер эмоций, которые будет испытывать человек. Мотивация к той или иной деятельности зависит от информации, которой владеет человек. Информация в данном случае — это знания, личный опыт и дополнительные сведения о предметах или явлениях, получаемые человеком в течение жизни. Информация, которой владеет человек, может стимулировать его на приобретение новых навыков или отказ от используемых ранее. Наличие новой информации оказывает влияние и на поведение человека. Все связи на этой схеме взаимонаправлены. Это означает, что изменение в каком-либо одном блоке приводит к изменениям во всех остальных.

На поведение человека значительное влияние оказывает степень его уверенности в себе, осознание себя победителем либо неудачником. Процесс принятия решений и их реализация в той или иной сте-

Больные гемофилией регулярно нуждаются в переливании крови и ее препаратов. В настоящее время, в связи с внедрением программ скрининга донорской крови, вероятность передачи ВИЧ оценивается как минимальная.

Инвазивные процедуры в медицинских учреждениях

Риск передачи ВИЧ в учреждениях здравоохранения относительно низок, но он существует — как для пациентов, так и для медицинских работников.

Инфекция может передаваться от пациента к пациенту при повторном использовании медперсоналом игл, шприцев и другого инструментария, не прошедшего дезинфекцию и стерилизацию. Сейчас в медицинских учреждениях используется одноразовый и стерилизованный инструментарий, что позволяет минимизировать риск передачи ВИЧ-инфекции при процедурах, связанных с нарушением кожных покровов и слизистых оболочек.

Риск инфицирования при оказании медицинской помощи

Заражение медицинских работников может произойти при контакте кожи и слизистых с инфицированными биологическими жидкостями (кровью, сывороткой, спермой и т.д.) и при травмах во время проведения инвазивных манипуляций.

Риску инфицирования подвергаются сотрудники гематологических, реанимационных, стоматологических, гинекологических, хирургических, гемодиализных отделений, лабораторий, процедурных кабинетов. Риск заражения в результате повреждений кожи составляет 0,3% и повышается при глубоких порезах большой площади и продолжительном контакте с биологическими жидкостями, инфицированными ВИЧ.

2.1.3. Вероятность передачи ВИЧ через иглы для акупунктуры, татуировок и пирсинга

Эти процедуры безопасны при соблюдении всех правил асептики и антисептики, поэтому данные манипуляции следует производить исключительно в тех учреждениях, где используются одноразовые инструменты.

2.2. Передача ВИЧ при сексуальном контакте

Оценка риска передачи ВИЧ при сексуальном контакте

При оценке риска важно определить, какие именно действия могут привести к инфицированию. Одной из наиболее эффективных методик является методика последовательного исследования ситуации «от вопроса к вопросу», так называемая методика «трех П»:

Партнер: Насколько достоверна информация, что ваш сексуальный партнер инфицирован ВИЧ?

¹⁷ Fisher J.D., Fisher W.A. Changing AIDS risk behavior. Psychological Bulletin, 111 (1992): 455–474.

Риск заражения повышается, если инъекционное употребление наркотиков происходит в группе (особенно среди плохо или совсем не знакомых людей).

Совместное использование игл и шприцев несет в себе серьезную опасность заражения ВИЧ, ИППП, гепатитами В и С. И если в отношении ВИЧ применимы простые средства дезинфекции (хлорсодержащие растворы или кипячение), то, например, уничтожить вирус гепатита С значительно сложнее: даже в кипящей воде он долгое время сохраняет свою жизнеспособность.

Особенности субкультуры потребителей наркотиков в Республике Казахстан

Самыми распространенными наркотиками, употребляемыми инъекционным путем в Республике Казахстан, являются героин и ханка (опиум-сырец).

В последнее время отмечается тенденция к омоложению сообщества ПИН и увеличению в нем доли женщин.

2.1.2. Вероятность передачи ВИЧ при медицинских манипуляциях

Донорство

При сдаче крови не существует опасности инфицирования ВИЧ, так как иглы в центрах сбора донорской крови стерильны и никогда не используются повторно.

Ранее, в начале эпидемии, ряд случаев заболевания СПИДом был вызван переливанием зараженной крови или ее препаратов.

В настоящее время кровь переливается только по исключительным показаниям, когда не представляется возможным применить кровезаменители. В тех случаях, когда переливания крови избежать нельзя, для этой процедуры используется кровь, прошедшая двойную проверку на ВИЧ.

В дополнение к скринингу донорской крови на антитела к ВИЧ центры по сбору донорской крови придерживаются правила, которое запрещает сдавать кровь людям, «вовлеченным в деятельность, связанную с высокой степенью риска».

Таким образом, сегодня вся донорская кровь проходит тестирование на антитела к ВИЧ. Но, к сожалению, бывают чрезвычайные ситуации, связанные со срочностью предоставления крови, когда нет времени на двойную проверку крови на ВИЧ с учетом «периода окна» (см. «Период выработки антител», Приложение III, 3).

Проблема донорской крови особенно актуальна для людей, страдающих гемофилией.

Гемофилия — это заболевание крови, вызванное генетически обусловленным недостатком коагулирующего фактора (фактора свертываемости крови). Это наиболее распространенное из всех врожденных (наследственных) нарушений свертываемости крови, которое встречается с частотой 1:10 000.

пени представляет затруднения для любого человека. Однако решение об изменении поведения может приобретать социально значимые черты, когда это связано с необходимостью отказа от приема наркотиков/алкоголя или выбора более безопасных практик сексуального поведения. Поэтому процесс принятия решений стал предметом исследований психологов во всем мире.

Например: человек, никогда не использующий презерватив, в какой-то момент узнает о возможности заражения ВИЧ половым путем, т.е. получает новую информацию. Он понимает, что у него нет навыка покупки и использования презервативов, не знает, как предложить это своей девушке — т.е. не владеет поведенческими навыками. Знания о возможности инфицирования тяжелым заболеванием активизируют мотивацию на сохранение здоровья. Так, информация и мотивация порождают решение начать использовать презервативы, т.е. изменить проблемное поведение. Реализовать принятое решение мешает отсутствие поведенческих навыков. Если человек приобретает недостающие поведенческие навыки, он, вероятно, поменяет проблемное поведение на более безопасное и приемлемое в данной ситуации.

Эта схема хорошо иллюстрирует три основные цели профилактических программ, направленных на формирование ответственного и безопасного поведения:

- **Достоверное информирование.**
- **Создание мотивации для сохранения здоровья и безопасного с точки зрения возможного инфицирования поведения.**
- **Формирование поведенческих навыков.**

Однако человек — сложное существо и в простые схемы вписывается не всегда. В этой связи в 1993 году Прохаской и ДиКлеме¹⁸ была предложена модель изменения поведения. Эта модель может быть использована для изменения поведения с целью сохранения репродуктивного здоровья, профилактики ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, а также при реабилитации наркозависимых.

1. Преднамерение

На этой стадии человек не подозревает, что у него есть проблема или серьезно не думает об изменении своего поведения.

Скорее всего, он просто не обладает достаточной информацией. Отсутствием информации можно объяснить и активное нежелание ее получения. Около 50% людей отрицают существование проблемы и соответственно не видят причин к изменению своего поведения. Им, безусловно, нужна помощь. Помощь нужна и тем людям, которые признают существование проблемы, но испытывают неуверенность в себе, им трудно смириться с ее присутствием в их жизни, трудно контролировать себя и свое поведение.

¹⁸ Prochaska, James and DiClemente, C.C. 1992. In search of how people change: Applications to addictive. American Psychologist, 47: 1102–1114.



2. Намерение

На этой стадии человек начинает реально осознавать суть и значимость проблемы. Он в значительной мере оказывается подвержен психологическим расстройствам, поскольку убеждается в необходимости изменения поведения.

Он пытается контролировать свою жизнь; зачастую испытывая сомнения в своих возможностях, ищет поддержки у окружающих. Ему необходима дополнительная информация. На этой стадии происходит анализ необходимых затрат и возможных преимуществ в случае изменения поведения.

Стадия «намерение» может быть довольно продолжительной.

3. Решение

На этой стадии человек уже владеет достаточной информацией о своей проблеме и осознает значимость этой информации для себя. Человек ищет выход из сложившейся ситуации. Принимает решение о том, будет ли он изменять свое поведение. Обдумывает возможные варианты действий для изменения поведения и условия, необходимые для этого.

4. Действия

Это стадия, на которой человек изменяет свое поведение и влияющие на него факторы. Решение реализуется на практике. Человек на-

2.1. Парентеральный путь передачи ВИЧ

2.1.1. Вероятность передачи ВИЧ при инъекциях психоактивных веществ

С середины 90-х годов прошлого века и до сегодняшнего дня основным путем распространения ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии является совместное использование потребителями психоактивных веществ инъекционного инструментария: шприцев, игл, емкостей для приготовления наркотиков и т.д. В Казахстане это стало причиной около 87% всех случаев инфицирования ВИЧ. Как показывает опыт, ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) может распространяться чрезвычайно быстро. Одна из самых опасных ситуаций, сопряженных с риском ВИЧ-инфицирования, — совместное использование шприцев и игл без предварительной дезинфекции. Причиной этого в основном является недоступность чистого инструментария и отсутствие у ПИН навыков безопасного (менее опасного) поведения.

По результатам дозорного эпиднадзора, проведенного в Казахстане Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИД совместно с CDC в 2003 году, выяснилось, что наиболее распространены среди ПИН три модели рискованного поведения:

- использование общего оборудования для инъекций;
- забор наркотика из общей посуды;
- употребление без предварительной дезинфекции наркотика, приобретенного в нестерильном, использованном ранее шприце.

Обмен игл и шприцев

Основные причины рискованных практик инъекционного употребления наркотиков:

- отсутствие программ доступа ПИН к стерильному одноразовому инструментарию (в первую очередь шприцам/иглам) и средствам дезинфекции (спиртовые салфетки и хлорный раствор);
- отсутствие у ПИН навыков профилактики инфекций при инъекциях.

Оценка степени риска при инъекционном употреблении наркотиков

Заражение происходит, когда инфицированная кровь через иглу попадает в кровоток. Это становится возможным, если:

- использовать чужой шприц или пускать свой шприц «по кругу»;
- использовать общую воду для промывания шприца и иглы;
- добавлять кровь (свою или чужую) в раствор наркотика с целью его «очистения»;
- пользоваться наркотиками, заправленными в шприц кем-то другим;
- пользоваться общей посудой для забора наркотика (ВИЧ может попасть в емкость через использованный ранее шприц).

- 50% — от ВИЧ-инфицированной матери новорожденному ребенку (естественные роды и грудное вскармливание);
- 1% — от ВИЧ-инфицированной матери новорожденному ребенку, если мать проводит профилактические мероприятия, включая химиотерапию;
- 3% — анальный секс без презерватива;
- 0,1–0,2% — вагинальный контакт, когда один из партнеров ВИЧ-инфицирован (ВИЧ-инфицированный мужчина);
- 0,05–0,1% — вагинальный контакт, когда один из партнеров ВИЧ-инфицирован (ВИЧ-инфицированная женщина).

Пути и вероятные факторы передачи ВИЧ-инфекции

| Пути передачи | Факторы передачи | Риск заражения ²¹ |
|---|---|------------------------------|
| Сексуальные контакты | | |
| Анальный секс | Сперма, кровь | Высокий |
| Вагинальный секс | Сперма, вагинальный и цервикальный секреты, кровь (в том числе менструальная) | Высокий |
| Оральный секс | Сперма, вагинальный секрет, менструальная кровь | Средний |
| Парентеральный | | |
| «Через шприц» | Контаминированные иглы и шприцы, а также другой инвазивный нестерилизованный инструментарий | Высокий |
| Повреждения кожи, слизистой | Кровь | Высокий |
| Гемотрансфузионный | Кровь или ее препараты | Высокий |
| Трансплантационный | | |
| Трансплантационный | Органы и ткани | Высокий |
| От матери ребенку | | |
| Трансплацентарный | Кровь | Средний |
| Интранатальный (во время родов) | Кровь, вагинальный секрет | Высокий |
| Постнатальный (при грудном вскармливании) | Кровь, грудное молоко | Высокий |

²¹ Риск заражения представлен в данной таблице без учета возможных методов профилактики.

чинает чувствовать уверенность в себе, потому что он верит в возможность реализации принятого решения. Окружающие также замечают происходящие изменения и обычно «отдают ему должное» (одобрение других людей очень значимо). Стадия «действия» обычно является самой непродолжительной, но она — самая важная.

5. Поддержание

На этой стадии человек пытается укрепить достигнутые результаты и предупредить рецидив. Для поддержания изменений важна позиция т.н. значимого окружения. Если есть поддержка со стороны близких людей, вероятность рецидивов снижается. Человек может испытывать страх перед возможным рецидивом, который ослабевает только со временем.

6. Рецидив

Если человек оказывается не в состоянии поддержать произошедшие изменения, возникает рецидив — возвращение к проблемному поведению. Это может иметь серьезные негативные последствия: потерю веры в возможность реализовать собственные решения, контролировать свою жизнь.

Однако человек может «вернуться» на стадию намерения и совершить как бы еще один оборот по «спирали изменений».

Данная модель — циклична, и каждый человек может покинуть ее на любой стадии. Та стадия, на которой находится человек, является главным показателем возможного прогресса: чем дальше человек продвинулся по «спирали изменений», тем возможнее появление положительных результатов.

Процесс изменения

Процесс изменения обусловлен мотивами, которые заставляют человека принимать решение об изменении своего поведения. Рассматриваемая модель включает в себя десять различных мотивов изменения поведения.

- Осознание.** Выражается в том, что человек осознает существование проблемы и значимость полученной информации. Это создает предпосылки принятия эффективных решений по изменению сложившейся ситуации.
- Самопереоценка.** На эмоциональном и рациональном уровнях происходит оценка преимуществ и недостатков изменения поведения.
- Социальное освобождение.** Характеризуется фокусированием на негативных последствиях поведения для окружающих — устои социума входят в конфликт с поведением индивидуума.
- Личное освобождение.** Формирование новых взглядов на жизнь. Растет уверенность в собственных силах.

5. **Изменения в окружающей среде.** Меняются жизненные обстоятельства и отношение окружающих к человеку (не по его инициативе). Это серьезные изменения внешних условий, которые влияют на поведение человека.
 6. **Изменение условий и их оценки.** Изменяется реакция человека на существующие обстоятельства его жизни или появляется новая реакция на изменившиеся условия.
 7. **Контроль условий.** Изменяются внешние условия с целью снизить возможность реализации человеком проблемного поведения.
 8. **Управляемое изменение.** Человек изменяет обстоятельства, вызывающие у него проблемное поведение.
 9. **Резкое изменение.** Изменение поведения вследствие сильной эмоциональной реакции на какое-либо событие.
 10. **Доверительные отношения.** Устойчивые доверительные отношения по крайней мере с одним человеком, например с лечащим врачом.
 - Человек, находящийся на стадии преднамерения, редко оказывается способен к активным изменениям. Обычно это ограничивается проявлением осознания проблемы. На данной стадии проще оценить себя и свои возможности.
 - На стадии действия активизируется процесс личного освобождения. Это довольно сложная стадия изменения, когда человек больше всего нуждается в поддержке и понимании.
 - Стадия поддержания основана на происшедших процессах изменения. На данной стадии человеку необходимо найти альтернативу прошлому поведению.
 - Процесс изменения и контроля за своим поведением будет наиболее эффективным при наличии поддержки со стороны.
- Вывод: для того чтобы человек принял решение об изменении поведения, главное — создать у него мотивацию.**

Процесс формирования мотивации может быть разделен на четыре этапа:

- уверенность в себе,
- получение и принятие информации,
- чувство компетентности,
- появление понимания необходимых изменений.

Комментарий: уверенность в себе необходима, т.к. без нее человек не будет готов к получению информации.

Для того чтобы помочь человеку достичь желаемых изменений в поведении, необходимо учитывать, что:

- мотивация изменений должна исходить от самого человека, а не извне;
- агрессивное убеждение не эффективно при разрешении сомнений и противоречий, возникающих у человека с проблемным поведением;

Приложение II Передача ВИЧ

1. Жидкости организма, содержащие ВИЧ

Источником инфекции является человек в любой период с момента его инфицирования ВИЧ. ВИЧ обнаруживается во всех жидкостях организма инфицированного человека, но для передачи вируса необходима его определенная концентрация. Инфекционно опасными являются²⁰:

- кровь,
- сперма,
- вагинальный секрет,
- грудное молоко.

Вирус в низкой, эпидемиологически безопасной концентрации содержат:

- моча,
- слюна,
- слезы,
- пот,
- фекалии,
- ушная сера.

Если данные жидкости не содержат крови, риск заражения ВИЧ сводится к нулю.

2. Пути передачи ВИЧ

На сегодняшний момент у специалистов уже не осталось сомнений в том, какими путями передается, а какими не передается ВИЧ-инфекция. Это подтверждено годами эпидемиологических наблюдений и множественными лабораторными экспериментами.

Эпидемически значимые пути передачи ВИЧ-инфекции:

- парентеральный путь (через кровь);
- сексуальные контакты, связанные с проникновением в тело партнера;
- от инфицированной матери ребенку во время беременности, родов и при кормлении грудью.

Вероятность передачи ВИЧ при однократном контакте:

- 90—100% — при переливании крови или ее компонентов, зараженных ВИЧ;
- 30% — при инъекционном употреблении наркотиков одним шприцем с ВИЧ-инфицированным;
- 0,3% — при уколах иглой, на которой есть следы крови, содержащей ВИЧ;

²⁰ Жидкости перечислены с учетом концентрации вируса — от более высокой к менее высокой.

лиферации всех клонов CD8⁺ лимфоцитов в ответ на общее снижение количества клеток Т-популяции, обусловленное потерей CD4⁺ лимфоцитов. Но, несмотря на повышение числа CD8⁺ клеток, их цитотоксическая активность против ВИЧ по мере прогрессирования заболевания снижается до полного исчезновения.

ВИЧ-инфекция сопровождается избыточной активацией В-лимфоцитов, сопровождающейся повышенной продукцией иммуноглобулинов, интерлейкина-6, фактора некроза опухолей.

ВИЧ не оказывает цитолитического действия на моноциты и макрофаги, однако активно реплицируется в них, поэтому фагоциты могут служить резервуаром ВИЧ и способствовать распространению вируса по организму.

- человек должен осознать наличие противоречий в своем отношении к проблеме («мне хотелось бы... но, с другой стороны...»);
- человек с проблемным поведением может нуждаться в конкретных советах по разрешению противоречий;
- стиль общения должен быть спокойным и дипломатичным;
- готовность к изменению не возникает сама собой, а является продуктом личностных переживаний;
- партнерские отношения могут помочь достичь человеку желательных изменений;
- человек нуждается в безопасной обстановке для разрешения внутренних конфликтов.

Общение с наркозависимым может быть достаточно сложным и не всегда приятным процессом. Особенно сложно, если это близкий человек, которому хочется помочь, не вступая с ним в со-зависимые отношения. С этой целью могут быть использованы следующие методики:

1. Сопереживание.

Принятие облегчает перемены; умение выслушать очень важно; двойственность вполне естественна.

2. Вычленение противоречий.

Важно, чтобы потребитель наркотиков понял, какие последствия может иметь его поведение; укажите на противоречия между нынешним поведением и поведением, необходимым для сохранения здоровья, возможно, именно это послужит мотивацией к изменению поведения.

Предоставьте человеку возможность высказывать собственную точку зрения по поводу происходящего и собственной готовности к изменениям.

3. Нейтрализация ситуаций, способных привести к спору.

Споры непродуктивны; необходимость защищаться способствует поиску оправданий — сопротивление является сигналом к необходимости смены стратегии; избегайте «навешивания ярлыков».

4. Несопrotивление.

Восприятие может быть изменено; новые перспективы предлагаются, а не навязываются.

Человек, пытающийся решить свою проблему, может послужить бесценным источником удачных путей ее разрешения.

5. Поддержка самооффективности.

Важным стимулом для изменений является вера в возможность перемен; человек несет ответственность за выбор и осуществление собственных изменений. Чем больше имеется альтернативных подходов, тем больше надежда на положительный результат.

Аддиктивное поведение

Люди используют различные способы, чтобы справиться со стрессом, снять усталость, расслабиться. В норме эти способы поддержки психологического комфорта не мешают, а помогают, будучи неотъемлемыми составляющими полноценной, насыщенной эмоциями и общением жизни. Если же стресс не проходит и начинает развиваться депрессия, человек обычно сокращает количество способов. Остаются те, в отношении которых уже сформировалась фиксация — воспоминание о сильном и положительном психо-эмоциональном состоянии (чаще всего — изменении восприятия мира, или, другими словами, изменении сознания). Эти воспоминания способствуют появлению желания повторить это когда-нибудь еще, а стресс провоцирует реализацию данного желания.

Если неприятное, болезненное состояние так и не проходит, человек все очевиднее начинает повторять одни и те же поступки. Это первый шаг к зависимости (аддикции). Важно отметить, что наличие фиксации отнюдь не всегда приводит к развитию зависимости.

В дальнейшем, если причины, вызывающие стресс, не устраняются, повторение происходит все чаще и чаще. Человек тратит на облегчение своего состояния одним и тем же способом все больше и больше времени. Развивается аддикция, которая может быть связана с употреблением определенных веществ (алкоголь и другие психоактивные вещества, жирная пища) или совершением определенных действий (секс, игра в карты, работа). Часто аддикция носит смешанный характер. Например, опиный аддикт зависит и от употребляемого вещества, и от ритуала (действия), связанного с употреблением.

По определению Короленко и Сегала, «аддиктивное поведение выражается в уходе от реальности посредством изменения психического состояния» с помощью определенных действий или употребления психоактивных веществ¹⁹ и является одной из форм отклоняющегося, но не болезненного поведения.

Консультанту, работающему с клиентом до и после теста на ВИЧ, необходимо определить наличие аддикции (особенно химической — от алкоголя или героина), но ему не следует пытаться ее «вылечить». Работа с аддикцией — достаточно сложный и длительный процесс, которым должен заниматься опытный специалист — психотерапевт или психиатр.

ВИЧ принадлежит к семейству ретровирусов, подсемейству лентивирусов. Внешняя оболочка ВИЧ приспособлена для присоединения к будущей клетке-жертве. Для этого на поверхности вируса существуют специальные белки, которыми, словно крючками, ВИЧ цепляется за нужные клетки организма. Затем другие белки, располагающиеся на поверхности внешней оболочки, разрывают поверхность клетки и впрыскивают внутрь содержимое вируса.

Основная задача ВИЧ — внедрить свой генетический материал в ядро клетки хозяина. В результате пораженная вирусом клетка начинает продуцировать белки, из которых собираются новые вирусные частицы. Они отправляются на поиск других клеток, чтобы, внедрившись, заставить их производить все новые и новые копии ВИЧ.

В процессе размножения ВИЧ участвуют три фермента: обратная транскриптаза, интеграз и протеаза. Их задача — внедрить вирусную информацию в генетический аппарат клетки и поддержать процесс образования новых вирусов.

4. Особенности ВИЧ

ВИЧ содержит:

- только РНК (а не ДНК);
- особый фермент — обратную транскриптазу, который позволяет превратить РНК в ДНК, а затем встроить ее в геном клетки хозяина, например лимфоцита.

Для паразитирования ВИЧ выбирает в первую очередь лимфоциты, т.е. именно те клетки, которые должны защищать человека от инфекций. Вирус поражает также другие клетки организма, имеющие CD4+ рецепторы.

Пока иммунная система не повреждена, продукция ВИЧ подавляется, но длительная борьба «вирус — организм» истощает резервы защиты, что приводит к массовому размножению вируса и развитию СПИДа.

5. Влияние ВИЧ на иммунную систему

Наличие ВИЧ-инфекции не только снижает абсолютное число Т-лимфоцитов, но и нарушает их функцию. Многие проявления ВИЧ-инфекции можно объяснить снижением числа Т-хелперов (CD4+). Однако функциональная недостаточность Т-лимфоцитов проявляется уже на ранних этапах ВИЧ-инфекции, когда еще нет значительного снижения числа CD4+ клеток.

Число CD8+ лимфоцитов изменяется в зависимости от стадии ВИЧ-инфекции. По окончании острой фазы оно обычно увеличивается и остается таковым в течение всей бессимптомной стадии, но при развитии СПИДа резко падает. Увеличение числа цитотоксических клеток, возможно, объясняется компенсаторным усилением про-

¹⁹ Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. Психосоциальная аддиктология. — Новосибирск: «Олсиб», 2001.

Лимфоциты отличаются высоким разнообразием и включают по крайней мере три популяции (типы клеток с максимально общими признаками): Т-клетки, В-клетки, НК-клетки (от natural killer — естественные убийцы).

Т-лимфоциты непосредственно отвечают за клеточный иммунитет и подразделяются на две основные группы: иммунорегуляторные Т-хелперы и цитотоксические Т-киллеры. В клинической практике каждой группе присвоено собственное имя в зависимости от типа рецепторов, расположенных на их поверхности: CD4 или CD8.

Т-хелперы несут на своей поверхности CD4+ рецепторы, выполняющие главным образом иммунорегуляторную функцию.

Т-киллеры несут на своей поверхности CD8+ рецепторы. Главная функция Т-киллеров — уничтожение дефектных или пораженных инфекцией клеток организма.

Т-хелперы играют решающую роль в иммунной реакции на внедрение антигенов. Когда вирус иммунодефицита человека проникает в организм, первой клеткой-мишенью являются Т-хелперы, которые несут на своей поверхности CD4+ рецепторы. Это приводит к сбою хорошо отлаженной работы иммунной системы и развитию иммунодефицита.

2. Определение ВИЧ и СПИДа

СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита:

С — синдром (совокупность признаков, сопровождающих заболевание);

П — приобретенный (синдром не передается по наследству);

ИД — иммунодефицит (недостаточность иммунитета).

ВИЧ-инфекция — заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека.

СПИД — конечная стадия ВИЧ-инфекции.

С июля 1986 года для обозначения этого вируса повсеместно принято название «вирус иммунодефицита человека» или «ВИЧ» (HIV).

3. Вирусы как особая форма жизни

Вирус — это простейшая форма жизни. Вирусы являются возбудителями многих острых и хронических инфекционных заболеваний. Вирусы человека и животных — исключительно внутриклеточные паразиты, то есть основная часть их жизненного цикла, связанная с размножением, проходит только внутри клеток организма хозяина. В состав вирусных частиц входит только один тип нуклеиновой кислоты: либо ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота), либо РНК (рибонуклеиновая кислота), являющейся носителем генетической информации вируса.

Раздел III Профилактика передачи ВИЧ

1. Программы профилактики ВИЧ/СПИДа

Программы профилактики ВИЧ/СПИДа в Республике Казахстан реализуются с 1997 года при поддержке международных организаций. Программы направлены на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции в уязвимых группах и среди общего населения. В реализации профилактических программ активное участие принимают неправительственные организации (НПО). Таких НПО около сорока; их целевые группы — молодежь, ПИН, секс-работники, мужчины, вступающие в сексуальные отношения с мужчинами (МСМ).

В настоящее время в Республике Казахстан действуют 98 пунктов обмена шприцев, в которых представители уязвимых групп населения могут получить средства защиты (презервативы, шприцы) и информационно-образовательные материалы.

2. Стратегия снижения вреда

На начало 1980-х годов пришлось «первая волна» профилактической работы по предупреждению распространения ВИЧ/СПИДа. Авторы программ полагали: если людям предоставить информацию и поддержку, они сразу изменят свое поведение. Но, как показала практика, люди не могут быстро изменить свое поведение — изменения, как правило, носят постепенный характер.

Бывают ситуации, в которых человек не может совершенно обезопасить себя. Причиной этого могут быть зависимость от наркотиков, экономическая зависимость от партнера, не желающего использовать презервативы, культурные нормы сообщества, отношение общества к проблеме и конкретным типам поведения. Предложение полностью отказаться от привычного поведения только отталкивает человека от профилактической программы. Важно предлагать приемлемые альтернативы, базирующиеся на имеющихся в данный момент возможностях человека:

- Вместо подхода «все или ничего» предлагайте спектр возможностей.
- Вместо категорических рекомендаций — консультирование, право на личный выбор.

На этих принципах построены программы снижения вреда среди ПИН и обсуждение сексуальных практик.

3. Профилактика парентерального пути передачи ВИЧ

3.1. Профилактика передачи ВИЧ при инъекционном употреблении наркотиков

Риск передачи ВИЧ-инфекции существует при совместном использовании инъекционного оборудования. С целью снижения риска передачи ВИЧ через кровь лицам, употребляющим наркотики инъекционным путем, необходимо обеспечить легкий доступ к стерильным инъекционным инструментам и дезинфицирующим материалам.

Следует серьезно рассматривать любые действия, которые помогают снизить распространение ВИЧ-инфекции среди ПИН. Каждый ПИН должен знать о том, что использование дезинфицированных, а лучше одноразовых, инъекционных инструментов — лучший способ избежать заражения ВИЧ.

Необходимо напоминать о возможности передачи ВИЧ через наркотик каждому клиенту. Не пытайтесь строить догадки, является ли тот или иной человек ПИН. Наркотики могут употреблять медицинские работники, имеющие доступ к лекарствам, а общие шприцы и иглы для инъекций иногда используют хорошо обеспеченные люди.

Кроме знания методов профилактики, человеку важно знать, кто может помочь ему в приобретении навыков профилактики, а также в более существенных позитивных изменениях, как, например, в отказе от употребления наркотиков. Владение информацией о существующих медицинском и социальном сервисе и правилах его использования — критически важно для эффективной профилактики.

Наркотики чаще всего употребляют молодые сексуально активные люди. Поэтому следует также предоставлять рекомендации по практике безопасного секса.

Рекомендации по снижению вреда

Чтобы при употреблении наркотиков избежать заражения ВИЧ и гепатитами, следует:

- иметь свой индивидуальный шприц и не давать использовать его другому человеку,
- не производить забор наркотика из общей посуды,
- использовать чистый наркотик (без добавления чужой крови),
- избегать употребления «вторяков» («вторяк» — раствор, приготовленный из остатков опия-сырца после первого использования, опасен тем, что может содержать различные примеси и остатки крови).

3.1.1. Рекомендации по дезинфекции игл и шприцев

Обработку необходимо проводить дважды: первый раз сразу же после использования и второй раз — непосредственно перед повторным использованием.

Приложение I Иммунная система

Иммунитет — это наш пропуск в мир живых.

Р.В. Петров, академик РАН

1. Как работает иммунная система

Назначение иммунной системы — защищать организм от внешних вторжений. Вторгающиеся элементы распознаются как «не свои», то есть не являющиеся частью организма, и это вызывает защитную реакцию иммунной системы (ИС). Эти чужеродные элементы называются патогенами (антигенами). К патогенам относятся бактерии, вирусы, грибы, простейшие, злокачественные клетки и другие чужеродные для организма субстанции.

Иммунитет бывает двух видов: врожденный (естественный) и приобретенный (адаптивный).

ИС состоит из специальных органов и клеток, расположенных по всему телу. Одной из частей ИС является лимфатическая система (ЛС). Она, в свою очередь, состоит из наполненных жидкостью лимфатических сосудов, связывающих между собой лимфатические узлы. Одной из функций лимфатических узлов является выявление антигенов и их фильтрация из лимфатической жидкости. Другая их функция заключается в депонировании белых кровяных клеток, которые называются лимфоцитами и фагоцитами. Лимфоциты и фагоциты образуются в костном мозге и представляют собой клетки, запускающие иммунный ответ — каскад реакций, возникающих при обнаружении антигена.

Иммунная система состоит:

1. из центральных органов (тимус, костный мозг);
2. из периферических органов (селезенка, лимфоузлы, лимфоидная ткань слизистых оболочек дыхательных путей, пищеварительного тракта, кожи — например, пейеровы бляшки, миндалины, аппендикс и др.).

Костный мозг не является собственно лимфоидным органом, но именно здесь из стволовой клетки-предшественницы вырабатываются все клетки крови, в том числе и клетки лимфоидного ряда (лимфоциты).

В 1969 году И. Ройт ввел понятие Т- и В-лимфоцитов:

Т-лимфоциты (тимус-зависимые лимфоциты) соответственно образуются в тимусе;

В-лимфоциты (bursa-зависимые лимфоциты) образуются в костном мозге (аналог костного мозга у птиц называется bursa, что и дало название данной популяции лимфоцитов), затем поступают в периферические лимфоидные органы.

использования латексные салфетки. Если разрезать презерватив вдоль, из него получится такая салфетка.

Эффективность латексных салфеток зависит от того, насколько полно они покрывают участки контакта, а также от отсутствия на них проколов, разрывов, растяжек и т.д. Как и презервативы, латексные салфетки являются одноразовым средством защиты, использовать их рекомендуется только с одной стороны. Не следует сочетать их со спермицидами, смазками и продуктами на жировой основе.

5. Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку

Как уже было сказано в разделе III «Передача ВИЧ-инфекции», одним из возможных путей передачи вируса является путь от инфицированной матери ребенку во время беременности, родов или при кормлении грудью.

Подробное обсуждение данной темы должно предлагаться профильным специалистом. В рамках консультирования могут быть представлены лишь основные факты.

Тем более в рамках консультирования до и после теста не может обсуждаться вопрос о сохранении или прерывании беременности!

Для консультанта важно знать, какие организации и специалисты занимаются оказанием медицинской и психосоциальной помощи ВИЧ-положительным беременным и рожденным ими детям, и предоставить эту информацию клиенту.

6. ВИЧ-инфекция у новорожденных и подростков

Как и вопросы профилактики передачи ВИЧ от матери плоду/новорожденному, вопросы возможных последствий ВИЧ-инфекции у детей и оказание медицинской и психосоциальной помощи рожденным ВИЧ-положительными женщинами детям не являются предметом обсуждения на консультациях до и после теста на ВИЧ. Данные вопросы с матерью должны обсуждать медик, психолог, социальный работник после консультирования по поводу ее ВИЧ-статуса.

Если тестирование проводится ребенку в возрасте до 13–14 лет, предпочтительно перед разговором с ребенком провести совместную встречу с родителями, детским или подростковым психологом, чтобы помочь родителям оказать поддержку своему ребенку в случае положительного результата.

Если тестирование проводится подростку старше 14 лет, предпочтительно провести совместное консультирование ребенка и родителей, но только с согласия ребенка.

В любой из перечисленных ситуаций консультанту важно иметь информацию о медицинских и социальных организациях, которые могут оказать помощь родителям и детям в ситуациях, связанных с ВИЧ-инфекцией, наркотической зависимостью, сексуальным насилием или с проблемами взаимоотношений внутри семьи.

Каждая обработка должна проводиться следующим образом:

Этап 1. Цель: смыть остатки раствора и крови. Набрать в шприц через иглу чистую воду с небольшим количеством воздуха. Потрясти шприц два раза по 30 секунд. Воду из шприца выливать не в емкость с чистой водой, а в раковину или на землю.

Этап 2. Цель: уничтожить возбудителей заболевания. Набрать через иглу раствор хлорки, прополоскать им шприц два раза по 30 секунд. Раствор из шприца выливать не в емкость с чистой хлоркой, а в раковину или на землю.

Этап 3. Цель: смыть остатки хлорки. Набрать в шприц через иглу чистую воду и прополоскать его два раза по 30 секунд. Воду из шприца выливать не в емкость с чистой водой, а в раковину или на землю.

3.1.2. Три основных правила обработки игл и шприцев

Основные правила обработки игл и шприцев, которые необходимо объяснить, если клиент может воспринимать информацию ограниченного объема и сложности:

- Следует использовать сильнодействующий раствор хлорной извести.

Если клиент спрашивает, можно ли употреблять алкоголь или перекись водорода для обработки игл, сообщите ему, что алкоголь и перекись водорода можно использовать если нет хлорки, но хлорка — во много раз лучше.

- Чем дольше шприцы и иглы находятся в контакте с раствором хлорной извести, тем лучше.
- Трехэтапную обработку нужно проводить дважды: первый раз — сразу же после использования, второй раз — непосредственно перед повторным использованием.

3.2. Профилактика внутрибольничного заражения

Основные правила предупреждения инфицирования при оказании медицинских услуг предусматривают:

- соблюдение предосторожности в отношении крови и других жидких сред организма;
- соблюдение предосторожности при инъекциях и процедурах, связанных с нарушением целостности кожи и слизистых;
- соблюдение предосторожности при работе с остро заточенным инструментарием;
- эффективное применение дезинфекции и стерилизации.

Для профилактики профессионального инфицирования медицинским работникам необходимо:

- строго соблюдать дезинфекционно-стерилизационный режим, установленный приказом МЗ РК № 404 «О мерах по снижению заболеваемости вирусными гепатитами в республике» от 15.08.1997;

- при выполнении манипуляций использовать средства барьерной защиты (халаты, перчатки и т.д.); при угрозе разбрызгивания крови применять маску, очки или защитные щитки;
- все манипуляции, связанные с нарушением целостности кожных и слизистых покровов, выполнять в перчатках.

3.3. Постконтактная профилактика

В ситуации укола или ранения, причиненного острым инструментом, осколками стекла от ампул, пробирок и т.д., необходимо предпринять следующие действия:

- При повреждении кожи снять перчатки и промыть водой с мылом те участки кожи, на которые предположительно попали инфицированные физиологические жидкости.
- Промыть водой слизистые оболочки, имевшие контакт с возможным источником инфекции.
- При попадании инфицированной жидкости в глаза промыть их водой или солевым раствором.

НЕ ПРИМЕНЯТЬ щелочные вещества и не вводить в рану антисептики или дезинфицирующие вещества.

Химиопрофилактика проводится антиретровирусными препаратами. Начать химиопрофилактику нужно немедленно, но не позднее чем через 36 часов. Продолжительность ее должна быть не менее 28 дней.

Медицинский работник должен находиться под наблюдением не менее шести месяцев от момента травмы и проходить обследование на ВИЧ.

4. Профилактика передачи ВИЧ при сексуальном контакте

Общая информация

Риск заражения ВИЧ при сексуальных контактах полностью исключен в случае воздержания от сексуальной активности. Моногамные отношения между неинфицированными партнерами, подразумевающие их взаимную верность, также обеспечивают высокую безопасность. Во всех других случаях, когда сексуальная активность направлена на партнера (или партнеров) с неизвестным или позитивным ВИЧ-статусом, следует соблюдать меры предосторожности для снижения вероятности ВИЧ-инфицирования. Эти меры называются видами безопасного (или менее опасного) сексуального поведения и подразумевают использование таких форм сексуальной активности или таких способов защиты, которые устраняют или значительно сокращают потенциальный риск инфицирования.

изменению при помощи консультирования до и после теста на ВИЧ:

- степень сексуальной активности,
- выбор партнера,

Пример организации обсуждения темы «Разрыв презервативов».

Клиент говорит, что ее партнер не хочет пользоваться презервативами, так как они все время рвутся. По его словам, они все равно неэффективны.

Консультант: Презервативы могут порваться, но часто это происходит в результате их неправильного использования. Производство презервативов контролируется, осуществляется проверка их качества. Проблема заключается в том, что люди могут неправильно пользоваться презервативом, что влечет за собой его разрыв. Презервативы из латекса дают эффективную защиту при их постоянном и правильном использовании. Вы бы хотели поговорить о правильном использовании и разобраться в том, как избежать их повреждения?

Объяснение правильного использования презервативов представлено, но женщина по-прежнему колеблется, хотя говорит, что все поняла.

Консультант: Я могу вам еще чем-нибудь помочь?

Клиент в конце концов говорит, что ее партнер может применить насилие, он уже принуждал ее заниматься сексом без презерватива. Она спрашивает, есть ли еще какие-нибудь способы защиты. Ее партнер предложил ей использовать спермицид внутривагинально.

Консультант: Сам по себе спермицид не защищает женщину от ВИЧ-инфекции.

Консультант может нередко сталкиваться с наличием сексуального насилия в жизни клиента. В таких случаях важно знать, какие организации оказывают помощь в профилактике сексуального насилия в семье и в других ситуациях, и дать клиенту информацию об этих организациях.

Тактика снижения риска при оральном сексе

Риск инфицирования при оральном сексе меньше, чем при анальном или вагинальном. Человеку, который интересуется степенью риска заражения ВИЧ при оральном сексе с мужчиной, следует дать стандартную информацию по использованию презервативов для снижения риска. В любом случае важно, чтобы сперма не попадала в рот. Прерывание взаимодействия до эякуляции также существенно уменьшает риск. Хотя в случае незащищенного орального контакта риск все равно остается, он несопоставимо меньше, чем риск при попадании спермы в рот.

(Более подробную информацию о риске, которому подвергается человек при оральном сексе, содержит глава «Передача инфекции».)

Для других видов орального секса: рот—вульва (куннилингус) и рот—анус (анилингус) — не существует специально разработанных, проверенных и одобренных барьерных средств защиты. В качестве барьера, предотвращающего контакт кожи или слизистой с потенциально опасными жидкостями организма, можно предложить для

Люди, обращающиеся за информацией, могут возражать против идеи использования презервативов или других средств защиты. Вы можете услышать следующее: «Ни в коем случае! Я этого делать не буду!» Правильный ответ мог бы прозвучать так: «Это ваше решение. Я хочу, чтобы вы поняли пути передачи ВИЧ и способы профилактики, и хочу дать вам информацию о том, как защитить себя и партнера».

Пример организации обсуждения темы «Правильное использование презерватива».

Клиент: Разве презервативы не могут порваться?

Консультант: Презервативы рвутся крайне редко. Происходит это, как правило, в результате его неправильного использования или при использовании презерватива с истекшим сроком годности. Другими распространенными причинами повреждения презерватива являются: повреждение изделия ногтями, воздействие высокой температуры и солнечного света, повторное использование презерватива, разворачивание презерватива до его надевания. Использование смазки на жировой основе, такой как детское масло, растительное масло, вазелин и крем, может значительно ослабить презервативы из латекса и повлечь за собой их разрыв. Минеральное масло, распространенный ингредиент лосьонов для рук, может вызвать ослабление прочности презерватива на 90% уже через 60 секунд после его нанесения.

Разрыв презервативов

При разрыве презерватива не рекомендуется промывание с помощью душа, так как это может способствовать продвижению спермы по влагалищу вверх до шейки матки, что, вероятно, увеличит площадь контакта с ВИЧ. В случае если порвался презерватив, нельзя использовать спермицидные и дезинфицирующие мази, т.к. они могут вызвать воспаление слизистой влагалища, а это, в свою очередь, облегчает проникновение ВИЧ и других инфекций в организм. При разрыве презерватива во время анального полового контакта промывание с помощью душа или клизмы также может способствовать продвижению спермы и микроорганизмов вверх по прямой кишке, увеличивая площадь контакта. Кроме того, в этом случае можно вымыть защитную слизь, выстилающую прямую кишку.

Применение таких профилактических средств, как габитан, мирамистин, цидипол и других, не только не снижает риск инфицирования ВИЧ, а, наоборот, увеличивает его, что связано с тем, что они вызывают раздражение слизистой, которое сопровождается притоком большого количества активированных клеток, участвующих в иммунном ответе. Таким образом, в слизистой оказывается большое количество потенциальных мишеней для ВИЧ, что значительно облегчает его проникновение в организм.

- выбор сексуальной практики,
- возраст, когда начинается сексуальная жизнь.

2. Легче добиться менее опасного поведения в том случае, если изменения обсуждаются в рамках (внутри) существующих у клиента стиля жизни, количества партнеров и сексуальных практик. То есть, как сделать менее опасным то, что клиент привык и хочет продолжать делать?

Определяющим фактором для использования презервативов является вера в их защитные свойства. Поэтому важно, чтобы сексуально активные люди получили информацию о том, что презервативы из латекса, при правильном и постоянном использовании, обеспечивают эффективную защиту от ВИЧ-инфекции. Применение презервативов — наилучший способ профилактики ВИЧ при сексуальных контактах.

Обсуждение вопросов безопасного секса с партнером

Эффективность профилактики ВИЧ значительно повышается, если сексуальные партнеры могут и готовы обсуждать друг с другом использование презервативов и менее опасных сексуальных практик. Помощь в подготовке к такому обсуждению могут оказать сотрудники и добровольцы профилактических программ, поэтому консультанту важно поддерживать связь с такими программами и информировать о них клиентов.

Презервативы из латекса

Презервативы из латекса или полиуретана обеспечивают более надежную защиту от ВИЧ по сравнению с презервативами из натуральной мембраны.

При покупке важно обращать внимание на то, есть ли на упаковке надпись, говорящая, что они предохраняют от ИППП и ВИЧ. Эффективными могут быть как презервативы со смазкой (лубрикантом), так и без смазки (сухие, без лубриканта), однако смазка помогает снизить риск разрыва презерватива.

На качественных презервативах имеется указание на национальный стандарт качества, которому они соответствуют, а также обязательно присутствуют сведения о производителе.

На презервативе должна быть указана либо дата окончания срока реализации, либо дата изготовления и срок годности. Презервативы нельзя использовать по истечении срока годности.

Презервативы хранят в прохладном сухом месте, вдали от прямого солнечного света. Нельзя хранить презервативы в заднем кармане брюк или под подушкой. Презервативы в поврежденной упаковке или с явными признаками давнего происхождения (например, ломкие, липкие или потерявшие цвет) не могут считаться надежным средством защиты, и их использовать не следует.

С весны 1987 года во всех странах — производителях презервативов развернута широкая программа проверки контроля качества и

процедур тестирования презервативов из латекса. Каждый презерватив, сертифицированный в Казахстане, до упаковки был проверен производителем при помощи электронных средств на наличие дефектов, включая отверстия и тонкие участки.

Смазки (лубриканты)

Если используется дополнительная смазка при вагинальном и, особенно, анальном контакте, то с целью уменьшения риска разрыва презерватива следует использовать смазки только на водной основе. Нельзя применять смазки на жировой основе, такие как вазелин, крем, гель для рук, растительное масло и т.п. Эти продукты разрушают латекс и могут способствовать разрыву презерватива.

Спермициды

Спермициды — это химические поверхностно-активные вещества, и их следует применять в соответствии с прилагаемыми инструкциями.

Спермициды созданы для того, чтобы инактивировать сперму. Их можно приобрести в виде кремов, пенки, гелей, пропитанных губок, таблеток или свечей. При использовании спермицидов в сочетании с презервативами следует использовать ту форму, которая позволит полностью покрыть внутреннюю поверхность влагалища, например пенку или крем.

Не используйте презервативы со спермицидной смазкой для орального секса. Никогда не следует обрабатывать спермицидом рот. Помимо того что у него определенно неприятный вкус, он может повредить слизистую ротовой полости.

Спермициды сами по себе не могут защитить от ВИЧ-инфекции.

Пример организации обсуждения эффективности презервативов

Клиент хочет знать, насколько эффективны презервативы.

Консультант: Презервативы из латекса очень эффективны при их правильном использовании во время орального, анального и вагинального секса. Исследования показали, что у тех пар, в которых один партнер инфицирован ВИЧ и в которых правильно и при каждом половом контакте применяли презерватив, риск передачи ВИЧ-инфекции составил 0–2%.

Клиент: Что означает выражение «презервативы из латекса высокоэффективны»?

Консультант: Презервативы высокоэффективны в случае правильного и постоянного применения. Убедительные результаты исследований свидетельствуют о том, что даже при повторяющемся контакте с ВИЧ 98–100% людей, постоянно и правильно использующих презервативы во время вагинального секса, не инфицируются.

Пример организации обсуждения качества презервативов из латекса

Клиент говорит, что прочитал, будто у презервативов из латекса поры достаточно велики для прохождения через них ВИЧ, и спрашивает, насколько эта информация соответствует истине.

Консультант: В отличие от резины латекс не имеет пор. Презерватив представляет из себя основу, дважды покрытую латексом. При правильном применении презервативы не пропускают ВИЧ. Поэтому мы, как и Всемирная организация здравоохранения, по-прежнему рекомендуем правильно применять презервативы из латекса и использовать их каждый раз, когда вы занимаетесь сексом: это значительно сокращает риск передачи инфекций, передающихся половым путем, включая ВИЧ.

Презервативы: рекомендации по правильному применению

Может появиться необходимость объяснять людям, обращающимся за информацией, как правильно пользоваться презервативами из латекса. Упаковка презервативов должна содержать инструкцию по применению.

Правильно использовать презерватив из латекса это значит:

- Использовать презерватив при каждом виде проникающего контакта, причем от начала до конца акта. Никогда не использовать один и тот же презерватив при смене типа сексуальной активности.
- Надевать презерватив сразу же после возникновения эрекции. Избегать прикасаться penisом влагалища или ануса до того, как презерватив будет надет.
- Перед надеванием кончик презерватива (около 1 см) зажать между большим и указательным пальцами, чтобы выпустить оттуда воздух; затем приложить презерватив к головке полового члена и раскатать его по всей длине члена, до самого основания. Очень важно оставить на кончике презерватива место для семенной жидкости: это предотвратит разрыв презерватива в момент семяизвержения.
- Использовать смазку только на водной основе; смазки на масляной основе разрушают латекс. (Некоторые виды губной помады, так же как и смазки на жировой основе, могут повредить латексному презервативу.)
- После эякуляции сразу же вывести член из влагалища (ануса) партнера, придерживая презерватив у основания.
- После снятия завязать презерватив узлом и выбросить в мусорное ведро.
- Не использовать презервативы с истекшим сроком годности и имеющие поврежденную упаковку.