



სქესობრივი გზით
გადამდები ინფექციები
(ვენერიული დაავადებები)

აივ/შიდსი

აღზნათ იყრი, რომ დღლესდღლეობით სარქართველოში
სარქამოფდ გარქრელეშულია სქესობრივი გზით
გარქამდებნი ინფექციები დარქ აივ/შიდსი. შენ,
გარქამდინარქე შენი სარქმიანობიდან სარქამოფდ დიდი
რისკის ქვეშ ხარ. გარქსოვდეს, რომ მარქგან თარქვის
დარქვის ერთ-ერთი სარქშუალეზარქ, უსარქფრთხო
სქესობრივი ურთიერთობებნი.

სნოროფდ ამიჭომ შიექმნარქ ეს მარქსარქლა. რქვენ შიექურადეო,
რომ მოგვენოდებინარქ ის ინფორმარქია, რომლიის
ურქოდნარქე აურქილეშულია შენთვის. იმედიარქ, ჰარქსუხი
გარქურქეა შიქვრქ შენთვის სარქინჭერქსო შიქკითხვარქს დარქ
არქსეშული ინფორმარქიარქს გარქმოიყენებ შენი
სარქფიროებნიარქამებრქ.

რარქ თქმარქ უნდარქ ეს მარქსარქლა ამომნურარქვე ინფორმარქიარქს
ვერქ მოგარქნვდის დარქ შიქსარქძლეშულია დარქმარქტებნიოთი
კითხვებნი გარქვიჩნდეს.

ამისარქთვის არქიფე ტელეფონის ნომერი:

თბილისი - 25 18 19

ზარქსუმი - 7 42 13

ურქინჭრის "თარქნარქდგომა" კონსულტარქინჭრები უარქარქსუხოფდ
არქ დარქტოვეებნი შენს შიქკითხვებნი.

გარქსოვდეს: ყოველი ზარქი ანონიმური დარქ უფარქსარქ.

სქესობრივი გზით გადასული ინფექციები (სგბი)



როგორ იწივრება სგბი?

სგბი იმპოფრება, როგორც სქესობრივი გზით გადასული ინფექციები. ასეთ ინფექციებს ვენერიულ დაავადებებსაც უწოდებენ.



როგორი დაავადებაა სქესობრივი გზით გადასული ინფექცია?

ეს ისეთი დაავადებაა, რომელიც გადაეცემა ერთი ადამიანიდან მეორეს სქესობრივი კონტაქტის ანუ სქესობრივი თანაცხოვრების დროს.



რამდენი სგბი არის სნობილი დღეს?

დღეისათვის ცნობილია 30-ზე მეტი სგბი, მათგან ყველაზე:

- სიფილისი
- გონორეა ანუ ტრიპერი
- ტრიქომონიაზი
- ქლამიდიოზი
- სოკოვანი ინფექცია
- აივ/შიდსი



რა ნიშნები გვხვდება ყველაზე ხშირად სგბი-ს დროს?

სქესობრივი გზით გადასული ინფექციების დროს ძირითადად გვხვდება შემდეგი ნიშნები:

- ▶ წვის შეგრძობა შარდვის დროს;
- ▶ სიწითლე სასქესო ორგანოების მიდამოებში;
- ▶ გამონაყარი სასქესო ორგანოებზე, კანზე და ლორწოვან გარსებზე - მაგალითად, პირის ღრუში, საშოში.

- ▶ გამოზადენი;
- ▶ ქავილი;
- ▶ ტკივილი მუცლის ქვედა არეში



ყოველთვის ვლინდება ეს ნიშნები ანუ სივარცოველი სქესობრივი გზით გადაგზავნი ნიშნები?

სქესობრივი გზით გადაგზავნი ნიშნები ინფექციები ხანდახან მიმდინარეობს ფარულად ანუ აღადგინი ვერ გრძობს, რომ იგი ინფიცირებულია რაიმე კონკრეტული დაავადებით. ნიშნები ჩნდება უკვე გართულებების პერიოდში.



გასსოვდეს, შეიძლება დაავადებულ ადამიანს ბარეგნულად არაფერი ეტყუროდეს, ვაგრამ ის ინფიცირებულია და გადაგზავნი!



როგორ გადადის სხვი?

სხვი ძირითადად გადაეცემა სქესობრივი კავშირის დროს. სქესობრივი კავშირი შეიძლება იყოს:

- ▶ ვაგინალური ანუ მამაკაცის სასქესო ორგანოს საშობო შეღწევა;
- ▶ ანალური ანუ მამაკაცის სასქესო ორგანოს უკანა ტანში შეღწევა;
- ▶ ორალური ანუ „მინეტი“.

სქესობრივი კავშირის ამ სამივე სახის დროს შეიძლება მოხდეს სხვი-ს გადაცემა ერთი ადამიანიდან მეორეზე.



ყოველთვის გამოიყენე პრეზერვატივი! თუ გაინახა, სასწრაფოდ შეწყვიტე სქესობრივი აქტი და აუსილაზლად გამოიყენე ახალი პრეზერვატივი!



რა უნდა ვიცოდეთ სიფილისის შესახებ?

სიფილისის გადაცემის გზებია:

- ▶ დაუცველი სქესობრივი ურთიერთობა ანუ ურთიერთობა პრეზერვატივის გარეშე - ვაგინალური, ორალური და ანალური;
- ▶ სისხლი - მაგალითად, ინფიცირებული სისხლის გადასხმისას;
- ▶ მჭიდრო საყოფაცხოვრებო ურთიერთობა დაავადებულთან-მაგალითად, ინფიცირებულის თეთრეულის ან ჭურჭლის გამოყენება;
- ▶ დელიდან შვილზე ორსულობის ან მშობიარობის დროს.



რა ნიშნები ახასიათებს სიფილის?

დაინფიცირებიდან 1-4 კვირის პერიოდში ჩნდება მუწუკისმსგავსი წარმონაქმნი წყლულოვანი თავით ანუ შანკრი. ის ხშირად უმტკივნეულოა.

ხშირად შანკრი ჩნდება ღრმად საშოში ან საშვილოსნოს ყელზე და ამიტომ უხილავია. 10-15 დღეში შანკრი თავისით ქრება, მაგრამ დაავადება აგრძელებს განვითარებას.

2 თვიდან 3 წლამდე პერიოდში ჩნდება გამონაყარი, ლაქები, წყლულები კანზე და ლორწოვან გარსზე. ახასიათებს თმის ცვენა, კუნთების ტკივილი;

თუ გპონია შემთხვევითი სქესობრივი აქტივობის პრეზერვატივის ბარამუ ან გაინახა პრეზერვატივი და ეჭვი გაპარება, რომ ხარ ინფიცირებული, დაუყოვნებლივ მიმართე ექიმს.



რა გართულავები შეიძლება მოჰყვას სიფილისს, თუ არ ვიმპერნალავ?

ინფიცირებიდან 3-10 წლის შემდეგ არანამკურნალეობი დაავადება იწვევს კანის, ნერვული და ძვალ-სახსროვანი სისტემის, შინაგანი ორგანოების დაზიანებას. ორგანიზმი იბრუნება და აღადიანი კვდება.



რა შემთხვევაში გავიქეთო ანალიზი სიფილისზე?

- ▶ თუ შეამჩნევ შანერს, დაუყოვნებლივ გაიქეთე ანალიზი.
 - ▶ იმ შემთხვევაში, თუ არაფერი გაწუხებს, მაგრამ ეჭვი გეპარება, რომ ინფიცირებული ხარ, დაუყოვნებლივ მიმართე ექიმ-ვენეროლოგს.
- დროული მკურნალობის შედეგად სიფილისი იკურნება.



რა უნდა ვისოდე ტრიპერის ანუ გონორეას შესახებ?

გონორეა აზიანებს არა მარტო შარდ-სასქესო სისტემას, არამედ სწორ ნაწლავს, პირის ღრუს ღორწოვან გარსს, თვალებს და სხვ.



როგორ გადაეხება გონორეა?

გონორეას გადაცემის ძირითადი გზა არის დაუცველი სქესობრივი ურთიერთობა ანუ ურთიერთობა პრეზერვატივის გარეშე – ვაგინალური, ორალური და ანალური.

თუ გპონია შემთხვევითი სქესობრივი კავშირი პრეპარატივის ბარეშე ან ბაიხა პრეპარატივი და ეჭვი გაპარება, რომ ხარ ინფიცირებული, დაუყოვნებლივ მიმართე ექიმს.



რა ნიშნები ახასიათებს გონორეას?

ყველაზე დამახასიათებელი ნიშნია საშოდან მოყვითალო-მომწვანო გამონადენი არასასიამოვნო სუნით. გონორეას ნიშნები ჩნდება ინფექციის შეჭრიდან მე-3 მე-7 დღეს. 10-14 დღის შემდეგ დაავადების ნიშნები შეიძლება გაქრეს თავისით, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ადამიანი გამოჯანმრთელდა. ამ მომენტიდან დაავადება გადადის ქრონიკულ სტადიაში და პერიოდულად შესაძლებელია მოხდეს გამწვავება.



რა ბარტულაგები შეიძლება მოჰყვას გონორეას, თუ არ ვიმკურნალავ?

არანამკურნალებმა გონორეამ შეიძლება გამოიწვიოს შინაგანი ორგანოების დაზიანება, უშვილობა, იმპოტენცია და სხვა



რა შემთხვევაში გავიქნეთ ანალიზი გონორეაზე?

იმ შემთხვევაში თუ ეჭვი შეგებარა, რომ ინფიცირებული ხარ, დაუყოვნებლივ მიმართე ექიმს და გაიკეთე ანალიზი. სრულფასოვანი მეურნელობის შემთხვევაში გონორეა იკურნება.



რა უნდა ვისცოდეთ ქლამიდოზის შესახებ?

ქლამიდოზის დროს ზიანდება არამარტო შარდ-სასქესო სისტემა, არამედ სხვა ორგანოებიც. მავალითად ნერვული სისტემა.

თუ გპონია შემთხვევითი სქმსობრივი კავშირი პრეპარატივის ბარეუ ან ბაიხა პრეპარატივი და ეჭვი ბეპარბა, რუმ ხარ იწვიტირბეული, ლაუწრენბელი მბბრბეუ ბქბმს.



როგორ გადაეცემა ქლამიდიოზი?

ქლამიდიოზის გადაცემის ძირითადი გზა არის დაუცველი სქესობრივი ურთიერთობა ან უ ურთიერთობა პრეზერვატივის გარეშე - ვაგინალური, ორალური და ანალური;

ქლამიდიოზი გადაეცემა ასევე ორსული დედიდან ნაყოფზე.



რა ნიშნები ახასიათებს ქლამიდიოზს?

ამ დაავადებისათვის დამახასიათებელია გამჭვირვალე, უფერო გამონადენი და ტკივილი შარდვისას. ჩივილები ჩნდება 1-2 კვირის შემდეგ. ხშირად ქლამიდიოზი მიმდინარეობს ყოველგვარი ნიშნების გარეშე და ხდება მიზეზი ადრეული მუცლის მოშლისა და უშეილობის.



რა გართულებები შეიძლება მოჰყვას ქლამიდიოზს, თუ არ ვიმკურნალავ?

ქლამიდიოზი გადაეცემა ორსული დედიდან ნაყოფს და ბავშვი შეიძლება გაჩნდეს თანდაყოლილი სიმასხინჯეებით.



რა შემთხვევაში გავიქეთო ანალიზი ქლამიდიოზზე?

იმ შემთხვევაში, თუ ექვი შეგეპარა, რომ ინფიცირებული ხარ, დაუყოვნებლივ მიმართე ექიმს და გაიკეთე ანალიზი. სრულფასოვანი მეურნელობის შემთხვევაში ქლამიდიოზი იკურნება.

თუ გპონია შემთხვევითი სქესობრივი კავშირი პრეზერვატივის გარეშე ან გაიხა პრეზერვატივი და ეჭვი გაპარება, რომ ხარ ინფიცირებული, დაუყოვნებლივ მიმართე ექიმს.



რა უნდა ვიცოდეთ ტრიქომონიაზის შესახებ?

ტრიქომონიაზი საკმაოდ ვერავი დაავადებაა. იგი აზიანებს შარდ-სასქესო სისტემას; შესაძლოა დაფაროს სხვა სქესობრივი გზით გადადები ინფექციების ნიშნები.



როგორ გადაეცემა ტრიქომონიაზი?

ტრიქომონიაზის გადაცემის ძირითადი გზა არის დაუცველი სქესობრივი ურთიერთობა ანუ ურთიერთობა პრეზერვატივის გარეშე - ვაგინალური, ორალური და ანალური; შესაძლებელია ტრიქომონიაზი გადაეცეს საყოფაცხოვრებო გზით, მაგალითად, სხვისი თეთრეულით ან საბანაო ღრუბელის გამოყენებისას.



რა ნიშნები ახასიათებს ტრიქომონიაზს?

დაავადების პირველი ნიშნები ვლინდება 3-25 დღის მანძილზე, თუმცა სშირად მიმდინარეობს ყოველგვარი გამოვლინების გარეშე. დამახასიათებელი სიმპტომებია: ქავილი და გაღიზიანება სასქესო ორგანოების მიდამოში და ქავისებური გამონადენი არასასიამოვნო სუნით.



რა გართულებები შეიძლება მოჰყვას ტრიქომონიაზს, თუ არ ვიპყრნალება?

არანამკურნალებმა ტრიქომონიაზმა შესაძლოა გამოიწვიოს უშვილობა.

თუ გპონია შემთხვევითი სქესობრივი კავშირი პრეპარატივის ბარაშე ან ბაიხა პრეპარატივი და ეჭვი ბეპარაბა, რომ ხარ იწვიტირებული, დაუყოვნებლივ მიმართე ექიმს.



რა შემთხვევაში გავიკეთო ანალიზი ტრიქომონიაზე?

დაავადების პირველივე ნიშნების გაჩენისთანავე მიმართეთ ექიმს.
სრულფასოვანი მკურნალობის შემთხვევაში ტრიქომონიაში იკურნება.



რა უნდა ვიცოდეთ სოკოვანი ინფექციის შესახებ?

ამ დაავადების გამომწვევე მიკროორგანიზმი სშირად ხვდება ორგანიზმში სხვა სეგი-ის გამომწვევებთან ერთად, თუმცა ასევე შეიძლება გაჩნდეს ქლამიდიოზის, ტრიქომონიაზის, ვირუსული ინფექციების და სხვა დაავადებების მკურნალობის, აგრეთვე ფეხმძიმობის შემდეგ.



რა ნიშნები ახასიათებს სოკოვან ინფექციას?

ამ დაავადების მიმდინარეობა შეიძლება დაიყოს ორ სტადიად:
მატარებლობა - ამ დროს არანაირი ნიშნების გამოვლინება არ ხდება, მაგრამ ამ აღამიანმა შეიძლება გადადოს ეს დაავადება სხვას;
მწვავე პერიოდი - გრძელდება დაახლოებით 2 თვე და ახასიათებს: კანის და ლორწოვანი გარსის შეწითლება, შეშუპება, გამონაყარი. დამახასიათებელია ქავილის და წვის შეგრძობა სასქესო ორგანოების არეში, ხაჭოსებრი გამონადენი.

თუ ბაქონია შემთხვევითი სქმსობრივი კავშირი პრეპარატივის ბარამუ ან ბაიხა პრეპარატივი და მჯვი ბეპარამა, რომ ხარ ინფიცირამული, ლაუზონამოლი მობართე მქიმს.



რა გართულებები შეიძლება მოჰყვას სოკოვან ინფექციას, თუ არ ვიმპურნალებ?

თუ არ იმპურნალებ, დაავადება გადადის ქრონიკულ სტადიაში. სრულფასოვანი მკურნალობის შემთხვევაში სოკოვანი ინფექცია იკურნება.



უნდა გვახსოვდეს, რომ იმპურნალობა აუსილაბელია ორივე პარტნიორისთვის, სხვა შემთხვევაში იმპურნალობას აზრი არა აქვს.



შეიძლება თუ არა მე თვითონ ჩავიტარო სგგი-ს იმპურნალობა?

არა! სგგი-ს მკურნალობას უნდა აწარმოებდეს ექიმი-ვენეროლოგი; თვითმკურნალობა საშიშია შემდეგი მიზეზების გამო:

- შენ თვითონ ვერ მიხვდები, რომელი სგგი-თი ხარ ინფიცირებული და ვერ შეარჩევ შესაბამის მკურნალობას;
- თუ სგგი-ს სწორად არ უმკურნალებ, ის გადავა ქრონიკულ ფორმაში და განვითარდება გართულებები, კერძოდ, უმწილობა, აბორტი, საშვილოსნოს გარე ორსულობა, ქრონიკული ტკივილები, სხვა ორგანოების (ღვიძლი, თირკმელები, თავის ტვინი, სხვ) დაზიანება, და ზოგიერთ შემთხვევაში სიკვდილი;
- ანტიბიოტიკების (კანამიცინი, გენტამიცინი და სხვ) არასწორი მიღება გამოიწვევს იმას, რომ დაავადების

თუ გპონია შემთხვევითი სქესობრივი კავშირი პრეპარატივის ბარაჟ ან ბაიხა პრეპარატივი და ეჭვი გაპარება, რომ ხარ ინფიცირებული, დაუყოვნებლივ მიმართე ექიმს.

- გამოძწვევი გახდება მდგრადი წამლებისადმი ანუ მასზე წამლები აღარ იმოქმედებს და ამიტომ ამ დაავადების მკურნალობა საკმაოდ გაძნელებულია;
- მკურნალობის კურსი უნდა მიყვანილ იქნას ბოლომდე იმის მიუხედავად, გაქრა ჩივილები თუ არა, ამის გაკონტროლება კი მხოლოდ ექიმს შეუძლია.

აივ/შიდსი



რას ნიშნავს აივ?

აივ არის ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსი. ჩვენ მას ბირობითად ვუწოდებთ „შიდსის ვირუსს“



რას აზიანებს შიდსის ვირუსი?

შიდსის ვირუსი აზიანებს ორგანიზმის დაცვის სისტემას ანუ იმუნიტეტს, რომელიც შენს ორგანიზმს იცავს სხვადასხვა ინფექციებისგან. ამ ვირუსის მიერ გამოწვეულ ინფექციას ვუწოდებთ აივ ინფექციას.

აივ ინფექცია ვითარდება ნელა. შეიძლება გავიდეს 3-10 წელი, სანამ ადამიანი მიხვდება, რომ ის დაავადებულია და აქვს შიდსი . მიუხედავად იმისა, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში ამ ადამიანს ავადმყოფობის არაფერი ეტყობა, ის მაინც გადაამდებია და შეუძლია გადადოს ვირუსი სხვა ადამიანს.



აზრობა თუ არა ადამიანს, რომ ის დაავადებულია შიდსით?

გარეგნულად შეუძლებელია მიხვდე, ადამიანი დაავადებულია შიდსით თუ არა. დროთა განმავლობაში შიდსის ვირუსი ანგრევს ორგანიზმის დაცვის უნარს, ვითარდება სხვადასხვა დაავადება, რომლებიც რთულდება და იწვევს სიკვდილს. ამ გართულებების გამოვლინების სტადიას ეწოდება შიდსი.



როგორ გადაეცემა შიდსის ვირუსი?

შიდსის ვირუსი გადაეცემა

- დაუცველი სქესობრივი კონტაქტით: სქესობრივი კონტაქტი საშოში ორალური ანუ მინეტი) ანალური ანუ უკანალში სქესობრივი კავშირი
- სისხლის კონტაქტი - აივ ინფიცირებული სისხლით დაბინძურებული შპრიცის, თუ სხვა სამედიცინო ან კოსმეტოლოგიური (მანიკური, პედიკური) ინსტრუმენტის გამოყენების შემთხვევაში.
- ინფიცირებული ორსული დედისაგან ნაყოფზე, მშობიარობის და ძუძუთი კვების დროს.

შიდსის ვირუსი არ გადაეცემა:

- დახველებით, დაცემინებით, ან კოცნით
- ხელის ჩამორთმევით, მოხვევით
- დაავადებულის ჭურჭლით, თეთრეულით
- საერთო ტუალეტით და აბაზანით სარგებლობისას
- საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში და ტრანსპორტში (ავტობუსი, ტროლეიბუსი, მატარებელი და სხვ.)
- მწერების და ცხოველების ნაკბენით

იმისათვის, რომ დაეადვინოთ, არის თუ არა აღაშიანი შიდსის ვირუსის მატარებელი აივ ინფიცირებული, საჭიროა გაკეთდეს სისხლის ანალიზი შიდსზე.



იკურნება თუ არა შიდსი?

შიდსის სრული განუწრება დღესდღეობით შეუძლებელია, მაგრამ სპეციალური ძვირადღირებული წამლებით შესაძლებელია სიცოცხლის გახანგრძლივება.



გახსოვდეს, რომ აივ/შიდსისგან თავის დასვინ ყველაზე ეფექტური საშუალებაა პრეპარატივი!

რაკი ამ გვერდამდე მოხვედი, იმედია ზოლომდე
გაუწავნი ჩვენს მიერ მონოღებულ ინფორმაციას.
გაგიჩნდა რაიმე დამატებითი შეკითხვები?
არ მოგერიდოს, აკრიფე ტელეფონის ნომერი
თბილისი - 25 18 19

ზათუმი - 7 42 13

და გიპასუხებენ: **"თანადგომა გისმენთ"**

საკუთესო სურვილებით
წინტრი "თანადგომა"

კონსულტაციებისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ:

საინფორმაციო სამედიცინო-ფსიქოლოგიური
ცენტრი "თანადგომა"

თბილისი
ტელ.: 25 18 19

ბათუმი
ტელ.: 7 42 13

ვებ-გვერდი: www.tanadgoma.ge

კონსულტაციები უფასო და ანონიმურია



Cordaid