


## 48 ÜLKEDEN 13,000 HIV TANISI ALMIŞ KATILIMCI İLE İLGİLİ TEMEL BULGULAR




2020 Dünya AIDS Günü için yayınlanan 2. EMIS-2017 Topluluk Raporu, HIV pozitif tanısı aldığı beyan eden ve haritadaki 48 ülkeden birinde yaşayan 13.172 (%10) erkeğe dayanarak hazırlanmıştır. Onlara ve EMIS-2017 araştırmasını tamamlayan 137.000 erkeğe teşekkür ederiz. Tüm topluluk raporlarına, milli raporlarla beraber [www.emis2017.eu](http://www.emis2017.eu) üzerinden ulaşabilirsiniz.

### YAŞADIKLARI YERLER


HIV tanısı almış EMIS-2017 katılımcılarının yüzdesi



### HIV TANISI İLE YAŞADIKLARI YIL



### HEPATİT



### HIV TEDAVİLERİ

**%96** son altı ay içinde HIV takibi yaptırmış

**%90** HIV ilacı (ART: Anti-Retroviral Tedavi) kullanıyor

**%82** baskılanmış viral yüke sahip (Belirlenemeyen / Saptanamayan)

HIV tedavisi dalgası kuzey ve batı Avrupa'da güney ve doğu Avrupa'ya kıyasla daha iyi sonuçlar vermiştir

### YAŞ, GÖÇ, İLİŞKİ



**%18** yurt dışında doğmuş

**%51** 'inin ilişkisi yok

**%7** 'si sabit bir ilişkisi olup olmadığından emin değil / 'karışık'

**%42** 'sinin sabit bir ilişkisi var

bu sabit ilişkisi olan katılımcıların %43'ünün partnerleri de HIV ile yaşıyor

**SABİT OLMAYAN SON ERKEK SEKS PARTNERİ İLE TANIŞMA YERLERİ**

**SON BİR YILDA CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIK TANILARI**



**CİNSEL GÜVENLİK**

**B=B BİLGİSİ**  
 (Belirlenemeyen = Bulaştırmayan)

**! %85**

HIV pozitif erkeklerin %85'i viral yükü belirlenemeyen seviyede olan bir bireyin başkasına HIV bulaştırmayacağını biliyor. Tüm katılımcılar arasında bu oran %57 idi. (EMIS-2017 Topluluk Raporu Vol.1)

Bu genel olarak eşcinsel erkekler, biseksüel erkekler ve özellikle HIV pozitif eşcinsel erkekler (ve onların sağlık çalışanlarına) yönelik B=B bilgisi tanıtımının sürdürülmesinin gerekliliğini gösteriyor.

**EKONOMİK DURUM**

**CİNSEL SAĞLIK**


### AZINLIK STRESİ

**%19**

son bir yıl içinde sözlü hakarete maruz kalmış

**%17**

cinsel yönelimini kimseye açıklamamış ya da sadece birkaç kişiye açıklamış (açılmış)

**%8**

şiddetli depresyon ve kaygı bozukluğu belirtileri gösteriyor

**%25**

'kendine zarar vermeyi' ya da 'ölmüş olsa daha iyi olacağını' düşünmüş

### Son bir yılda bu maddeleri kullanmış olan HIV pozitif erkeklerin yüzdeleri



**%63**

**Poppers kullanmış**



**%46**

**Sertleşme Problemi İlaçları kullanmış**



**%34**

**Esrar kullanmış**



**%23**

**toz veya hap Ekstazi kullanmış**



**%21**

**Kokain kullanmış**



**%16**

**Sakinleştiriciler / Yatıştırıcılar kullanmış**

### MADDE KULLANIMI

**%6**

son bir yıl içinde uyuşturucu enjekte etmiş (steroidler hariç)

**%17**

son dört hafta içinde seksi daha yoğun veya uzun yapmak için uyarıcı maddeler kullanmış

### MADDE BAĞIMLILIĞI HİZMETLERİ

**! %18**

HIV tanısı almış katılımcıların %18'i alkol bağımlılığı belirtileri göstermelerine rağmen bu katılımcıların yalnızca %10'u alkol tüketimleri hakkında bir sağlık profesyoneline danışmış

**! %10**

HIV tanısı almış katılımcıların %10'u madde kullanmaları ile ilgili endişelenmelerine rağmen bu katılımcıların yalnızca %21'i madde kullanmaları hakkında bir sağlık profesyoneline danışmış